2427T Celler

300167

2427T, som härrör från en primärtumör från en 64-årig kaukasisk kvinna som diagnostiserats med skivepitelcancer i lungorna, utgör en värdefull in vitro-modell som återger de morfologiska egenskaperna hos den ursprungliga tumörvävnaden. 2427T-cellerna kännetecknas av sin distinkta lilla, runda form och benägenhet att samlas i kluster och uppvisar viktiga morfologiska egenskaper som är typiska för skivepitelcancer (SCC).
En utmärkande egenskap hos cellinjen 2427T är dess uttryck av cytokeratin 5/6 (CK5/6), en markör som indikerar dess ursprung i SCC. Det heterogena uttrycket av CK5/6 antyder att det finns olika subpopulationer av celler i 2427T-kulturen, vilket ger möjlighet till ytterligare utforskning av intratumoral heterogenitet.
Immunofenotypning av 2427T har avslöjat dess unika profil, inklusive avsaknaden av den adenocarcinomassocierade markören CK7, den hemato-endoteliala progenitormarkören CD34 och leukocytmarkören CD45, vilket förstärker dess klassificering inom skivepitelcellinjen.
Intressant nog visar cellinjen generellt negativitet för neuroendokrina markörer som CD56, synaptofysin (SYP), neuronspecifikt enolas (NSE) och kromogranin A (CHGA), men uttrycket av SYP i en delmängd av cellerna tyder på en viss grad av heterogenitet hos de neuroendokrina markörerna.
Av avgörande betydelse är att cellinjen 2427T inte innehåller mutationer i EGF-R eller k-ras, vilket skiljer den från andra modeller och understryker dess potential som en ny resurs för att undersöka biologin och de terapeutiska sårbarheterna hos icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp (NSCLC). Avsaknaden av vanliga onkogena mutationer gör 2427T till ett ovärderligt verktyg för forskning som syftar till att avslöja de underliggande mekanismerna för patogenesen och utvecklingen av skivepitelcancer.

ALLMÄN INFORMATION

Beskrivning

2427T, som härrör från en primärtumör från en 64-årig kaukasisk kvinna som diagnostiserats med skivepitelcancer i lungorna, utgör en värdefull in vitro-modell som återger de morfologiska egenskaperna hos den ursprungliga tumörvävnaden. 2427T-cellerna kännetecknas av sin distinkta lilla, runda form och benägenhet att samlas i kluster och uppvisar viktiga morfologiska egenskaper som är typiska för skivepitelcancer (SCC).
En utmärkande egenskap hos cellinjen 2427T är dess uttryck av cytokeratin 5/6 (CK5/6), en markör som indikerar dess ursprung i SCC. Det heterogena uttrycket av CK5/6 antyder att det finns olika subpopulationer av celler i 2427T-kulturen, vilket ger möjlighet till ytterligare utforskning av intratumoral heterogenitet.
Immunofenotypning av 2427T har avslöjat dess unika profil, inklusive avsaknaden av den adenocarcinomassocierade markören CK7, den hemato-endoteliala progenitormarkören CD34 och leukocytmarkören CD45, vilket förstärker dess klassificering inom skivepitelcellinjen.
Intressant nog visar cellinjen generellt negativitet för neuroendokrina markörer som CD56, synaptofysin (SYP), neuronspecifikt enolas (NSE) och kromogranin A (CHGA), men uttrycket av SYP i en delmängd av cellerna tyder på en viss grad av heterogenitet hos de neuroendokrina markörerna.
Av avgörande betydelse är att cellinjen 2427T inte innehåller mutationer i EGF-R eller k-ras, vilket skiljer den från andra modeller och understryker dess potential som en ny resurs för att undersöka biologin och de terapeutiska sårbarheterna hos icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp (NSCLC). Avsaknaden av vanliga onkogena mutationer gör 2427T till ett ovärderligt verktyg för forskning som syftar till att avslöja de underliggande mekanismerna för patogenesen och utvecklingen av skivepitelcancer.

Vävnad	Lungan
Sjukdom	Skivepitelcancer i lungan

KLASSIFICERING

Organism	Människa
Kön	Kvinna
Tillväxtegenskaper	Följsam

EGENSKAPER

Tumörframkallande	Mycket tumörframkallande i nakna möss.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

IDENTIFIERARE

Källa

2427T (Cytion katalognummer 300167)

NCBI-skattenummer	9606
Cellosaurus	CVCL_M070

UTTRYCK OCH MOTTAGLIGHET

Proteinexpression

Synaptofysin (SYP)

Antigenuttryck

Partiellt uttryck av CK5/6

HANTERING OCH ODLING

Odlingsmedium

DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3,1 g/L glukos, w: 2,5 mM L-glutamin, w: 15 mM HEPES, w: 0,5 mM natriumpyruvat, w: 1,2 g/L NaHCO3 (Cytion artikelnummer 820400a)

Inkubationsatmosfär	37°C, 5%CO2, befuktad atmosfär.

Kosttillskott

Komplettera mediet med 10% FBS

Dissociationsmedel	Accutase

Vidareodling

Ta bort det gamla mediet från de adherenta cellerna och tvätta dem med PBS som saknar kalcium och magnesium. Använd 3-5 ml PBS för T25-kolvar och 5-10 ml för T75-kolvar. Täck sedan cellerna helt med Accutase, använd 1-2 ml för T25-kolvar och 2,5 ml för T75-kolvar. Låt cellerna inkubera i rumstemperatur i 8-10 minuter så att de lossnar. Efter inkubationen, blanda cellerna försiktigt med 10 ml medium för att resuspendera dem och centrifugera sedan vid 300xg i 3 minuter. Kassera supernatanten, resuspendera cellerna i färskt medium och överför dem till nya kolvar som redan innehåller färskt medium.

Upptining och odling

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROLL OCH KRYOKONSERVERING

Sterilitet

Mykoplasmakontaminering utesluts med hjälp av både PCR-baserade analyser och luminiscensbaserade metoder för mykoplasmadiagnostik. För att säkerställa att det inte finns någon kontaminering av bakterier, svamp eller jäst utsätts cellkulturerna för dagliga visuella inspektioner.

Frysmedel	Som kryokonserveringsmedium använder vi 50% basalt medium + 40% FBS + 10% DMSO, eller CM-1 (Cytion katalognummer 800100), som innehåller optimerade osmoprotektanter och metaboliska stabilisatorer för att förbättra återhämtningen och minska kryoinducerad stress.

Förvaringsförhållanden

För långtidsförvaring, placera flaskorna i flytande kväve i ångfas vid ca -150 till -196 °C. Förvaring vid -80 °C är acceptabelt endast som ett kort mellanliggande steg innan överföring till flytande kväve.

Leveransvillkor

Kryopreserverade cellinjer skickas på torris i validerade, isolerade förpackningar med tillräckligt med kylmedel för att hålla cirka -78 °C under hela transporten. Vid mottagandet ska behållaren omedelbart inspekteras och flaskorna utan dröjsmål överföras till lämplig förvaring.

DONATOR

Donatorns ålder	64 år
Etnicitet	Kaukasisk

JURIDISKA FRÅGOR OCH SÄKERHET

Säkerhetsföreskrifter

När man planerar att förvara en kryovial i flytande kväve för framtida upptining är det obligatoriskt att följa strikta säkerhetsåtgärder. Lämpliga skyddshandskar och skyddskläder är nödvändiga, och ansiktsmask eller skyddsglasögon måste användas vid överföring av frysta prover till eller från tanken med flytande kväve. Detta för att minska risken för skador på grund av eventuella explosioner i frysbehållaren vid borttagning, vilket kan leda till att vassa fragment projiceras.

Garanti

På Cytion står vi bakom våra produkters kvalitet och livskraft.
Vi garanterar att våra celler är livsdugliga vid odlingens början i 60 dagar efter leverans från våra anläggningar.
Vi försäkrar att allt material överensstämmer med de specifikationer som beskrivs i analyscertifikatet och/eller produktbladet
För fullständig information, se vår <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantiförklaring

Avtal om materialöverföring krävs	Yes