# Клетки DU-145

300168

DU145 е човешка клетка за рак на простатата с епителна морфология, която обикновено се използва при изследвания на рака на простатата. Клетъчната линия е създадена от мозъка на 69-годишен мъж с рак на простатата. Те експресират андрогенни рецептори и се считат за туморогенни с умерен метастатичен потенциал, като при инжектиране в голи мишки образуват аденокарцином (степен II), съответстващ на първичен на простатата.
По отношение на кариотипа клетките DU145 са хипотриплоидни и имат няколко маркерни хромозоми, включително t(11q12q), del(11)(q23), 16q+, del(9)(p11), del(1)(p32) и др. Те експресират няколко изоензима, включително AK-1, ES-D, G6PD, GLO-I, Me-2, PGM1 и PGM3. Клетките обаче не експресират простатен антиген.
Клетките DU145 са слабо положителни за киселинна фосфатаза и са способни да образуват колонии в мек агар. При ултраструктурните анализи е отчетено наличието на микровили, тонофиламенти, десмозоми, всякакви митохондрии, добре развити Голджи и хетерогенни лизозоми. Клетките DU145 имат време на удвояване приблизително 30-40 часа и са подходящи носители на трансфекция.
Клетките DU145 са ценен инструмент в терапевтичните изследвания на рака на простатата. Заедно с клетъчните линии PC3 и LNCaP DU145 е стандартна клетъчна линия за рак на простатата, използвана в медицинските изследвания. Заедно с клетките PC-3, клетките DU-145 експресират протеини на андрогенния рецептор. Въпреки това, когато са третирани с андрогенен лиганд, клетките не показват стимулиране на активността на AR-отговарящ репортерски ген. Поради това тези клетки се считат за неотговарящи на андрогени.

## ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

### Описание

DU145 е човешка клетка за рак на простатата с епителна морфология, която обикновено се използва при изследвания на рака на простатата. Клетъчната линия е създадена от мозъка на 69-годишен мъж с рак на простатата. Те експресират андрогенни рецептори и се считат за туморогенни с умерен метастатичен потенциал, като при инжектиране в голи мишки образуват аденокарцином (степен II), съответстващ на първичен на простатата.
По отношение на кариотипа клетките DU145 са хипотриплоидни и имат няколко маркерни хромозоми, включително t(11q12q), del(11)(q23), 16q+, del(9)(p11), del(1)(p32) и др. Те експресират няколко изоензима, включително AK-1, ES-D, G6PD, GLO-I, Me-2, PGM1 и PGM3. Клетките обаче не експресират простатен антиген.
Клетките DU145 са слабо положителни за киселинна фосфатаза и са способни да образуват колонии в мек агар. При ултраструктурните анализи е отчетено наличието на микровили, тонофиламенти, десмозоми, всякакви митохондрии, добре развити Голджи и хетерогенни лизозоми. Клетките DU145 имат време на удвояване приблизително 30-40 часа и са подходящи носители на трансфекция.
Клетките DU145 са ценен инструмент в терапевтичните изследвания на рака на простатата. Заедно с клетъчните линии PC3 и LNCaP DU145 е стандартна клетъчна линия за рак на простатата, използвана в медицинските изследвания. Заедно с клетките PC-3, клетките DU-145 експресират протеини на андрогенния рецептор. Въпреки това, когато са третирани с андрогенен лиганд, клетките не показват стимулиране на активността на AR-отговарящ репортерски ген. Поради това тези клетки се считат за неотговарящи на андрогени.

| | |
|---|---|
| **Тъкан** | Простата |
| **Заболяване** | Карцином |
| **Място на метастазите** | Мозък |

### Синоними

- DU145
- Du-145
- DU 145
- DU_145
- DU.145
- Duke University 145

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

## КЛАСИФИКАЦИЯ

| | |
|---|---|
| **Организъм** | Човек |
| **Секс** | Мъж |
| **Свойства, свързани с растежа** | Привърженик |
| **Ниво на биологична безопасност** | 1 |

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| **Морфология** | Подобни на епител |
| **Туморогенен** | Форми на аденокарцином (степен II), съответстващи на първична простата |

**Кариотип**

(P75) хипотриплоиден до тетраплоиден с аномалии, включително прекъсвания, дицентрици, минути и голям телоцентричен маркер

## ИДЕНТИФИКАТОРИ

**Източник**

DU-145 (каталожен номер 300168 на Cytion)

| | |
|---|---|
| **Данъчен идентификационен номер в NCBI** | 9606 |
| **Целозавър** | CVCL_0105 |

## ПРОЯВА И ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНОСТ

**Експресия на антигена**

Кръвна група O, Rh+

**Изоензими**

Me-2, 1-2, PGM3, 2, PGM1, 1, ES-D, 1, AK-1, 1, G6PD, B, GLO-1, 2, продукт за честота на фенотипа: 0.0041

## ОБРАБОТКА И ОТГЛЕЖДАНЕ

**Хранителна среда**

EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutamine, w: 2,2 g/L NaHCO3, w: EBSS (номер на статията в Cytion 820100a)

| | |
|---|---|
| **Атмосфера за инкубация** | 37°C, 5%CO2, овлажнена атмосфера. |

**Добавки**

Допълнете средата с 10% FBS и 1% NEAA

| | |
|---|---|
| **Реагент за дисоциация** | Accutase |

**Пресаждане**

Отстранете старата среда от адхезивните клетки и ги промийте с PBS, която не съдържа калций и магнезий. За колби T25 използвайте 3-5 ml PBS, а за колби T75 - 5-10 ml. След това покрийте клетките изцяло с Accutase, като използвате 1-2 ml за колби T25 и 2,5 ml за колби T75. Оставете клетките да се инкубират на стайна температура за 8-10 минути, за да се отделят. След инкубацията внимателно разбъркайте клетките с 10 ml среда, за да ги ресуспендирате, след което центрофугирайте при 300xg за 3 минути. Изхвърлете супернатантата, ресуспендирайте клетките в прясна среда и ги прехвърлете в нови колби, които вече съдържат прясна среда.

| | |
|---|---|
| **Плътност на засяването** | 2 x $10^4$ клетки/$cm^2$ ще дадат конфуентен слой за около 4 дни |
| **Обновяване на течността** | 2 до 3 пъти седмично |

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

| | |
|---|---|
| **Възстановяване след размразяване** | След размразяването оставете клетките да се възстановят от процеса на замразяване в продължение на поне 24 часа. |

**Размразяване и култивиране**

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

## КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И КРИОКОНСЕРВАЦИЯ

**Стерилност**

Замърсяването с микоплазма се изключва както чрез PCR-базирани анализи, така и чрез луминесцентни методи за откриване на микоплазма.
За да се гарантира, че няма бактериално, гъбично или дрождево замърсяване, клетъчните култури се подлагат на ежедневни визуални проверки.

| | |
|---|---|
| **Среда за замразяване** | Като среда за криоконсервация използваме пълна среда за растеж (включително FBS) + 10% DMSO за адекватна жизнеспособност след размразяване или CM-1 (каталожен номер 800100 на Cytion), която включва оптимизирани осмопротектори и метаболитни стабилизатори за подобряване на възстановяването и намаляване на криоиндуцирания стрес. |

**Условия за съхранение**

За дълготрайно съхранение поставете флаконите в течен азот в парна фаза при температура около -150 до -196 °C. Съхранението при -80 °C е приемливо само като кратък междинен етап преди прехвърлянето в течен азот.

**Условия за доставка**

Криоконсервираните клетъчни линии се транспортират върху сух лед в утвърдени, изолирани опаковки с достатъчно хладилен агент, за да се поддържа приблизително -78 °C по време на транспортирането. При получаването незабавно прегледайте опаковката и незабавно прехвърлете флаконите за подходящо съхранение.

## ДАРИТЕЛ

| | |
|---|---|
| **Възраст на донора** | 69 години |

## ПРАВНИ ВЪПРОСИ И БЕЗОПАСНОСТ

**Мерки за безопасност**

Когато планирате да съхранявате криопрепарат в течен азот за бъдещо размразяване, е задължително да спазвате строги мерки за безопасност. Подходящите защитни ръкавици и облекло са от съществено значение, а по време на прехвърлянето на замразени проби към или от резервоара с течен азот е необходимо да се използва маска за лице или предпазни очила. Това се прави, за да се намали рискът от нараняване от потенциални експлозии на криовиолите при изваждането им, които могат да доведат до изхвърляне на остри фрагменти.

**Гаранция**

Ние в Cytion заставаме зад качеството и жизнеспособността на нашите продукти.
Гарантираме, че нашите клетки ще бъдат жизнеспособни в началото на култивирането в продължение на 60 дни след изпращането им от нашите съоръжения.
Гарантираме, че всички материали отговарят на спецификациите, описани в сертификата за анализ и/или продуктовата листа
За пълни подробности, моля, направете справка с нашата <a href=""/Кои сме ние/Гаранция/"" hreflang=""x-default"">Гаранционна декларация

| | |
|---|---|
| **Необходимо е споразумение за прехвърляне на материали** | Yes |