DU-145 ląstelės

300168

DU145 yra žmogaus prostatos vėžio ląstelė, pasižyminti epitelio morfologija, paprastai naudojama prostatos vėžio tyrimams. Ląstelių linija buvo sukurta iš 69 metų vyro, sergančio prostatos vėžiu, smegenų. Jos išreiškia androgenų receptorius ir yra laikomos tumorigeninėmis, turinčiomis vidutinį metastazavimo potencialą, o įšvirkštos į nuogas peles suformuoja adenokarcinomą (II laipsnio), atitinkančią prostatos pirminę formą.
Pagal kariotipą DU145 ląstelės yra hipotriploidinės ir turi kelias žymėtąsias chromosomas, įskaitant t(11q12q), del(11)(q23), 16q+, del(9)(p11), del(1)(p32) ir kt. Jie ekspresuoja keletą izofermentų, įskaitant AK-1, ES-D, G6PD, GLO-I, Me-2, PGM1 ir PGM3. Tačiau ląstelės neišreiškia prostatos antigeno.
DU145 ląstelės yra silpnai teigiamos rūgštinei fosfatazei ir gali sudaryti kolonijas minkštame agare. Ultrastruktūrinės analizės metu nustatyta, kad yra mikrovilių, tonofilamentų, desmosomų, bet kokių mitochondrijų, gerai išsivysčiusių Golgio ir heterogeninių lizosomų. DU145 ląstelių padvigubėjimo laikas yra maždaug 30-40 valandų, todėl jos yra tinkami transfekcijos šeimininkai.
DU145 ląstelės yra vertingas įrankis prostatos vėžio terapiniams tyrimams. Kartu su PC3 ir LNCaP ląstelių linijomis DU145 yra standartinė prostatos vėžio ląstelių linija, naudojama medicininiuose tyrimuose. Kartu su PC-3 ląstelėmis DU-145 ląstelės ekspresuoja androgenų receptorių baltymus. Tačiau, veikiant androgenų ligandu, ląstelės nerodė į AR reaguojančio reporterio geno aktyvumo stimuliacijos. Todėl šios ląstelės laikomos nereaguojančiomis į androgenus.

BENDRA INFORMACIJA

Aprašymas

DU145 yra žmogaus prostatos vėžio ląstelė, pasižyminti epitelio morfologija, paprastai naudojama prostatos vėžio tyrimams. Ląstelių linija buvo sukurta iš 69 metų vyro, sergančio prostatos vėžiu, smegenų. Jos išreiškia androgenų receptorius ir yra laikomos tumorigeninėmis, turinčiomis vidutinį metastazavimo potencialą, o įšvirkštos į nuogas peles suformuoja adenokarcinomą (II laipsnio), atitinkančią prostatos pirminę formą.
Pagal kariotipą DU145 ląstelės yra hipotriploidinės ir turi kelias žymėtąsias chromosomas, įskaitant t(11q12q), del(11)(q23), 16q+, del(9)(p11), del(1)(p32) ir kt. Jie ekspresuoja keletą izofermentų, įskaitant AK-1, ES-D, G6PD, GLO-I, Me-2, PGM1 ir PGM3. Tačiau ląstelės neišreiškia prostatos antigeno.
DU145 ląstelės yra silpnai teigiamos rūgštinei fosfatazei ir gali sudaryti kolonijas minkštame agare. Ultrastruktūrinės analizės metu nustatyta, kad yra mikrovilių, tonofilamentų, desmosomų, bet kokių mitochondrijų, gerai išsivysčiusių Golgio ir heterogeninių lizosomų. DU145 ląstelių padvigubėjimo laikas yra maždaug 30-40 valandų, todėl jos yra tinkami transfekcijos šeimininkai.
DU145 ląstelės yra vertingas įrankis prostatos vėžio terapiniams tyrimams. Kartu su PC3 ir LNCaP ląstelių linijomis DU145 yra standartinė prostatos vėžio ląstelių linija, naudojama medicininiuose tyrimuose. Kartu su PC-3 ląstelėmis DU-145 ląstelės ekspresuoja androgenų receptorių baltymus. Tačiau, veikiant androgenų ligandu, ląstelės nerodė į AR reaguojančio reporterio geno aktyvumo stimuliacijos. Todėl šios ląstelės laikomos nereaguojančiomis į androgenus.

Audinys	Prostatos
Liga	Karcinoma
Metastazių vieta	Smegenys

Sinonimai

- DU145
- Du-145
- DU 145
- DU_145
- DU.145
- Duke University 145

KLASIFIKACIJA

Organizmas	Žmogus
Seksas	Vyras

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Augimo savybės	Prisijungęs
Biologinio saugumo lygis	1

CHARAKTERISTIKOS

Morfologija	Į epitelį panašus
Tumorogeninis	Formuojasi adenokarcinoma (II laipsnio), atitinkanti prostatos pirminę formą

Kariotipas

(P75) nuo hipotriploidinio iki tetraploidinio su anomalijomis, įskaitant lūžius, dicentriką, minutes ir didelę telocentrinę žymę

IDENTIFIKATORIAI

Nuoroda

DU-145 (Cytion katalogo numeris 300168)

NCBI mokesčių identifikavimo kodas	9606
Cellosaurus	CVCL_0105

IŠRAIŠKA IR JAUTRUMAS

Antigeno ekspresija

Kraujo tipas O, Rh+

Izofermentai

Me-2, 1-2, PGM3, 2, PGM1, 1, ES-D, 1, AK-1, 1, G6PD, B, GLO-1, 2, Fenotipo dažnio produktas: 0.0041

LAIKYMAS IR AUGINIMAS

Maitinamoji terpė

EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutaminas, w: 2,2 g/L NaHCO3, w: EBSS (Cytion gaminio numeris 820100a)

Inkubacijos aplinka	37 °C, 5 %CO2, drėkintoje atmosferoje.

Maisto papildai

Papildykite terpę 10 % FBS ir 1 % NEAA

Disociacijos reagentas	Accutase

Subkultūrinis auginimas

Pašalinkite seną terpę nuo prilipusių ląstelių ir nuplaukite jas PBS, kuriame nėra kalcio ir magnio. T25 kolboms naudokite 3-5 ml PBS, o T75 kolboms - 5-10 ml. Tuomet visiškai užpilkite ląsteles "Accutase", naudodami 1-2 ml T25 kolboms ir 2,5 ml T75 kolboms. Leiskite ląstelėms inkubuotis kambario temperatūroje 8-10 minučių, kad jos atsiskirtų. Po inkubacijos atsargiai sumaišykite ląsteles su 10 ml terpės, kad jos vėl suspenduotų, tada 3 minutes centrifuguokite 300xg greičiu. Išmeskite supernatantą, vėl sutirpinkite ląsteles šviežioje terpėje ir perkelkite jas į naujas kolbas, kuriose jau yra šviežia terpė.

Sėjos tankis	2 x 10^4 ląstelės/cm^2 per maždaug 4 dienas sudarys konfluentinį sluoksnį.
Skysčių atnaujinimas	2-3 kartus per savaitę
Atkūrimas po atšilimo	Po atšildymo leiskite ląstelėms atsigauti po užšaldymo proceso bent 24 valandas.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Atšildymas ir auginimas

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KOKYBĖS KONTROLĖ IR KRIOKONSERVAVIMAS

Sterilumas

Mikoplazmos užterštumas atmetamas taikant PGR pagrįstus tyrimus ir liuminescencinius mikoplazmos aptikimo metodus.
Siekiant užtikrinti, kad nebūtų užteršimo bakterijomis, grybeliais ar mielėmis, ląstelių kultūros kasdien vizualiai tikrinamos.

Šaldymo terpė	Kaip kriokonservavimo terpę naudojame visišką augimo terpę (įskaitant FBS) + 10 % DMSO, kad būtų užtikrintas tinkamas gyvybingumas po atšildymo, arba CM-1 (Cytion katalogo numeris 800100), kurioje yra optimizuotų osmoprotektorių ir medžiagų apykaitos stabilizatorių, kad būtų pagerintas atsigavimas ir sumažintas kriokonservavimo sukeltas stresas.

Laikymo sąlygos

Norėdami ilgai saugoti, įdėkite buteliukus į garų fazės skystą azotą maždaug -150-196 °C temperatūroje. Laikymas -80 °C temperatūroje yra priimtinas tik kaip trumpas tarpinis etapas prieš perkeliant į skystąjį azotą.

Pristatymo sąlygos

Kriokonservuotos ląstelių linijos gabenamos ant sauso ledo patvirtintoje, izoliuotoje pakuotėje su pakankamu kiekiu šaldymo skysčio, kad pervežimo metu būtų palaikoma maždaug -78 °C temperatūra. Gavę pakuotę, nedelsdami ją apžiūrėkite ir nedelsdami perkelkite mėgintuvėlius į tinkamą saugyklą.

DONORAS

Donoro amžius	69 metai

TEISINIAI IR SAUGOS KLAUSIMAI

Saugos priemonės

Planuojant saugoti kriovaistinę skystame azote, kad ateityje ją būtų galima atšildyti, būtina laikytis griežtų saugos priemonių. Būtina mūvėti tinkamas apsaugines pirštines ir drabužius, o perkeliant užšaldytus mėginius į skystojo azoto talpyklą arba iš jos būtina naudoti veido kaukę arba apsauginius akinius. Taip siekiama sumažinti sužeidimų riziką dėl galimo kriokomponentų sprogimo išėmimo metu, kai gali išsiveržti aštrūs fragmentai.

Garantija

" Cytion" garantuoja savo produktų kokybę ir gyvybingumą.
Garantuojame, kad mūsų ląstelės bus gyvybingos kultūrų auginimo pradžioje 60 dienų po išsiuntimo iš mūsų gamyklos.
Užtikriname, kad visos medžiagos atitinka analizės sertifikate ir (arba) gaminio lape aprašytas specifikacijas
Išsamią informaciją rasite mūsų <a href=""/Kas mes esame/garantijos/" hreflang=""x-default"">Garantijos pareiškime

Reikalinga medžiagų perdavimo sutartis	Yes