LCLC-103H-celler

300169

LCLC-103H-cellelinjen stammer fra et storcellet lungekarcinom (LCLC), der specifikt blev etableret fra pleuraeffusionen fra en voksen mandlig patient med diagnosen storcellet lungekarcinom med kæmpeceller. Patienten havde tidligere gennemgået kemoterapi og strålebehandling. Denne cellelinje er især bemærkelsesværdig for sit delvise udtryk for neuroendokrine markører, som typisk er forbundet med småcellet lungekræft (SCLC) og visse neuroendokrine tumorer. Især antigenet, der påvises af det monoklonale antistof RNL-1, viser et fokalt overfladeudtryk i LCLC-103H-celler, svarende til det, der ses i nogle neuroendokrine karcinomer. Udtrykket er dog ikke ensartet på tværs af alle celler, hvilket indikerer heterogenitet inden for cellepopulationen.
LCLC-103H er i litteraturen beskrevet som PAS (Periodic Acid-Schiff)-negativ, hvilket adskiller den fra andre undertyper af lungekræft. Den udviser også en bemærkelsesværdig stroma-dannelse, hvilket er et væsentligt kendetegn ved dens histopatologiske profil. Desuden er denne cellelinje kendt for at overudtrykke proto-onkogenet MYC, som spiller en kritisk rolle i celleproliferation og tumorigenese. Immuncytokemiske undersøgelser har vist, at LCLC-103H ikke udviser det fulde spektrum af neuroendokrin differentiering, der ses i SCLC, da den mangler reaktivitet med andre neuroendokrine markører som dem, der identificeres af antistofferne RNL-2 og RNL-3. Denne forskel er afgørende for at kunne skelne LCLC fra SCLC, som er mere aggressiv og typisk udviser en højere følsomhed over for visse kemoterapeutiske midler. Den unikke ekspressionsprofil af LCLC-103H gør den til en værdifuld model til undersøgelse af de molekylære og immunologiske egenskaber ved storcellet lungekarcinom og dets overlapning med neuroendokrine træk.

GENERELLE OPLYSNINGER

Beskrivelse

LCLC-103H-cellelinjen stammer fra et storcellet lungekarcinom (LCLC), der specifikt blev etableret fra pleuraeffusionen fra en voksen mandlig patient med diagnosen storcellet lungekarcinom med kæmpeceller. Patienten havde tidligere gennemgået kemoterapi og strålebehandling. Denne cellelinje er især bemærkelsesværdig for sit delvise udtryk for neuroendokrine markører, som typisk er forbundet med småcellet lungekræft (SCLC) og visse neuroendokrine tumorer. Især antigenet, der påvises af det monoklonale antistof RNL-1, viser et fokalt overfladeudtryk i LCLC-103H-celler, svarende til det, der ses i nogle neuroendokrine karcinomer. Udtrykket er dog ikke ensartet på tværs af alle celler, hvilket indikerer heterogenitet inden for cellepopulationen.
LCLC-103H er i litteraturen beskrevet som PAS (Periodic Acid-Schiff)-negativ, hvilket adskiller den fra andre undertyper af lungekræft. Den udviser også en bemærkelsesværdig stroma-dannelse, hvilket er et væsentligt kendetegn ved dens histopatologiske profil. Desuden er denne cellelinje kendt for at overudtrykke proto-onkogenet MYC, som spiller en kritisk rolle i celleproliferation og tumorigenese. Immuncytokemiske undersøgelser har vist, at LCLC-103H ikke udviser det fulde spektrum af neuroendokrin differentiering, der ses i SCLC, da den mangler reaktivitet med andre neuroendokrine markører som dem, der identificeres af antistofferne RNL-2 og RNL-3. Denne forskel er afgørende for at kunne skelne LCLC fra SCLC, som er mere aggressiv og typisk udviser en højere følsomhed over for visse kemoterapeutiske midler. Den unikke ekspressionsprofil af LCLC-103H gør den til en værdifuld model til undersøgelse af de molekylære og immunologiske egenskaber ved storcellet lungekarcinom og dets overlapning med neuroendokrine træk.

Væv	Lunge
Sygdom	Storcellet karcinom
Metastasested	Pleural effusion

Synonymer

- LCLC103H
- Large Cell Lung Cancer-103H

KLASSIFICERING

Organisme	Menneske
Køn	Mand
Vækstegenskaber	Tilhænger
Biosikkerhedsniveau	1

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

EGENSKABER

Morfologi	Pleomorf
Ploidistatus	Aneuploid
Fordoblingstid	26 timer

IDENTIFIKATORER

Kildehenvisning

LCLC-103H (Cytion katalognummer 300169)

NCBI-skattenummer	9606
Cellosaurus	CVCL_1375

HÅNDTERING OG OPDRÆT

Næringsmedium

RPMI 1640, m: 2,0 mM stabil glutamin, m: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion artikelnummer 820700a)

Inkubationsatmosfære	37°C, 5%CO2, befugtet atmosfære.

Kosttilskud

Suppler mediet med 10% FBS

Dissociationsreagens	Accutase

Oddyrkning

Fjern det gamle medium fra de klæbende celler, og vask dem med PBS, der ikke indeholder calcium og magnesium. Brug 3-5 ml PBS til T25-kolber og 5-10 ml til T75-kolber. Dæk derefter cellerne helt med Accutase, brug 1-2 ml til T25-kolber og 2,5 ml til T75-kolber. Lad cellerne inkubere ved stuetemperatur i 8-10 minutter for at løsne dem. Efter inkubationen blandes cellerne forsigtigt med 10 ml medium for at resuspendere dem, og centrifugeres derefter ved 300xg i 3 minutter. Kassér supernatanten, resuspender cellerne i frisk medium, og overfør dem til nye kolber, der allerede indeholder frisk medium.

Såtæthed	0,5 til 1 x 10^4 celler/cm^2
Væskeudskiftning	2 til 3 gange om ugen
Genopretning efter optøning	Cellerne kommer sig efter nedfrysning inden for 24 timer.

Optøning og dyrkning

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROL OG KRYOPRÆSERVERING

Sterilitet

Mycoplasma-kontaminering udelukkes ved hjælp af både PCR-baserede assays og luminescensbaserede mycoplasma-detektionsmetoder. For at sikre, at der ikke er nogen bakterie-, svampe- eller gærforurening, underkastes cellekulturerne daglige visuelle inspektioner.

Frysemedium	Som kryopræserveringsmedium bruger vi komplet vækstmedium (inklusive FBS) + 10 % DMSO for tilstrækkelig levedygtighed efter optøning eller CM-1 (Cytion-katalognummer 800100), som indeholder optimerede osmobeskyttende stoffer og metaboliske stabilisatorer for at forbedre genopretningen og reducere kryo-induceret stress.

Opbevaringsbetingelser

For langtidsopbevaring anbringes hætteglas i flydende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Opbevaring ved -80 °C er kun acceptabelt som et kort mellemtrin før overførsel til flydende nitrogen.

Leveringsbetingelser

Kryopræserverede cellelinjer sendes på tøris i valideret, isoleret emballage med tilstrækkeligt kølemiddel til at opretholde ca. -78 °C under hele transporten. Ved modtagelse skal beholderen straks inspiceres, og hætteglassene skal straks overføres til passende opbevaring.

DONOR

Donorens alder	61 år
Etnisk tilhørsforhold	Kaukasisk

JURIDISKE FORHOLD OG SIKKERHED

Sikkerhedsforanstaltninger

Når man planlægger at opbevare et kryovæske i flydende nitrogen med henblik på fremtidig optøning, er det obligatorisk at overholde strenge sikkerhedsforanstaltninger. Passende beskyttelseshandsker og -tøj er afgørende, og der skal bruges ansigtsmaske eller sikkerhedsbriller under overførslen af frosne prøver til eller fra tanken med flydende nitrogen. Dette er for at mindske risikoen for skader fra potentielle kryovæskeeksplosioner ved fjernelse, som kan resultere i projektion af skarpe fragmenter.

Garanti

Hos Cytion står vi inde for vores produkters kvalitet og levedygtighed.
Vi garanterer, at vores celler vil være levedygtige ved kulturens start i 60 dage efter afsendelse fra vores faciliteter.
Vi sikrer, at alle materialer er i overensstemmelse med de specifikationer, der er beskrevet i analysecertifikatet og/eller produktarket
For alle detaljer henvises til vores <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantierklæring

Der kræves en aftale om overførsel af materiale	Yes