LCLC-103H Cellen

300169

De LCLC-103H cellijn is afgeleid van een grootcellig longcarcinoom (LCLC), specifiek vastgesteld uit de pleurale effusie van een volwassen mannelijke patiënt met de diagnose grootcellig longcarcinoom met reuscellen. De patiënt had eerder chemotherapie en radiotherapie ondergaan. Deze cellijn is vooral opmerkelijk vanwege de gedeeltelijke expressie van neuro-endocriene markers, die typisch worden geassocieerd met kleincellig longkanker (SCLC) en bepaalde neuro-endocriene tumoren. Met name het antigeen dat wordt gedetecteerd door het monoklonale antilichaam RNL-1 vertoont een focale oppervlakte-expressie in LCLC-103H cellen, vergelijkbaar met de expressie die wordt waargenomen in sommige neuro-endocriene carcinomen. De expressie is echter niet uniform over alle cellen, wat duidt op heterogeniteit binnen de celpopulatie.
LCLC-103H is in de literatuur beschreven als PAS (Periodic Acid-Schiff) negatief, waardoor het zich onderscheidt van andere longkankersubtypen. Het vertoont ook opmerkelijke stromavorming, wat een belangrijk kenmerk is van het histopathologische profiel. Bovendien staat deze cellijn bekend om de overexpressie van het proto-oncogen MYC, dat een cruciale rol speelt bij celproliferatie en tumorigenese. Immunocytochemische studies hebben aangetoond dat LCLC-103H niet het volledige spectrum van neuroendocriene differentiatie vertoont dat in SCLC wordt gezien, aangezien het reactiviteit mist met andere neuroendocriene markers, zoals de markers die worden geïdentificeerd door de antilichamen RNL-2 en RNL-3. Dit onderscheid is cruciaal voor de differentiatie van LCLC-103H. Dit onderscheid is cruciaal voor het onderscheiden van LCLC van SCLC, dat agressiever is en doorgaans een hogere gevoeligheid voor bepaalde chemotherapeutische middelen vertoont. Het unieke expressieprofiel van LCLC-103H maakt het een waardevol model voor het bestuderen van de moleculaire en immunologische kenmerken van grootcellig longcarcinoom en de overlap met neuro-endocriene kenmerken.

ALGEMENE INFORMATIE

Beschrijving

De LCLC-103H cellijn is afgeleid van een grootcellig longcarcinoom (LCLC), specifiek vastgesteld uit de pleurale effusie van een volwassen mannelijke patiënt met de diagnose grootcellig longcarcinoom met reuscellen. De patiënt had eerder chemotherapie en radiotherapie ondergaan. Deze cellijn is vooral opmerkelijk vanwege de gedeeltelijke expressie van neuro-endocriene markers, die typisch worden geassocieerd met kleincellig longkanker (SCLC) en bepaalde neuro-endocriene tumoren. Met name het antigeen dat wordt gedetecteerd door het monoklonale antilichaam RNL-1 vertoont een focale oppervlakte-expressie in LCLC-103H cellen, vergelijkbaar met de expressie die wordt waargenomen in sommige neuro-endocriene carcinomen. De expressie is echter niet uniform over alle cellen, wat duidt op heterogeniteit binnen de celpopulatie.
LCLC-103H is in de literatuur beschreven als PAS (Periodic Acid-Schiff) negatief, waardoor het zich onderscheidt van andere longkankersubtypen. Het vertoont ook opmerkelijke stromavorming, wat een belangrijk kenmerk is van het histopathologische profiel. Bovendien staat deze cellijn bekend om de overexpressie van het proto-oncogen MYC, dat een cruciale rol speelt bij celproliferatie en tumorigenese. Immunocytochemische studies hebben aangetoond dat LCLC-103H niet het volledige spectrum van neuroendocriene differentiatie vertoont dat in SCLC wordt gezien, aangezien het reactiviteit mist met andere neuroendocriene markers, zoals de markers die worden geïdentificeerd door de antilichamen RNL-2 en RNL-3. Dit onderscheid is cruciaal voor de differentiatie van LCLC-103H. Dit onderscheid is cruciaal voor het onderscheiden van LCLC van SCLC, dat agressiever is en doorgaans een hogere gevoeligheid voor bepaalde chemotherapeutische middelen vertoont. Het unieke expressieprofiel van LCLC-103H maakt het een waardevol model voor het bestuderen van de moleculaire en immunologische kenmerken van grootcellig longcarcinoom en de overlap met neuro-endocriene kenmerken.

Weefsel	Long
Ziekte	Grootcellig carcinoom
Plaats van uitzaaiingen	Pleurale effusie

Synoniemen

- LCLC103H
- Large Cell Lung Cancer-103H

CLASSIFICATIE

Organisme	Mens

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Seks	Man
Groei-eigenschappen	Aanhanger
Bioveiligheidsniveau	1

KENMERKEN

Morfologie	Pleomorf
Ploïdie	Aneuploïde
Verdubbelingstijd	26 uur

IDENTIFICATIEGEGEVENS

Bronvermelding

LCLC-103H (Cytion catalogusnummer 300169)

NCBI-belastingnummer	9606
Cellosaurus	CVCL_1375

BEHANDELING EN KWEEK

Kweekmedium

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabiele Glutamine, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion artikelnummer 820700a)

Incubatieomgeving	37°C, 5%CO2, bevochtigde atmosfeer.

Supplementen

Vul het medium aan met 10% FBS

Dissociatiereagens	Accutase

Heruitplanten

Verwijder het oude medium van de adherente cellen en was ze met PBS zonder calcium en magnesium. Gebruik voor T25-flesjes 3-5 ml PBS en voor T75-flesjes 5-10 ml. Bedek de cellen vervolgens volledig met Accutase, met 1-2 ml voor T25-flesjes en 2,5 ml voor T75-flesjes. Laat de cellen gedurende 8-10 minuten bij kamertemperatuur incuberen om ze los te maken. Na incubatie de cellen voorzichtig mengen met 10 ml medium om ze te resuspenderen en vervolgens centrifugeren bij 300xg gedurende 3 minuten. Gooi het supernatant weg, resuspendeer de cellen in vers medium en breng ze over in nieuwe kolven die al vers medium bevatten.

Zaaidichtheid	0,5 tot 1 x 10^4 cellen/cm^2
Vloeistofverversing	2 tot 3 keer per week
Herstel na ontdooiing	Cellen herstellen binnen 24 uur van invriezen.

Ontdooien en kweken

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KWALITEITSCONTROLE EN CRYOPRESERVATIE

Onvruchtbaarheid

Mycoplasmaverontreiniging wordt uitgesloten met zowel PCR-gebaseerde testen als op luminescentie gebaseerde mycoplasmadetectiemethoden.
Om er zeker van te zijn dat er geen besmetting is met bacteriën, schimmels of gisten, worden de celculturen dagelijks onderworpen aan visuele inspecties.

Kweekmedium invriezen	Als cryoconserveringsmedium gebruiken we volledig groeimedium (inclusief FBS) + 10% DMSO voor voldoende levensvatbaarheid na het ontdooien, of CM-1 (Cytion catalogusnummer 800100), dat geoptimaliseerde osmoprotectanten en metabolische stabilisatoren bevat om het herstel te verbeteren en door cryo geïnduceerde stress te verminderen.

Opslagvoorwaarden

Voor langdurige bewaring plaatst u flesjes in vloeibare stikstof in dampfase bij ongeveer -150 tot -196 °C. Opslag bij -80 °C is alleen aanvaardbaar als korte tussenstap vóór overbrenging naar vloeibare stikstof.

Verzendvoorwaarden

Gecryopreserveerde cellijnen worden verzonden op droog ijs in gevalideerde, geïsoleerde verpakkingen met voldoende koelmiddel om gedurende het transport ongeveer -78 °C te handhaven. Inspecteer de verpakking onmiddellijk na ontvangst en breng de flacons onverwijld over naar de juiste opslagplaats.

DONATEUR

Leeftijd van de donor	61 jaar
Etnische afkomst	Kaukasisch

JURIDISCHE EN VEILIGHEIDSASPECTEN

Veiligheidsmaatregelen

Wanneer men van plan is om een cryovial in vloeibare stikstof op te slaan om later te ontdooien, is het verplicht om strenge veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Passende beschermende handschoenen en kleding zijn essentieel en het gebruik van een gezichtsmasker of veiligheidsbril is vereist tijdens het overbrengen van bevroren monsters naar of uit de tank met vloeibare stikstof. Dit is om het risico op letsel door mogelijke cryoviale explosies bij het verwijderen te beperken, wat kan resulteren in de projectie van scherpe fragmenten.

Garantie

Bij Cytion staan we achter de kwaliteit en levensvatbaarheid van onze producten.
We garanderen dat onze cellen levensvatbaar zijn bij het begin van de kweek gedurende 60 dagen na verzending vanuit onze faciliteiten.
We verzekeren dat alle materialen voldoen aan de specificaties beschreven in het analysecertificaat en/of productblad
Raadpleeg voor volledige informatie onze <a href=""/Wie-zijn-wij/Garantie/"" hreflang=""x-default"">Garantieverklaring

Er is een overeenkomst inzake materiaaloverdracht vereist	Yes