خلايا HK-ZFN-AURKB-mEGFP

300173

خط الخلية HK-ZFN-AURKB-mEGFP هو نموذج خلية بشرية مُعدلة وراثياً مصممة للتعبير عن بروتين AURKB (AURora Kinase B) المدمج مع mEGFP باستخدام تقنية Zinc Finger Nuclease (ZFN). بروتين AURKB يلعب دورًا حاسمًا في فصل الكروموسومات الانقسامية والانقسام الخلوي وتنظيم نقطة تفتيش المغزل الانقسامي. يسمح الاندماج مع mEGFP بتصور نشاط AURKB وتوطينه داخل الخلية في الوقت الحقيقي، مما يسهل إجراء دراسات مفصلة لسلوكه الديناميكي أثناء انقسام الخلية.
يُستخدم هذا الخط الخلوي كأداة قوية للباحثين الذين يبحثون في الآليات الجزيئية للانقسام الانقسامي والوظائف المحددة لـ AURKB. يتيح دمج mEGFP إمكانية إجراء فحوصات قائمة على التألق والتصوير الحي للخلية، مما يوفر نظرة ثاقبة للتوزيع المكاني والزماني لـ AURKB. يضمن استخدام تقنية ZFN التكامل الجينومي الدقيق، والحفاظ على دقة تعبير AURKB. هذا النموذج ذو قيمة خاصة في أبحاث السرطان، حيث غالبًا ما يتم الإفراط في التعبير عن AURKB ويرتبط بتكوين الورم، مما يجعله هدفًا محتملاً للتدخلات العلاجية.

معلومات عامة

الوصف

خط الخلية HK-ZFN-AURKB-mEGFP هو نموذج خلية بشرية مُعدلة وراثياً مصممة للتعبير عن بروتين AURKB (AURora Kinase B) المدمج مع mEGFP باستخدام تقنية Zinc Finger Nuclease (ZFN). بروتين AURKB يلعب دورًا حاسمًا في فصل الكروموسومات الانقسامية والانقسام الخلوي وتنظيم نقطة تفتيش المغزل الانقسامي. يسمح الاندماج مع mEGFP بتصور نشاط AURKB وتوطينه داخل الخلية في الوقت الحقيقي، مما يسهل إجراء دراسات مفصلة لسلوكه الديناميكي أثناء انقسام الخلية.
يُستخدم هذا الخط الخلوي كأداة قوية للباحثين الذين يبحثون في الآليات الجزيئية للانقسام الانقسامي والوظائف المحددة لـ AURKB. يتيح دمج mEGFP إمكانية إجراء فحوصات قائمة على التألق والتصوير الحي للخلية، مما يوفر نظرة ثاقبة للتوزيع المكاني والزماني لـ AURKB. يضمن استخدام تقنية ZFN التكامل الجينومي الدقيق، والحفاظ على دقة تعبير AURKB. هذا النموذج ذو قيمة خاصة في أبحاث السرطان، حيث غالبًا ما يتم الإفراط في التعبير عن AURKB ويرتبط بتكوين الورم، مما يجعله هدفًا محتملاً للتدخلات العلاجية.

الأنسجة	باطن عنق الرحم
المرض	السرطان الغدي
موقع الانتشار	موقع الورم الأساسي (داخل عنق الرحم)

التطبيقات

بيولوجيا كيناز أوروراB (AURKB)؛ تصوير الكينازات أثناء الانقسام؛ فصل الكروموسومات؛ نقطة تفتيش المغزل؛ تصوير الخلايا الحية؛ التحقق من صحة بيولوجيا السرطان؛ تعديل الجينوم باستخدام ZFN

التصنيف

كائن حي	إنسان
الجنس	أنثى
خصائص النمو	الملتزم
حالة الكائنات المعدلة وراثيًا	GMO-S1

تفاصيل حالة الكائنات المعدلة وراثيًا

GMO-S1: This HeLa Kyoto line contains a ZFN-integrated mEGFP fusion at the endogenous AURKB locus for mitotic kinase imaging. This classification applies only within Germany and may differ elsewhere.

مستوى السلامة البيولوجية	1

الخصائص

المورفولوجيا	خلايا تشبه الخلايا الظهارية ذات الشكل الحجري الفسيفسائي
نوع الخلية	الخلايا الظهارية

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

المعرّفات

المرجع

HK-ZFN-ZFN-AURKB-mEGFP (كتالوج سيتيون رقم 300173)

رقم التعريف الضريبي لدى NCBI	9606
سيلوصور	CVCL_VL13
المودع	مختبر إلينبرغ (EMBL)

التعبير والقابلية للإصابة

المنتجات

EGFP (بروتين الفلورسنت الأخضر المحسن)

التعامل مع النباتات وزراعتها

وسط الاستزراع

DMEM، رقم المادة 820300 (من سايتيون a) ث: 1.0 مليمتر بيروفات الصوديوم، NaHCO3 ث: 4.5 جم/لتر جلوكوز، ث: 4 مليمتر جلوتامين، ث: 3.7 جم/لتر

بيئة الحضانة	37 درجة مئوية، و5% من ثاني أكسيد الكربون في جو مرطب.

المكملات الغذائية

قم بتزويد الوسط ب 10٪ من ال FBS

كاشف التفكك	أكوتاس

إعادة الاستنبات

استخدم 3-5 مل من T25، الذي يفتقر إلى الكالسيوم والمغنيسيوم. بالنسبة لقوارير PBS قم بإزالة الوسط القديم من الخلايا الملتصقة واغسلها باستخدام PBS، وبالنسبة لقوارير T75، استخدم 1-2 مل لقوارير T25 و2.5 مل لقوارير T75. ثم، قم بتغطية الخلايا بالكامل باستخدام أكوتاز، باستخدام 5-10 مل. دع الخلايا تحتضن في درجة حرارة الغرفة لمدة 8-10 دقائق لفصلها. بعد الحضانة، اخلط الخلايا برفق مع 10 مل من الوسط لإعادة ترسيبها، ثم اطردها مركزيًا بسرعة 300 xg لمدة 3 دقائق. تخلص من المادة الطافية، وأعد غمر الخلايا في وسط جديد وانقلها إلى قوارير جديدة تحتوي بالفعل على وسط جديد.

تجديد السوائل	إلى 3 مرات في الأسبوع 2

إذابة الثلج والزراعة

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

مراقبة الجودة والحفظ بالتبريد

العقم

وطرق الكشف عن الميكوبلازما القائمة على (PCR) يُستبعد التلوث بالميكوبلازما باستخدام كل من المقايسات القائمة على تفاعل البوليميراز المتسلسل التألق.
ولضمان عدم وجود تلوث بكتيري أو فطري أو خميرة يتم إخضاع مزارع الخلايا للفحص البصري اليومي.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

وسط التجميد	من أجل الحفاظ DMSO 10% + (FBS بما في ذلك) كوسيط للحفظ بالتبريد، نستخدم وسط نمو كامل والذي يتضمن مواد حماية ،(رقم Cytion 800100 كتالوج) CM-1 على حيوية كافية بعد ذوبان الجليد أو أسموزموبيروتيكتية ومثبتات أيضية مُحسّنة لتعزيز التعافي وتقليل الإجهاد الناجم عن التبريد.

شروط التخزين

للحفظ طويل الأمد، ضع القوارير في نيتروجين سائل في طور البخار عند درجة حرارة تتراوح بين -150 و -196 درجة مئوية تقريباً. يُقبل التخزين عند درجة حرارة -80 درجة مئوية فقط كخطوة مؤقتة قصيرة قبل النقل إلى النيتروجين السائل.

شروط الشحن

تُشحن خطوط الخلايا المحفوظة بالتبريد على ثلج جاف في عبوات معزولة وموثوقة مع مبرد كافٍ للحفاظ على درجة حرارة -78 درجة مئوية تقريبًا طوال فترة النقل. عند الاستلام، افحص الحاوية على الفور وانقل القوارير دون تأخير إلى المخزن المناسب.

المانح

عمر المتبرع	30 سنة
الأصل العرقي	أمريكي من أصل أفريقي

الشؤون القانونية والسلامة

احتياطات السلامة

عند التخطيط لتخزين القارورة المبردة في النيتروجين السائل لإذابتها في المستقبل، من الضروري الالتزام بتدابير السلامة الصارمة. من الضروري ارتداء قفازات وملابس واقية مناسبة، كما يلزم استخدام قناع الوجه أو نظارات السلامة أثناء نقل العينات المجمدة من خزان النيتروجين السائل أو إليه. وذلك للتخفيف من خطر الإصابة من الانفجارات المحتملة للنيتروجين المبرد عند الإزالة، والتي يمكن أن تؤدي إلى قذف شظايا حادة.

الضمان

في Cytion، نلتزم في Cytion بجودة منتجاتنا وحيويتها.
نحن نضمن أن تكون خلايانا قابلة للحياة في بداية الاستزراع لمدة 60 يومًا بعد الشحن من منشآتنا.
نؤكد أن جميع المواد مطابقة للمواصفات الموضحة في شهادة التحليل و/أو ورقة المنتج
بيان الضمان<a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">للحصول على التفاصيل الكاملة، يُرجى الرجوع إلى

تسري اتفاقيات الأطراف الثالثة	Yes