תאי HK-ZFN-AURKB-mEGFP

300173

קו התאים HK-ZFN-AURKB-mEGFP הוא מודל תאים אנושיים מהונדסים גנטית שנועד לבטא את החלבון AURKB (Aurora Kinase B) הממוזג עם mEGFP באמצעות טכנולוגיית Zinc Finger Nuclease (ZFN). AURKB (חלבון פלואורסצנטי ירוק משופר מונומרי) הוא סרין/תראונין קינאז הממלא תפקיד מרכזי בהפרדת כרומוזומים מיטוטיים, ציטוקינזה וויסות נקודת הבקרה של הציר המיטוטי. ההיתוך עם mEGFP מאפשר הדמיה בזמן אמת של פעילות AURKB ומיקומו בתוך התא, מה שמקל על מחקרים מפורטים של התנהגותו הדינמית במהלך חלוקת התא.
קו תאים זה משמש ככלי רב עוצמה לחוקרים הבוחנים את המנגנונים המולקולריים של המיטוזה ואת הפונקציות הספציפיות של AURKB-שילוב ה mEGFP. השימוש בטכנולוגיית ZFN במרחב ובזמן מאפשר ביצוע בדיקות מבוססות פלואורסצנציה והדמיה של תאים חיים, ומספק תובנות לגבי התפלגות לעתים קרובות AURKB מודל זה בעל ערך רב במיוחד במחקר הסרטן, שבו AURKB מבטיח אינטגרציה גנומית מדויקת, תוך שמירה על נאמנות הביטוי של מבוטא יתר על המידה וקשור להיווצרות גידולים, מה שהופך אותו ליעד פוטנציאלי להתערבויות טיפוליות.

GENERAL INFORMATION

Description

קו התאים HK-ZFN-AURKB-mEGFP הוא מודל תאים אנושיים מהונדסים גנטית שנועד לבטא את החלבון AURKB (Aurora Kinase B) הממוזג עם mEGFP באמצעות טכנולוגיית Zinc Finger Nuclease (ZFN). AURKB (חלבון פלואורסצנטי ירוק משופר מונומרי) הוא סרין/תראונין קינאז הממלא תפקיד מרכזי בהפרדת כרומוזומים מיטוטיים, ציטוקינזה וויסות נקודת הבקרה של הציר המיטוטי. ההיתוך עם mEGFP מאפשר הדמיה בזמן אמת של פעילות AURKB ומיקומו בתוך התא, מה שמקל על מחקרים מפורטים של התנהגותו הדינמית במהלך חלוקת התא.
קו תאים זה משמש ככלי רב עוצמה לחוקרים הבוחנים את המנגנונים המולקולריים של המיטוזה ואת הפונקציות הספציפיות של AURKB-שילוב ה mEGFP. השימוש בטכנולוגיית ZFN במרחב ובזמן מאפשר ביצוע בדיקות מבוססות פלואורסצנציה והדמיה של תאים חיים, ומספק תובנות לגבי התפלגות לעתים קרובות AURKB מודל זה בעל ערך רב במיוחד במחקר הסרטן, שבו AURKB מבטיח אינטגרציה גנומית מדויקת, תוך שמירה על נאמנות הביטוי של מבוטא יתר על המידה וקשור להיווצרות גידולים, מה שהופך אותו ליעד פוטנציאלי להתערבויות טיפוליות.

Tissue	צוואר הרחם
Disease	אדנוקרצינומה
Metastatic site	מיקום הגידול הראשוני (חלקו הפנימי של צוואר הרחם)

Applications

הדמיה של קינאז במיטוזיס; הפרדת כרומוזומים; נקודת הבקרה של הציר; הדמיה של תאים חיים; אימות עריכת ביולוגיה של קינאז Aurora B (AURKB); גנום באמצעות ZFN; ביולוגיה של הסרטן

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Female
Growth properties	Adherent
GMO status	GMO-S1

GMO status details

GMO-S1: This HeLa Kyoto line contains a ZFN-integrated mEGFP fusion at the endogenous AURKB locus for mitotic kinase imaging. This classification applies only within Germany and may differ elsewhere.

Biosafety level	1

CHARACTERISTICS

Morphology	תאים דמויי אפיתל בצורת אבן פסיפס
Cell type	תאי אפיתל

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

IDENTIFIERS

Citation

HK-ZFN-AURKB-mEGFP (מספר קטלוגי Cytion 300173)

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_VL13
Depositor	מעבדת אלנברג (EMBL)

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Products

EGFP (חלבון פלואורסצנטי ירוק משופר)

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

DMEM, w: 4.5 g/L גלוקוז, w: 4 mM L-גלוטמין, w: 3.7 g/L NaHCO3, w: 1.0 mM נתרן פירובט (מספר קטלוגי Cytion 820300a)

Incubation atmosphere	37°C, 5%CO2, אווירה לחה.

Supplements

10% הוסף לתווך FBS

Dissociation reagent	אקוטאז

Subculturing

T75, ועבור בקבוקי PBS, השתמש ב-3-5 מ"ל T25, ללא סידן ומגנזיום. עבור בקבוקי PBS-הסר את המדיום הישן מהתאים הדבוקים ושטוף אותם ב
השאר את .T75 ו-2.5 מ"ל עבור בקבוקי T25 תוך שימוש ב-1-2 מ"ל עבור בקבוקי Accutase-השתמש ב-5-10 מ"ל. לאחר מכן, כסה את התאים לחלוטין ב
התאים לדגירה בטמפרטורת החדר למשך 8-10 דקות כדי לנתק אותם. לאחר הדגירה, ערבב בעדינות את התאים עם 10 מ"ל של מדיום כדי להחזיר אותם
למשך 3 דקות. השלך את הנוזל העליון, החזר את התאים לתמיסה במדיום טרי והעבר אותם לצלחות חדשות בxgלתמיסה, ואז סובב בצנטריפוגה ב-300
.שכבר מכילות מדיום טרי

Fluid renewal	עד 3 פעמים בשבוע 2

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

.ושיטות זיהוי מיקופלסמה מבוססות לומניסצנציה PCR זיהום במיקופלסמה נשלל באמצעות בדיקות מבוססות
.כדי להבטיח שאין זיהום חיידקי, פטרייתי או שמרי, תרבויות התאים עוברות בדיקות ויזואליות יומיות

Freeze medium	כדי להבטיח 10% DMSO + (FBS כולל) כמדיום לשימור בקירור, אנו משתמשים במדיום גידול מלא הכולל חומרים אוסמו- ,(Cytion 800100 מספר קטלוגי) CM-1 חיוניות נאותה לאחר ההפשרה, או מגנים ומייצבי מטבוליזם משופרים כדי לשפר את ההתאוששות ולהפחית את הלחץ הנגרם מהקפאה.

Storage conditions

לשימור לטווח ארוך, יש להניח את הבקבוקונים בחנקן נוזלי במצב של אדי בטמפרטורה של כ-150 עד 196 מעלות צלזיוס. אחסון בטמפרטורה של 80 מעלות צלזיוס מקובל רק כצעד ביניים קצר לפני העברה לחנקן נוזלי.

Shipping conditions

במהלך -Cשורות תאים שהוקפאו נשלחות בקרח יבש באריזה מאושרת ומבודדת עם כמות מספקת של חומר קירור כדי לשמור על טמפרטורה של כ-78°. ההובלה. עם קבלת המשלוח, יש לבדוק את המכל מיד ולהעביר את הבקבוקונים ללא דיחוי לאחסון מתאים.

DONOR

Donor age	שנה 30
Ethnicity	אפרו-אמריקאי

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

כאשר מתכננים לאחסן קריוביאל בחנקן נוזלי להפשרה עתידית, חובה להקפיד על אמצעי בטיחות מחמירים. יש להקפיד על שימוש בכפפות ובבגדים מגנים מתאימים, וכן על שימוש במסכת פנים או משקפי מגן בעת העברת דגימות קפואות אל מיכל החנקן הנוזלי או ממנו. זאת כדי להפחית את הסיכון לפציעה כתוצאה מפיצוץ אפשרי של הקריוביאל בעת הוצאתו, העלול לגרום להתזת רסיסים חדים.

Warranty

אנו עומדים מאחורי האיכות והכדאיות של המוצרים שלנו, ב-Cytion.
אנו מבטיחים שתאינו יהיו קיימים בתחילת התרבית למשך
60 יום לאחר המשלוח מהמתקנים שלנו.
אנו מבטיחים שכל החומרים תואמים למפרטים המתוארים
בתעודת הניתוח ו/או בדף המוצר.
לפרטים מלאים, אנא עיינו ב
הצהרת האחריות שלנו<a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">

Third-party agreements apply	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB