U2OS-CRISPR-NUP96-mEGFP-celler

300174

U-2 OS-CRISPR-NUP96-mEGFP er en genetisk modificeret cellelinje, der stammer fra den humane osteosarkom U-2 OS-forældrelinje. Denne cellelinje indeholder en målrettet indsættelse af det monomere Enhanced Green Fluorescent Protein (mEGFP)-tag ved NUP96-genet, opnået ved hjælp af CRISPR-Cas9-genredigeringsteknologien. NUP96, der er en del af kerneporekomplekset, er afgørende for nuklear transport, og dets fusion med mEGFP giver mulighed for realtidsvisualisering af kerneporedynamik under fluorescerende mikroskopi, hvilket giver værdifuld indsigt i nukleare transportmekanismer og nukleocytoplasmatisk handel.
Denne specifikke klon, nummereret 195, er blevet udvalgt for sit stabile udtryk af NUP96-mEGFP-fusionsproteinet og opretholder de typiske egenskaber ved U-2 OS-afstamningen, herunder en robust cytoskeletal struktur, som er kritisk i undersøgelser relateret til kræftcellemigration og metastase. Anvendelsen af CRISPR-teknologi sikrer præcis genredigering og minimerer off-target-effekter, som kan kompromittere integriteten af de eksperimentelle resultater. Dette gør U-2 OS-CRISPR-NUP96-mEGFP klon nr. 195 særligt nyttig til billeddannelsesteknikker med høj opløsning og detaljerede studier af cellearkitektur, hvilket hjælper med avanceret forskning i cellebiologi, kræftforskning og nukleare transportfænomener.

GENERELLE OPLYSNINGER

Beskrivelse

U-2 OS-CRISPR-NUP96-mEGFP er en genetisk modificeret cellelinje, der stammer fra den humane osteosarkom U-2 OS-forældrelinje. Denne cellelinje indeholder en målrettet indsættelse af det monomere Enhanced Green Fluorescent Protein (mEGFP)-tag ved NUP96-genet, opnået ved hjælp af CRISPR-Cas9-genredigeringsteknologien. NUP96, der er en del af kerneporekomplekset, er afgørende for nuklear transport, og dets fusion med mEGFP giver mulighed for realtidsvisualisering af kerneporedynamik under fluorescerende mikroskopi, hvilket giver værdifuld indsigt i nukleare transportmekanismer og nukleocytoplasmatisk handel.
Denne specifikke klon, nummereret 195, er blevet udvalgt for sit stabile udtryk af NUP96-mEGFP-fusionsproteinet og opretholder de typiske egenskaber ved U-2 OS-afstamningen, herunder en robust cytoskeletal struktur, som er kritisk i undersøgelser relateret til kræftcellemigration og metastase. Anvendelsen af CRISPR-teknologi sikrer præcis genredigering og minimerer off-target-effekter, som kan kompromittere integriteten af de eksperimentelle resultater. Dette gør U-2 OS-CRISPR-NUP96-mEGFP klon nr. 195 særligt nyttig til billeddannelsesteknikker med høj opløsning og detaljerede studier af cellearkitektur, hvilket hjælper med avanceret forskning i cellebiologi, kræftforskning og nukleare transportfænomener.

Væv	Knogle
Sygdom	Osteosarkom

KLASSIFICERING

Organisme	Menneske
Køn	Kvinde
Vækstegenskaber	Tilhænger
GMO-status	GMO-S1

Oplysninger om GMO-status

GMO-S1: This human osteosarcoma cell line (U2OS-CRISPR-NUP96-mEGFP, clone 195) contains a CRISPR-engineered NUP96-mEGFP fusion introduced via lentiviral delivery, enabling fluorescent tracking of nuclear pore complexes. The modification is stably integrated. This classification applies only within Germany and may differ elsewhere.

Biosikkerhedsniveau	1

EGENSKABER

Morfologi	Epitel-lignende

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

IDENTIFIKATORER

Kildehenvisning

U-2 OS-CRISPR-NUP96-mEGFP klon nr. 195 (Cytion katalognummer 300174)

NCBI-skattenummer	9606
Cellosaurus	CVCL_B7FJ
Indskyder	Ellenberg-laboratoriet (EMBL)

UDTRYK OG MODTAGELIGHED

Proteinekspression

MEGFP (kerneporekompleks-protein 96, mEGFP-mærket)

HÅNDTERING OG OPDRÆT

Næringsmedium

McCoys 5a, w: 3,0 g/L Glukose, w: stabil Glutamin, w: 2,0 mM Natriumpyruvat, w: 2,2 g/L NaHCO3 (Cytion artikelnummer 820200a)

Inkubationsatmosfære	37°C, 5%CO2, befugtet atmosfære.

Kosttilskud

Suppler mediet med 10% FBS, 1% NEAA

Dissociationsreagens	Accutase

Oddyrkning

Fjern det gamle medium fra de klæbende celler, og vask dem med PBS, der ikke indeholder calcium og magnesium. Brug 3-5 ml PBS til T25-kolber og 5-10 ml til T75-kolber. Dæk derefter cellerne helt med Accutase, brug 1-2 ml til T25-kolber og 2,5 ml til T75-kolber. Lad cellerne inkubere ved stuetemperatur i 8-10 minutter for at løsne dem. Efter inkubationen blandes cellerne forsigtigt med 10 ml medium for at resuspendere dem, og centrifugeres derefter ved 300xg i 3 minutter. Kassér supernatanten, resuspender cellerne i frisk medium, og overfør dem til nye kolber, der allerede indeholder frisk medium.

Såtæthed	2 til 3 x 10^4 celler/cm^2
Væskeudskiftning	2 til 3 gange om ugen

Optøning og dyrkning

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROL OG KRYOPRÆSERVERING

Sterilitet

Mycoplasma-kontaminering udelukkes ved hjælp af både PCR-baserede assays og luminescensbaserede mycoplasma-detektionsmetoder. For at sikre, at der ikke er nogen bakterie-, svampe- eller gærforurening, underkastes cellekulturerne daglige visuelle inspektioner.

Frysemedium	Som kryopræserveringsmedium bruger vi komplet vækstmedium (inklusive FBS) + 10 % DMSO for tilstrækkelig levedygtighed efter optøning eller CM-1 (Cytion-katalognummer 800100), som indeholder optimerede osmobeskyttende stoffer og metaboliske stabilisatorer for at forbedre genopretningen og reducere kryo-induceret stress.

Opbevaringsbetingelser

For langtidsopbevaring anbringes hætteglas i flydende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Opbevaring ved -80 °C er kun acceptabelt som et kort mellemtrin før overførsel til flydende nitrogen.

Leveringsbetingelser

Kryopræserverede cellelinjer sendes på tøris i valideret, isoleret emballage med tilstrækkeligt kølemiddel til at opretholde ca. -78 °C under hele transporten. Ved modtagelse skal beholderen straks inspiceres, og hætteglassene skal straks overføres til passende opbevaring.

DONOR

Donorens alder	15 år
Etnisk tilhørsforhold	Kaukasisk

JURIDISKE FORHOLD OG SIKKERHED

Sikkerhedsforanstaltninger

Når man planlægger at opbevare et kryovæske i flydende nitrogen med henblik på fremtidig optøning, er det obligatorisk at overholde strenge sikkerhedsforanstaltninger. Passende beskyttelseshandsker og -tøj er afgørende, og der skal bruges ansigtsmaske eller sikkerhedsbriller under overførslen af frosne prøver til eller fra tanken med flydende nitrogen. Dette er for at mindske risikoen for skader fra potentielle kryovæskeeksplosioner ved fjernelse, som kan resultere i projektion af skarpe fragmenter.

Garanti

Hos Cytion står vi inde for vores produkters kvalitet og levedygtighed.
Vi garanterer, at vores celler vil være levedygtige ved kulturens start i 60 dage efter afsendelse fra vores faciliteter.
Vi sikrer, at alle materialer er i overensstemmelse med de specifikationer, der er beskrevet i analysecertifikatet og/eller produktarket
For alle detaljer henvises til vores <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantierklæring

Der gælder aftaler med tredjeparter	Yes