Células U2OS-CRISPR-NUP96-mEGFP

300174

A U-2 OS-CRISPR-NUP96-mEGFP é uma linhagem celular geneticamente modificada derivada da linhagem-mãe U-2 OS de osteossarcoma humano. Essa linha celular incorpora uma inserção direcionada da marca monomérica da Proteína Fluorescente Verde Aprimorada (mEGFP) no locus do gene NUP96, obtida por meio da tecnologia de edição genética CRISPR-Cas9. O NUP96, que faz parte do complexo de poros nucleares, é essencial para o transporte nuclear, e sua fusão com a mEGFP permite a visualização em tempo real da dinâmica dos poros nucleares sob microscopia de fluorescência, fornecendo informações valiosas sobre os mecanismos de transporte nuclear e o tráfego nucleocitoplasmático.
Este clone específico, numerado 195, foi selecionado por sua expressão estável da proteína de fusão NUP96-mEGFP e mantém as características típicas da linhagem U-2 OS, incluindo uma estrutura citosquelética robusta, que é fundamental em estudos relacionados à migração e metástase de células cancerosas. A aplicação da tecnologia CRISPR garante a edição precisa de genes, minimizando efeitos fora do alvo que poderiam comprometer a integridade dos resultados experimentais. Isso torna o clone U-2 OS-CRISPR-NUP96-mEGFP nº 195 particularmente útil para técnicas de imagem de alta resolução e estudos detalhados da arquitetura celular, auxiliando em pesquisas avançadas em biologia celular, pesquisa sobre o câncer e fenômenos de transporte nuclear.

GENERAL INFORMATION

Description

A U-2 OS-CRISPR-NUP96-mEGFP é uma linhagem celular geneticamente modificada derivada da linhagem-mãe U-2 OS de osteossarcoma humano. Essa linha celular incorpora uma inserção direcionada da marca monomérica da Proteína Fluorescente Verde Aprimorada (mEGFP) no locus do gene NUP96, obtida por meio da tecnologia de edição genética CRISPR-Cas9. O NUP96, que faz parte do complexo de poros nucleares, é essencial para o transporte nuclear, e sua fusão com a mEGFP permite a visualização em tempo real da dinâmica dos poros nucleares sob microscopia de fluorescência, fornecendo informações valiosas sobre os mecanismos de transporte nuclear e o tráfego nucleocitoplasmático.
Este clone específico, numerado 195, foi selecionado por sua expressão estável da proteína de fusão NUP96-mEGFP e mantém as características típicas da linhagem U-2 OS, incluindo uma estrutura citosquelética robusta, que é fundamental em estudos relacionados à migração e metástase de células cancerosas. A aplicação da tecnologia CRISPR garante a edição precisa de genes, minimizando efeitos fora do alvo que poderiam comprometer a integridade dos resultados experimentais. Isso torna o clone U-2 OS-CRISPR-NUP96-mEGFP nº 195 particularmente útil para técnicas de imagem de alta resolução e estudos detalhados da arquitetura celular, auxiliando em pesquisas avançadas em biologia celular, pesquisa sobre o câncer e fenômenos de transporte nuclear.

Tissue	Osso
Disease	Osteossarcoma

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Female
Growth properties	Adherent
GMO status	GMO-S1

GMO status details

GMO-S1: This human osteosarcoma cell line (U2OS-CRISPR-NUP96-mEGFP, clone 195) contains a CRISPR-engineered NUP96-mEGFP fusion introduced via lentiviral delivery, enabling fluorescent tracking of nuclear pore complexes. The modification is stably integrated. This classification applies only within Germany and may differ elsewhere.

Biosafety level	1

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

CHARACTERISTICS

Morphology	De tipo epitelial

IDENTIFIERS

Citation

Clone U-2 OS-CRISPR-NUP96-mEGFP nº 195 (número de catálogo da Cytion 300174)

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_B7FJ
Depositor	Laboratório Ellenberg (EMBL)

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Protein expression

MEGFP (proteína 96 do complexo de poros nucleares, marcada com mEGFP)

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

McCoys 5a, p: 3,0 g/L de glicose, p: glutamina estável, p: 2,0 mM de piruvato de sódio, p: 2,2 g/L de $NaHCO_3$ (número de artigo da Cytion 820200a)

Incubation atmosphere	37 °C, 5% de CO_2, atmosfera umidificada.

Supplements

Adicione ao meio 10% de FBS e 1% de NEAA

Dissociation reagent	Accutase

Subculturing

Remova o meio antigo das células aderentes e lave-as com PBS sem cálcio nem magnésio. Para frascos T25, use 3 a 5 ml de PBS; para frascos T75, use 5 a 10 ml. Em seguida, cubra as células completamente com Accutase, utilizando 1 a 2 ml para frascos T25 e 2,5 ml para frascos T75. Deixe as células incubarem à temperatura ambiente por 8 a 10 minutos para que se desprendam. Após a incubação, misture delicadamente as células com 10 ml de meio para ressuspender, depois centrifugue a 300xg por 3 minutos. Descarte o sobrenadante, ressuspenda as células em meio fresco e transfira-as para novos frascos que já contenham meio fresco.

Seeding density	2 a 3 × 10^4 células/cm^2
Fluid renewal	2 a 3 vezes por semana

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

A contaminação por micoplasma é descartada por meio de ensaios baseados em PCR e de métodos de detecção de micoplasma baseados em luminescência.
Para garantir que não haja contaminação por bactérias, fungos ou leveduras, as culturas celulares são submetidas a inspeções visuais diárias.

Freeze medium	Como meio de criopreservação, utilizamos meio de crescimento completo (incluindo FBS) + 10% de DMSO para garantir viabilidade adequada após o descongelamento, ou CM-1 (número de catálogo da Cytion 800100), que inclui osmoprotetores e estabilizadores metabólicos otimizados para melhorar a recuperação e reduzir o estresse induzido pela criopreservação.

Storage conditions

Para preservação a longo prazo, coloque os frascos em nitrogênio líquido em fase de vapor a uma temperatura entre aproximadamente −150 e −196 °C. O armazenamento a −80 °C é aceitável apenas como uma etapa intermediária de curta duração antes da transferência para o nitrogênio líquido.

Shipping conditions

As linhagens celulares criopreservadas são enviadas em gelo seco, em embalagens isoladas e validadas, com refrigerante suficiente para manter a temperatura em aproximadamente −78 °C durante todo o transporte. Ao receber a remessa, inspecione o recipiente imediatamente e transfira os frascos sem demora para o local de armazenamento adequado.

DONOR

Donor age	15 anos
Ethnicity	caucasiano

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

Ao planejar o armazenamento de um criotubo em nitrogênio líquido para descongelamento futuro, é obrigatório seguir medidas de segurança rigorosas. É essencial o uso de luvas e roupas de proteção adequadas, além do uso obrigatório de máscara facial ou óculos de proteção durante a transferência de amostras congeladas para dentro ou para fora do tanque de nitrogênio líquido. Isso visa mitigar o risco de ferimentos decorrentes de possíveis explosões dos criotubos durante a remoção, o que pode resultar na projeção de fragmentos pontiagudos.

Warranty

Na Cytion, garantimos a qualidade e a viabilidade de nossos produtos.
Garantimos que nossas células permanecerão viáveis no início da cultura por
60 dias após o envio de nossas instalações.
Asseguramos que todos os materiais estão em conformidade com as especificações descritas no
Certificado de Análise e/ou na Ficha Técnica do Produto.
Para obter todos os detalhes, consulte nossa
Declaração de Garantia.

Third-party agreements apply	Yes