# Células FO-1 (MEL-CLS-1)

300175

La línea celular FO-1, también conocida como MEL-CLS-1, es una línea de melanoma amelanótico humano derivada de un lugar metastásico, concretamente el ganglio linfático ilíaco de un paciente caucásico. Esta línea celular se estableció a partir de un xenoinjerto, lo que garantiza aún más su utilidad en la investigación centrada en el melanoma metastásico. El melanoma amelanótico, del que procede la FO-1, se caracteriza por la ausencia de pigmento de melanina, lo que la hace especialmente valiosa para estudiar subtipos de melanoma que carecen de la pigmentación típica asociada a estos tumores.
La línea celular FO-1 presenta un tiempo de duplicación de aproximadamente 38 horas, especialmente a partir del 49º pasaje. Esta tasa de crecimiento relativamente rápida la hace adecuada para experimentos que requieren una rápida proliferación celular. Las células FO-1 son conocidas por su sensibilidad diferencial a diversos tratamientos, incluida su capacidad de respuesta a los efectos diferenciadores y antiproliferativos del interferón-beta (IFN-β) y el 12-O-tetradecanoil-forbol-13-acetato (TPA), lo que las convierte en un modelo fundamental para estudiar la modulación de los antígenos asociados al melanoma y la expresión de antígenos HLA en diversas condiciones experimentales.

## INFORMACIÓN GENERAL

### Descripción

La línea celular FO-1, también conocida como MEL-CLS-1, es una línea de melanoma amelanótico humano derivada de un lugar metastásico, concretamente el ganglio linfático ilíaco de un paciente caucásico. Esta línea celular se estableció a partir de un xenoinjerto, lo que garantiza aún más su utilidad en la investigación centrada en el melanoma metastásico. El melanoma amelanótico, del que procede la FO-1, se caracteriza por la ausencia de pigmento de melanina, lo que la hace especialmente valiosa para estudiar subtipos de melanoma que carecen de la pigmentación típica asociada a estos tumores.
La línea celular FO-1 presenta un tiempo de duplicación de aproximadamente 38 horas, especialmente a partir del 49º pasaje. Esta tasa de crecimiento relativamente rápida la hace adecuada para experimentos que requieren una rápida proliferación celular. Las células FO-1 son conocidas por su sensibilidad diferencial a diversos tratamientos, incluida su capacidad de respuesta a los efectos diferenciadores y antiproliferativos del interferón-beta (IFN-β) y el 12-O-tetradecanoil-forbol-13-acetato (TPA), lo que las convierte en un modelo fundamental para estudiar la modulación de los antígenos asociados al melanoma y la expresión de antígenos HLA en diversas condiciones experimentales.

| | |
|---|---|
| **Pañuelo de papel** | Piel |
| **Enfermedad** | Melanoma amelanótico |
| **Lugar de metástasis** | Ganglio linfático ilíaco |

### Sinónimos

- FO-1
- FO #1
- FO 1
- MEL-CLS-1

## CLASIFICACIÓN

| | |
|---|---|
| **Organismo** | Humano |
| **Sexo** | Mujer |
| **Propiedades de crecimiento** | Adherente |
| **Nivel de bioseguridad** | 1 |

## CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Tumorigénico** | Sí, en ratones desnudos |

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

**Cariotipo**

Número modal 51, intervalo 38-56

## IDENTIFICADORES

**Referencia**

FO-1 (MEL-CLS-1) (número de catálogo de Cytion 300175)

| | |
|---|---|
| **N.º de identificación fiscal del NCBI** | 9606 |
| **Cellosaurus** | CVCL_5619 |

## EXPRESIÓN Y SUSCEPTIBILIDAD

**Expresión de proteínas**

P53(+)

**Perfil mutacional**

BRAF V600Emut

**Virus**

Negativo para: Sendai, Ectromelia, Polyoma, K-Virus, Kilham, Reo 3, PVM, LCM, M.pulmonis, MVM, Theiler's GD VII, Toolan's H-1, MHV, LDV, RCV/SDA, M-Adenovirus, B.piliformis.

## MANEJO Y CULTIVO

**Medio de cultivo**

DMEM, w: 4,5 g/L de glucosa, w: 4 mM de L-glutamina, w: 3,7 g/L de NaHCO3, w: 1,0 mM de piruvato sódico (número de artículo de Cytion 820300a)

| | |
|---|---|
| **Atmósfera de incubación** | 37°C, 5%CO2, atmósfera humidificada. |

**Suplementos**

Complementar el medio con un 10% de FBS

| | |
|---|---|
| **Reactivo de disociación** | Accutase |

**Subcultivo**

Retire el medio antiguo de las células adheridas y lávelas con PBS que carezca de calcio y magnesio. Para matraces T25, utilice 3-5 ml de PBS, y para matraces T75, utilice 5-10 ml. A continuación, cubra completamente las células con Accutase, utilizando 1-2 ml para matraces T25 y 2,5 ml para matraces T75. Deje incubar las células a temperatura ambiente durante 8-10 minutos para desprenderlas. Tras la incubación, mezclar suavemente las células con 10 ml de medio para resuspenderlas y, a continuación, centrifugar a 300xg durante 3 minutos. Desechar el sobrenadante, resuspender las células en medio fresco y transferirlas a nuevos matraces que ya contengan medio fresco.

| | |
|---|---|
| **Densidad de siembra** | 1 x $10^4$ células/$cm^2$ |
| **Renovación de fluidos** | Cada 3 días |
| **Recuperación tras la descongelación** | Después de descongelar, siembre las células a 5 x $10^4$ células/$cm^2$ y deje que las células se recuperen del proceso de congelación y se adhieran durante al menos 24 horas. |

### Descongelación y cultivo

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

## CONTROL DE CALIDAD Y CRIOPRESERVACIÓN

### Esterilidad

La contaminación por micoplasma se excluye utilizando tanto ensayos basados en la PCR como métodos de detección de micoplasma basados en la luminiscencia.
Para garantizar la ausencia de contaminación bacteriana, fúngica o por levaduras, los cultivos celulares se someten a inspecciones visuales diarias.

| | |
|---|---|
| **Medio de congelación** | Como medio de criopreservación, utilizamos el medio de crecimiento completo (incluido FBS) + 10% DMSO para una viabilidad adecuada tras la descongelación, o CM-1 (número de catálogo 800100 de Cytion), que incluye osmoprotectores optimizados y estabilizadores metabólicos para mejorar la recuperación y reducir el estrés crioinducido. |

### Condiciones de almacenamiento

Para la conservación a largo plazo, colocar los viales en nitrógeno líquido en fase vapor a una temperatura aproximada de -150 a -196 °C. El almacenamiento a -80 °C sólo es aceptable como breve paso intermedio antes de la transferencia al nitrógeno líquido.

### Condiciones de envío

Las líneas celulares crioconservadas se envían en hielo seco en envases validados y aislados con suficiente refrigerante para mantener aproximadamente -78 °C durante el tránsito. A la recepción, inspeccione el envase inmediatamente y transfiera los viales sin demora al almacenamiento adecuado.

## DONANTE

| | |
|---|---|
| **Edad del donante** | 54 años |
| **Origen étnico** | Caucásico |

## ASPECTOS LEGALES Y DE SEGURIDAD

### Medidas de seguridad

Cuando se planea almacenar un criovial en nitrógeno líquido para su futura descongelación, es obligatorio cumplir estrictas medidas de seguridad. Es esencial utilizar guantes y ropa de protección adecuados, así como una mascarilla o gafas de seguridad durante el traslado de muestras congeladas desde o hacia el tanque de nitrógeno líquido. Con ello se pretende mitigar el riesgo de lesiones por posibles explosiones crioviales al extraerlas, que pueden dar lugar a la proyección de fragmentos afilados.

### Garantía

En Cytion, respaldamos la calidad y viabilidad de nuestros productos.
Garantizamos que nuestras células serán viables al inicio del cultivo durante los 60 días posteriores al envío desde nuestras instalaciones.
Aseguramos que todos los materiales se ajustan a las especificaciones descritas en el Certificado de Análisis y/o Hoja de Producto
Para más información, consulte nuestra <a href=""/Quiénes somos/Garantía/"" hreflang=""x-default"">Declaración de garantía

| | |
|---|---|
| **Se requiere un acuerdo de transferencia de material** | Yes |