FO-1(MEL-CLS-1) □포

300175

MEL-CLS-1□라고도 하는 FO-1 세포주는 전□ 부위, 특히 백인 환자의 장골 림프절에서 추출한 인간 흑색종 세포주입니다. □ 세포주는 □종 □식을 통해 확립되었기 때문에 전□성 흑색종에 초점을 맞춘 연구에서 유용성□ 더욱 보장됩니다. FO-1□ 유래한 흑색 종은 멜라닌 색소가 없는 것□ 특징□며, □러한 종양과 관련된 전형적인 색소 침착□ 없는 흑색 종 아형을 연구하는 데 특히 유용합니다.

FO-1 세포주는 약 38시간에 걸쳐 2배로 증식하며, 특히 49번째 통과에서 두드러지게 나타납니다. □ 비교적 빠른 성장 속도는 빠른 세포 증식□ 필요한 실험에 적합합니다. FO-1 세포는 인터페론 베타(IFN-β) 및 12-O-테트라데카노일-포볼-13-아세테□트(TPA)의 분화 및 항증식 효과에 대한 반응성을 포함하여 다양한 치료에 대한 차별적 민감성으로 알려져 있어 다양한 실험 조건에서 흑색종 관련 항원 및 HLA 항원 발현의 조절을 연구하는 중요한 모델로 사용됩니다.

일반 정보

□명

MEL-CLS-1□라고도 하는 FO-1 세포주는 전□ 부위, 특히 백인 환자의 장골 림프절에서 추출한 인간 흑색종 세포주입니다. □ 세포주는 □종 □식을 통해 확립되었기 때문에 전□성 흑색종에 초점을 맞춘 연구에서 유용성□ 더욱 보장됩니다. FO-1□ 유래한 흑색 종은 멜라닌 색소가 없는 것□ 특징□며, □러한 종양과 관련된 전형적인 색소 침착□ 없는 흑색 종 아형을 연구하는 데 특히 유용합니다.

FO-1 세포주는 약 38시간에 걸쳐 2배로 증식하며, 특히 49번째 통과에서 두드러지게 나타납니다. □ 비교적 빠른 성장 속도는 빠른 세포 증식□ 필요한 실험에 적합합니다. FO-1 세포는 인터페론 베타(IFN-β) 및 12-O-테트라데카노일-포볼-13-아세테□트(TPA)의 분화 및 항증식 효과에 대한 반응성을 포함하여 다양한 치료에 대한 차별적 민감성으로 알려져 있어 다양한 실험 조건에서 흑색종 관련 항원 및 HLA 항원 발현의 조절을 연구하는 중요한 모델로 사용됩니다.

티슈	피부
질병	흑색종 흑색종
전이 부위	장골 림프절

동의어

- FO-1
- FO #1
- FO 1
- MEL-CLS-1

분류

생물체	인간
성	여성
성장 특성	준수자
생물안전 등급	1

특징

종양 유발성	예, 누드 마우스에서

염색체형

모달 번호 51, 범위 38-56

식별자

인용

FO-1(MEL-CLS-1)(사□티온 카탈로그 번호 300175)

NCBI 세금 식별번호	9606

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

셀로사우루스	CVCL_5619

발현 및 감수성

단백질 발현

P53(+)

돌연변이 프로파일

BRAF V600□뮤트

바이러스

음성: 센다□, 엑트로멜리아, 폴리오마, K-바□러스, 킬함, 레오 3, PVM, LCM, M.풀모니스, MVM, 테일러의 GD VII, 톨란의 H-1, MHV, LDV, RCV/SDA, M-아데노바□러스, B.필리포미스.

취급 및 배양

배지

DMEM, w: 4.5g/L 포도당, w: 4mM L-글루타민, w: 3.7g/L NaHCO3, w: 1.0mM 피루브산 나트륨(사□티온 제품 번호 820300a)

배양 조건	37°C, 5%CO2, 습한 대기.

건강보조식품

10% FBS로 배지를 보충합니다

분리 시약	아큐타제

재배양

부착된 세포에서 오래된 배지를 제거하고 칼슘과 마그네슘□ 없는 PBS로 세척합니다. T25 플라스크의 경우 3~5ml, T75 플라스크의 경우 5~10ml의 PBS를 사용합니다. 그런 다음 T25 플라스크의 경우 1~2㎖, T75 플라스크의 경우 2.5㎖를 사용하여 세포를 Accutase로 완전히 덮습니다. 세포를 분리하기 위해 실온에서 8~10분간 배양합니다. 배양 후 세포를 배지 10ml와 부드럽게 혼합하여 재부유시킨 다음 300xg에서 3분간 원심분리합니다. 상층액을 버리고 세포를 신선한 배지에 다시 부유시킨 후 □미 신선한 배지가 들어 있는 새 플라스크에 옮깁니다.

파종 밀도	1 x 10^4 세포/cm^2
유체 교체	3일마다
해동 후 회복	해동 후 세포를 5 x 10^4 세포/cm^2 농도로 배지에 접종하고, 동결 과정으로부터 회복 및 부착□ 완료될 때까지 최소 24시간 동안 배양합니다.

해동 및 배양

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

품질 관리 및 냉동 보존

불임

마□코플라스마 오염은 PCR 기반 분석법과 발광 기반 마□코플라스마 검출법을 모두 사용하여 배제합니다 .
박테리아, 곰팡□ 또는 효모 오염□ 없는지 확인하기 위해 세포 배양은 매일 육안 검사를 거칩니다.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

배양액 동결	냉동 보존 배지로는 해동 후 충분한 생존력을 위해 완전 성장 배지(FBS 포함) + 10% DMSO를 사용하거나, 최적화된 삼투 보호제 및 대사 안정제가 포함된 CM-1(Cytion 카탈로그 번호 800100)을 사용하여 회복력을 높□고 냉동으로 인한 스트레스를 줄입니다.

보관 조건

장기 보존을 위해서는 바□알을 약 -150°C에서 -196°C의 증기상 액체 질소에 넣으세요. 80°C에서 보관하는 것은 액체 질소로 옮기기 전 짧은 중간 단계로만 허용됩니다.

배송 조건

냉동 보존 세포주는 운송 중 약 -78°C를 유지할 수 있는 충분한 냉매가 포함된 검증된 단열 포장에 드라□아□스를 넣어 배송됩니다. 수령 즉시 용기를 검사하고 바□알을 지체 없□ 적절한 보관 장소로 옮깁니다.

기부자

기증자 연령	54년
민족	백인

법률 및 안전

안전 수칙

향후 해동을 위해 액체 질소에 냉동 보관을 계획하는 경우, 엄격한 안전 조치를 준수해야 합니다. 적절한 보호 장갑과 의복은 필수□며, 액체 질소 탱크로 냉동 샘플을 옮길 때는 반드시 안면 마스크나 보안경을 착용해야 합니다. □는 제거 시 날카로운 파편□ 튀어나올 수 있는 극저온 폭발로 인한 부상 위험을 줄□기 위한 것입니다.

보증

싸□티온은 제품의 품질과 생존력을 보증합니다.
당사는 당사 시설에서 배송된 후 60일 동안 배양 시작 시 세포가 생존할 수 있음을 보증합니다.
당사는 모든 재료가 분석 증명서 및/또는 제품 시트에 설명된 사양을 준수함을 보증합니다
자세한 내용은 <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">보증서 를 참조하시기 바랍니다

물질 이전 계약서**(MTA)**가 필요합니다**.**	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB