Celice FO-1 (MEL-CLS-1)

300175

Celična linija FO-1, znana tudi kot MEL-CLS-1, je linija človeškega amelanotskega melanoma, pridobljena iz metastatskega žarišča, zlasti iliakalnega bezgavke kavkaškega bolnika. Ta celična linija je bila pridobljena iz ksenografta, kar še dodatno zagotavlja njeno uporabnost v raziskavah metastatskega melanoma. Za amelanotični melanom, iz katerega izhaja FO-1, je značilno, da nima pigmenta melanina, zato je še posebej dragocen za preučevanje podtipov melanoma, ki nimajo značilne pigmentacije, povezane s temi tumorji.
Pri celični liniji FO-1 je podvojitveni čas približno 38 ur, kar je še posebej opazno pri 49. prehodu. Zaradi relativno hitre rasti je primerna za poskuse, ki zahtevajo hitro razmnoževanje celic. Celice FO-1 so znane po svoji različni občutljivosti na različna zdravljenja, vključno z odzivnostjo na diferenciacijske in antiproliferacijske učinke interferona beta (IFN-β) in 12-O-tetradekanoil-forbol-13-acetata (TPA), zato so ključni model za preučevanje modulacije z melanomom povezanih antigenov in izražanja antigenov HLA pod različnimi eksperimentalnimi pogoji.

SPLOŠNE INFORMACIJE

Opis

Celična linija FO-1, znana tudi kot MEL-CLS-1, je linija človeškega amelanotskega melanoma, pridobljena iz metastatskega žarišča, zlasti iliakalnega bezgavke kavkaškega bolnika. Ta celična linija je bila pridobljena iz ksenografta, kar še dodatno zagotavlja njeno uporabnost v raziskavah metastatskega melanoma. Za amelanotični melanom, iz katerega izhaja FO-1, je značilno, da nima pigmenta melanina, zato je še posebej dragocen za preučevanje podtipov melanoma, ki nimajo značilne pigmentacije, povezane s temi tumorji.
Pri celični liniji FO-1 je podvojitveni čas približno 38 ur, kar je še posebej opazno pri 49. prehodu. Zaradi relativno hitre rasti je primerna za poskuse, ki zahtevajo hitro razmnoževanje celic. Celice FO-1 so znane po svoji različni občutljivosti na različna zdravljenja, vključno z odzivnostjo na diferenciacijske in antiproliferacijske učinke interferona beta (IFN-β) in 12-O-tetradekanoil-forbol-13-acetata (TPA), zato so ključni model za preučevanje modulacije z melanomom povezanih antigenov in izražanja antigenov HLA pod različnimi eksperimentalnimi pogoji.

Tkivo	Koža
Bolezen	Amelanotični melanom
Mesto metastaze	Iliakalna bezgavka

Sinonimi

- FO-1
- FO #1
- FO 1
- MEL-CLS-1

RAZVRSTITEV

Organizem	Človek
Seks	Ženska
Lastnosti rasti	Pripadnik
Stopnja biološke varnosti	1

ZNAČILNOSTI

Tumorigeničen	Da, na golih miših

Kariotip

Modalna številka 51, razpon 38-56

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

IDENTIFIKATORJI

Navajanje vira

FO-1 (MEL-CLS-1) (kataloška številka Cytion 300175)

Davčna identifikacijska številka NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_5619

IZRAŽANJE IN DOVZETNOST

Ekspresija beljakovin

P53(+)

Profil mutacij

BRAF V600Emut

Virusi

Negativno za: M.pulmonis, MVM, Theiler's GD VII, Toolan's H-1, MHV, LDV, RCV/SDA, M-Adenovirus, B.piliformis.

RAVNANJE IN GOJENJE

Gojišče

DMEM, w: 4,5 g/L glukoze, w: 4 mM L-glutamina, w: 3,7 g/L NaHCO3, w: 1,0 mM natrijevega piruvata (številka izdelka Cytion 820300a)

Inkubacijska atmosfera	37 °C, 5 %CO2, vlažno ozračje.

Prehranska dopolnila

Gojišče dopolnite z 10 % FBS

Reagenca za disociacijo	Accutase

Preusmeritev v drugo kulturo

Odstranite staro gojišče z adherentnih celic in jih sperite s PBS, ki ne vsebuje kalcija in magnezija. Za bučke T25 uporabite 3-5 ml PBS, za bučke T75 pa 5-10 ml. Nato celice popolnoma prekrijte z Accutase, pri čemer uporabite 1-2 ml za bučke T25 in 2,5 ml za bučke T75. Celice pustite inkubirati pri sobni temperaturi 8-10 minut, da se ločijo. Po inkubaciji celice nežno premešajte z 10 ml gojišča, da se ponovno suspendirajo, nato jih 3 minute centrifugirajte pri 300xg. Zavrzite supernatant, ponovno suspendirajte celice v svežem gojišču in jih prenesite v nove bučke, ki že vsebujejo sveže gojišče.

Gostota setve	1 x 10^4 celic/cm^2
Obnova tekočine	Vsakih 3 dni
Obnova po odtaljevanju	Po odmrzovanju celice razporedite na ploščo v gostoti 5 x 10^4 celic/cm^2 in jim pustite, da si opomorejo od zamrzovanja in se prilepijo na ploščo, vsaj 24 ur.

Odtaljevanje in gojenje

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KAKOVOSTI IN KRIOPREZERVACIJA

Sterilnost

Kontaminacija z mikoplazmo se izključi z uporabo testov na podlagi PCR in metod za odkrivanje mikoplazme na podlagi luminiscence.
Da se zagotovi, da ni kontaminacije z bakterijami, glivami ali kvasovkami, se celične kulture dnevno vizualno pregledujejo.

Medij za zamrzovanje	Kot gojišče za kriokonzervacijo uporabljamo popolno rastno gojišče (vključno s FBS) + 10 % DMSO za ustrezno vitalnost po odmrznitvi ali CM-1 (kataloška številka 800100 podjetja Cytion), ki vključuje optimizirane osmoprotektante in presnovne stabilizatorje za izboljšanje okrevanja in zmanjšanje stresa, povzročenega s kriom.

Pogoji shranjevanja

Za dolgotrajno shranjevanje viale postavite v tekoči dušik v parni fazi pri približno -150 do -196 °C. Shranjevanje pri -80 °C je sprejemljivo le kot kratek vmesni korak pred prenosom v tekoči dušik.

Pogoji dostave

Kriokonzervirane celične linije se pošiljajo na suhem ledu v potrjeni, izolirani embalaži z zadostno količino hladilnega sredstva, da se med prevozom vzdržuje približno -78 °C. Ob prejemu takoj preglejte embalažo in viale nemudoma prenesite v ustrezno skladišče.

DONATOR

Starost darovalca	54 let
Etnična pripadnost	Kavkaški

PRAVNE ZADEVE IN VARNOST

Varnostni ukrepi

Pri načrtovanju shranjevanja kriovialov v tekočem dušiku za kasnejše odtaljevanje je treba obvezno upoštevati stroge varnostne ukrepe. Nujni so ustrezne zaščitne rokavice in oblačila, med prenosom zamrznjenih vzorcev v rezervoar s tekočim dušikom ali iz njega pa je potrebna uporaba obrazne maske ali zaščitnih očal. S tem se zmanjša tveganje poškodb zaradi morebitnih eksplozij kriovialov pri odstranjevanju, ki lahko povzročijo izstrelitev ostrih delcev.

Garancija

V podjetju Cytion stojimo za kakovostjo in uporabnostjo svojih izdelkov.
Zagotavljamo, da bodo naše celice ob začetku gojenja še 60 dni po odpremi iz naših obratov vitalne.
Zagotavljamo, da so vsi materiali skladni s specifikacijami, opisanimi v potrdilu o analizi in/ali listu izdelka
Za vse podrobnosti si oglejte našo <a href=""/Kdo smo/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garancijsko izjavo

Potreben je sporazum o prenosu materiala	Yes