NCI-H146 □胞

300182

NCI-H146 □胞系是 A.F. Gazdar 及其同事于 1979 年从一名肺小□胞癌患者的胸腔积液中提取的。骨髓标本是在治疗前采集的。

GENERAL INFORMATION

Description

NCI-H146 □胞系是 A.F. Gazdar 及其同事于 1979 年从一名肺小□胞癌患者的胸腔积液中提取的。骨髓标本是在治疗前采集的。

Tissue	肺部
Disease	小□胞癌
Metastatic site	骨髓

Synonyms

- H146
- H-146
- NCIH146

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Male
Growth properties	Suspension
Biosafety level	1

CHARACTERISTICS

Morphology	上皮样
Tumourigenic	在裸鼠体内形成可移植的肿瘤，在组织学上与原始活检标本中的肿瘤 □胞相似
Ploidy status	非整倍体
MSI status	稳定 (MSS)

Karyotype

这是一种接近三倍体的人类□胞系。染色体的模式数为 68，但也经常出现染色体数为 66、70 和 71 的□胞。在 QM 染色制备物中，X 染色体是成对的，没有检测到 Y 染色体。

IDENTIFIERS

Citation

NCI-H146（Cytion 目录号 300182）

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_1473

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Receptors expressed

胰岛素样生长因子 II 受体（IGF II）

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Protein expression

这些□胞的波形蛋白和角蛋白染色呈阳性，但神经丝三联蛋白染色呈阴性。

Antigen expression

该品系表达四种生化标记物的水平升高：神经元特异性烯醇化酶、脑肌酸激酶同工酶、 L-DOPA脱羧酶和轰击素样免疫反应性

Isoenzymes

G6PD，B，PGM1，1-2，PGM3，1-2，ES-D，1，Me-2，2，AK-1，1，GLO-1，1，表型频率乘积 = 0.0009

Products

□胞会产生相对较多的 c-myc mRNA，但 c-myc DNA 序列不会被扩增。□胞不表达血管加压素、催产素或胃泌素释放肽。

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

RPMI 1640，w：2.0 mM 稳定谷氨酰胺，w：2.0 g/L NaHCO3（Cytion 文章编号 820700a）。

Incubation atmosphere	37°C, 5%CO2, 加湿环境。

Supplements

在培养基中添加 10% 热灭活 FBS

Subculturing

应将部分悬浮液转移到预先注入新鲜培养基的新 □胞培养瓶中进行□胞亚培养。或者，也可以通过离心收集 □胞团，并重新悬浮在新鲜培养基中。

Seeding density	1至2×10^{5}个□胞/毫升
Fluid renewal	每周 2 至 3 次
Post-thaw recovery	解冻后，让□胞从冷冻过程中恢复至少 24 到 48 小时。

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

使用基于 PCR 的检测方法和基于发光的支原体检测方法排除支原体污染。
为确保没有□菌、真菌或酵母菌污染，每天都要对□胞培养物进行目视检查。

Freeze medium	我们使用完全生长培养基（包括 FBS）+10% DMSO 或 CM-1（Cytion 商品目录编号 800100）作为冷冻保存培养基，以获得足够的解冻后存活率，CM-1（Cytion 商品目录编号 800100）含有优化的渗透保护剂和代谢稳定剂，可提高恢复能力并减少冷冻引起的应激。

Storage conditions

如需长期保存，可将样品瓶放入气相液氮中，温度约为 -150 至 -196 ℃。在-80 °C下保存只能作为转入液氮前的短暂过渡。

Shipping conditions

冷冻保存的□胞系用干冰装运，并用经过验证的隔热包装和足够的制冷剂在整个运输过程中保持约 -78 °C 的温度。收到货后，应立即检查容器，并立即将小瓶转移到适当的储藏室。

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

DONOR

Donor age	59 岁
Ethnicity	高加索人

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

计划将低温样品储存在液氮中以便将来解冻时，必须遵守严格的安全措施。在将冷冻样本移入或移出液氮罐时，必须穿戴适当的防护手套和防护服，并使用面罩或安全护目镜。这样做是为了降低在移出时因冷冻样品爆炸而造成伤害的风险，因为爆炸可能导致锋利的碎片飞溅。

Warranty

在Cytion，我们保证产品的质量和活力。
我们保证，从我们的工厂发货后 60 天内，我们的□胞在开始培养时都是存活的。
我们保证所有材料均符合分析证书和/或产品说明书中描述的规格。
有关详□信息，请参阅我们的 <a href="" /Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">保修声明。

Material Transfer Agreement required	Yes