H-MESO-1-celler

300186

H-MESO-1-celler er en human mesotheliom-cellelinje, der stammer fra en patient med malignt pleuramesotheliom, en type kræft, der udvikler sig fra cellerne i lungernes eller underlivets beskyttende foring. Denne cellelinje bruges i vid udstrækning i onkologisk forskning til at studere biologi, patogenese og terapeutiske strategier for mesotheliom.

H-MESO-1-celler har flere karakteristika fra mesothelceller, hvilket gør dem til en relevant model til undersøgelse af mesotheliom. De udviser epithelioid morfologi, som er en af de almindelige histologiske typer af mesotheliom. Disse celler er særligt nyttige til at udforske de molekylære veje, der er involveret i udviklingen af mesotheliom, herunder regulering af cellecyklus, apoptoseresistens og den rolle, som asbest og andre miljøfaktorer spiller i fremkaldelsen af mesotheliom.

I forskningen er H-MESO-1-celler blevet brugt til at undersøge samspillet mellem mesotheliomceller og immunsystemet, især i betragtning af immunkontrolpunktmolekylernes og tumormikromiljøets indvirkning på tumorvækst og immununddragelse. Denne cellelinje er også værdifuld til at teste effekten af nye lægemidler og nye immunterapeutiske tilgange, der er rettet mod specifikke veje, som er involveret i mesothelioms progression.

Desuden bruges H-MESO-1-celler til at undersøge de genetiske og epigenetiske ændringer, der er karakteristiske for mesotheliom, hvilket giver indsigt i potentielle biomarkører til tidlig diagnose og mål for terapeutisk indgriben. Cellelinjens følsomhed over for kemoterapeutiske midler og dens evne til at danne tumorer i xenotransplantationsmodeller gør den til et afgørende redskab i udviklingen og valideringen af nye behandlingsmetoder for mesotheliom.

GENERELLE OPLYSNINGER

Beskrivelse

H-MESO-1-celler er en human mesotheliom-cellelinje, der stammer fra en patient med malignt pleuramesotheliom, en type kræft, der udvikler sig fra cellerne i lungernes eller underlivets beskyttende foring. Denne cellelinje bruges i vid udstrækning i onkologisk forskning til at studere biologi, patogenese og terapeutiske strategier for mesotheliom.

H-MESO-1-celler har flere karakteristika fra mesothelceller, hvilket gør dem til en relevant model til undersøgelse af mesotheliom. De udviser epithelioid morfologi, som er en af de almindelige histologiske typer af mesotheliom. Disse celler er særligt nyttige til at udforske de molekylære veje, der er involveret i udviklingen af mesotheliom, herunder regulering af cellecyklus, apoptoseresistens og den rolle, som asbest og andre miljøfaktorer spiller i fremkaldelsen af mesotheliom.

I forskningen er H-MESO-1-celler blevet brugt til at undersøge samspillet mellem mesotheliomceller og immunsystemet, især i betragtning af immunkontrolpunktmolekylernes og tumormikromiljøets indvirkning på tumorvækst og immununddragelse. Denne cellelinje er også værdifuld til at teste effekten af nye lægemidler og nye immunterapeutiske tilgange, der er rettet mod specifikke veje, som er involveret i mesothelioms progression.

Desuden bruges H-MESO-1-celler til at undersøge de genetiske og epigenetiske ændringer, der er karakteristiske for mesotheliom, hvilket giver indsigt i potentielle biomarkører til tidlig diagnose og mål for terapeutisk indgriben. Cellelinjens følsomhed over for kemoterapeutiske midler og dens evne til at danne tumorer i xenotransplantationsmodeller gør den til et afgørende redskab i udviklingen og valideringen af nye behandlingsmetoder for mesotheliom.

Væv	Lunge
Sygdom	Mesotheliom i lungehinden

Synonymer

- H-Meso-1
- HMESO-1
- HMeso-1
- HMeso1
- HMESO1
- H-Meso
- HMESO
- Hmeso
- Hmeso

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

KLASSIFICERING

Organisme	Menneske
Køn	Mand
Vækstegenskaber	Tilhænger
Biosikkerhedsniveau	1

EGENSKABER

Morfologi	Epitel-lignende
Tumorfremkaldende	Yeees, i nøgne mus

IDENTIFIKATORER

Kildehenvisning

H-MESO-1 (Cytion katalognummer 300186)

NCBI-skattenummer	9606
Cellosaurus	CVCL_5759

HÅNDTERING OG OPDRÆT

Næringsmedium

RPMI 1640, m: 2,0 mM stabil glutamin, m: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion artikelnummer 820700a)

Inkubationsatmosfære	37°C, 5%CO2, befugtet atmosfære.

Kosttilskud

Suppler mediet med 10% FBS

Dissociationsreagens	Accutase

Oddyrkning

Fjern det gamle medium fra de klæbende celler, og vask dem med PBS, der ikke indeholder calcium og magnesium. Brug 3-5 ml PBS til T25-kolber og 5-10 ml til T75-kolber. Dæk derefter cellerne helt med Accutase, brug 1-2 ml til T25-kolber og 2,5 ml til T75-kolber. Lad cellerne inkubere ved stuetemperatur i 8-10 minutter for at løsne dem. Efter inkubationen blandes cellerne forsigtigt med 10 ml medium for at resuspendere dem, og centrifugeres derefter ved 300xg i 3 minutter. Kassér supernatanten, resuspender cellerne i frisk medium, og overfør dem til nye kolber, der allerede indeholder frisk medium.

Såtæthed	1 x 10^4 celler/cm^2
Væskeudskiftning	Hver 5. til 7. dag
Genopretning efter optøning	Efter optøning skal cellerne udplades med 5 x 10^4 celler/cm^2, og cellerne skal have lov til at komme sig efter frysningsprocessen og hæfte sig fast i mindst 24 timer.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Optøning og dyrkning

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROL OG KRYOPRÆSERVERING

Sterilitet

Mycoplasma-kontaminering udelukkes ved hjælp af både PCR-baserede assays og luminescensbaserede mycoplasma-detektionsmetoder. For at sikre, at der ikke er nogen bakterie-, svampe- eller gærforurening, underkastes cellekulturerne daglige visuelle inspektioner.

Frysemedium	Som kryopræserveringsmedium bruger vi komplet vækstmedium (inklusive FBS) + 10 % DMSO for tilstrækkelig levedygtighed efter optøning eller CM-1 (Cytion-katalognummer 800100), som indeholder optimerede osmobeskyttende stoffer og metaboliske stabilisatorer for at forbedre genopretningen og reducere kryo-induceret stress.

Opbevaringsbetingelser

For langtidsopbevaring anbringes hætteglas i flydende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Opbevaring ved -80 °C er kun acceptabelt som et kort mellemtrin før overførsel til flydende nitrogen.

Leveringsbetingelser

Kryopræserverede cellelinjer sendes på tøris i valideret, isoleret emballage med tilstrækkeligt kølemiddel til at opretholde ca. -78 °C under hele transporten. Ved modtagelse skal beholderen straks inspiceres, og hætteglassene skal straks overføres til passende opbevaring.

DONOR

Donorens alder	35 år
Etnisk tilhørsforhold	Kaukasisk

JURIDISKE FORHOLD OG SIKKERHED

Sikkerhedsforanstaltninger

Når man planlægger at opbevare et kryovæske i flydende nitrogen med henblik på fremtidig optøning, er det obligatorisk at overholde strenge sikkerhedsforanstaltninger. Passende beskyttelseshandsker og -tøj er afgørende, og der skal bruges ansigtsmaske eller sikkerhedsbriller under overførslen af frosne prøver til eller fra tanken med flydende nitrogen. Dette er for at mindske risikoen for skader fra potentielle kryovæskeeksplosioner ved fjernelse, som kan resultere i projektion af skarpe fragmenter.

Garanti

Hos Cytion står vi inde for vores produkters kvalitet og levedygtighed.
Vi garanterer, at vores celler vil være levedygtige ved kulturens start i 60 dage efter afsendelse fra vores faciliteter.
Vi sikrer, at alle materialer er i overensstemmelse med de specifikationer, der er beskrevet i analysecertifikatet og/eller produktarket
For alle detaljer henvises til vores <a href="/Who-we-are/Warranty/" hreflang="x-default">Garantierklæring

Der kræves en aftale om overførsel af materiale	Yes