H-MESO-1-celler

300186

H-MESO-1-celler är en human mesoteliomcellinje som härrör från en patient med malignt pleuralt mesoteliom, en typ av cancer som utvecklas från cellerna i lungornas eller bukens skyddande hinna. Denna cellinje används i stor utsträckning inom onkologisk forskning för att studera biologi, patogenes och terapeutiska strategier för mesoteliom.

H-MESO-1-celler har flera egenskaper som kännetecknar mesotelceller, vilket gör dem till en relevant modell för att undersöka mesoteliom. De uppvisar epitelioid morfologi, vilket är en av de vanligaste histologiska typerna av mesoteliom. Dessa celler är särskilt användbara för att utforska de molekylära vägar som är involverade i utvecklingen av mesoteliom, inklusive cellcykelreglering, apoptosresistens och den roll som asbest och andra miljöfaktorer spelar för att framkalla mesoteliom.

Inom forskningen har H-MESO-1-celler använts för att studera samspelet mellan mesoteliomceller och immunsystemet, särskilt med tanke på den inverkan som immunkontrollpunktsmolekyler och tumörens mikromiljö har på tumörtillväxt och immunundvikande. Denna cellinje är också värdefull för att testa effekten av nya läkemedel och nya immunoterapeutiska metoder som riktar in sig på specifika vägar som är inblandade i mesoteliomets utveckling.

Dessutom används H-MESO-1-celler för att undersöka de genetiska och epigenetiska förändringar som är karakteristiska för mesoteliom, vilket ger insikter om potentiella biomarkörer för tidig diagnos och mål för terapeutisk intervention. Cellinjens känslighet för kemoterapeutiska medel och dess förmåga att bilda tumörer i xenograftmodeller gör den till ett viktigt verktyg för att utveckla och validera nya behandlingsmetoder för mesoteliom.

ALLMÄN INFORMATION

Beskrivning

H-MESO-1-celler är en human mesoteliomcellinje som härrör från en patient med malignt pleuralt mesoteliom, en typ av cancer som utvecklas från cellerna i lungornas eller bukens skyddande hinna. Denna cellinje används i stor utsträckning inom onkologisk forskning för att studera biologi, patogenes och terapeutiska strategier för mesoteliom.

H-MESO-1-celler har flera egenskaper som kännetecknar mesotelceller, vilket gör dem till en relevant modell för att undersöka mesoteliom. De uppvisar epitelioid morfologi, vilket är en av de vanligaste histologiska typerna av mesoteliom. Dessa celler är särskilt användbara för att utforska de molekylära vägar som är involverade i utvecklingen av mesoteliom, inklusive cellcykelreglering, apoptosresistens och den roll som asbest och andra miljöfaktorer spelar för att framkalla mesoteliom.

Inom forskningen har H-MESO-1-celler använts för att studera samspelet mellan mesoteliomceller och immunsystemet, särskilt med tanke på den inverkan som immunkontrollpunktsmolekyler och tumörens mikromiljö har på tumörtillväxt och immunundvikande. Denna cellinje är också värdefull för att testa effekten av nya läkemedel och nya immunoterapeutiska metoder som riktar in sig på specifika vägar som är inblandade i mesoteliomets utveckling.

Dessutom används H-MESO-1-celler för att undersöka de genetiska och epigenetiska förändringar som är karakteristiska för mesoteliom, vilket ger insikter om potentiella biomarkörer för tidig diagnos och mål för terapeutisk intervention. Cellinjens känslighet för kemoterapeutiska medel och dess förmåga att bilda tumörer i xenograftmodeller gör den till ett viktigt verktyg för att utveckla och validera nya behandlingsmetoder för mesoteliom.

Vävnad	Lungan
Sjukdom	Pleuralt mesoteliom

Synonymer

- H-Meso-1
- HMESO-1
- HMeso-1
- HMeso1
- HMESO1
- H-Meso
- HMESO
- Hmeso
- Hmeso

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

KLASSIFICERING

Organism	Människa
Kön	Man
Tillväxtegenskaper	Följsam
Biosäkerhetsnivå	1

EGENSKAPER

Morfologi	Epitelliknande
Tumörframkallande	Ja, i nakna möss

IDENTIFIERARE

Källa

H-MESO-1 (Cytion katalognummer 300186)

NCBI-skattenummer	9606
Cellosaurus	CVCL_5759

HANTERING OCH ODLING

Odlingsmedium

RPMI 1640, med: 2,0 mM stabilt glutamin, med: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion artikelnummer 820700a)

Inkubationsatmosfär	37°C, 5%CO2, befuktad atmosfär.

Kosttillskott

Komplettera mediet med 10% FBS

Dissociationsmedel	Accutase

Vidareodling

Ta bort det gamla mediet från de adherenta cellerna och tvätta dem med PBS som saknar kalcium och magnesium. Använd 3-5 ml PBS för T25-kolvar och 5-10 ml för T75-kolvar. Täck sedan cellerna helt med Accutase, använd 1-2 ml för T25-kolvar och 2,5 ml för T75-kolvar. Låt cellerna inkubera i rumstemperatur i 8-10 minuter så att de lossnar. Efter inkubationen, blanda cellerna försiktigt med 10 ml medium för att resuspendera dem och centrifugera sedan vid 300xg i 3 minuter. Kassera supernatanten, resuspendera cellerna i färskt medium och överför dem till nya kolvar som redan innehåller färskt medium.

Såtäthet	1 x 10^4 celler/cm^2
Vätskeförnyelse	Var 5:e till 7:e dag
Återhämtning efter upptining	Efter upptining, plattlägg cellerna med 5 x 10^4 celler/cm^2 och låt cellerna återhämta sig från frysprocessen och fästa i minst 24 timmar.

Upptining och odling

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROLL OCH KRYOKONSERVERING

Sterilitet

Mykoplasmakontaminering utesluts med hjälp av både PCR-baserade analyser och luminiscensbaserade metoder för mykoplasmadiagnostik. För att säkerställa att det inte finns någon kontaminering av bakterier, svamp eller jäst utsätts cellkulturerna för dagliga visuella inspektioner.

Frysmedel	Som kryokonserveringsmedium använder vi komplett tillväxtmedium (inklusive FBS) + 10% DMSO för adekvat viabilitet efter upptining, eller CM-1 (Cytion katalognummer 800100), som innehåller optimerade osmoprotektanter och metaboliska stabilisatorer för att förbättra återhämtningen och minska kryoinducerad stress.

Förvaringsförhållanden

För långtidsförvaring, placera flaskorna i flytande kväve i ångfas vid ca -150 till -196 °C. Förvaring vid -80 °C är acceptabelt endast som ett kort mellanliggande steg innan överföring till flytande kväve.

Leveransvillkor

Kryopreserverade cellinjer skickas på torris i validerade, isolerade förpackningar med tillräckligt med kylmedel för att hålla cirka -78 °C under hela transporten. Vid mottagandet ska behållaren omedelbart inspekteras och flaskorna utan dröjsmål överföras till lämplig förvaring.

DONATOR

Donatorns ålder	35 år
Etnicitet	Kaukasisk

JURIDISKA FRÅGOR OCH SÄKERHET

Säkerhetsföreskrifter

När man planerar att förvara en kryovial i flytande kväve för framtida upptining är det obligatoriskt att följa strikta säkerhetsåtgärder. Lämpliga skyddshandskar och skyddskläder är nödvändiga, och ansiktsmask eller skyddsglasögon måste användas vid överföring av frysta prover till eller från tanken med flytande kväve. Detta för att minska risken för skador på grund av eventuella explosioner i frysbehållaren vid borttagning, vilket kan leda till att vassa fragment projiceras.

Garanti

På Cytion står vi bakom våra produkters kvalitet och livskraft.
Vi garanterar att våra celler är livsdugliga vid odlingens början i 60 dagar efter leverans från våra anläggningar.
Vi försäkrar att allt material överensstämmer med de specifikationer som beskrivs i analyscertifikatet och/eller produktbladet
För fullständig information, se vår <a href="”/Who-we-are/Warranty/” hreflang=”x-default”>Garantiförklaring

Avtal om materialöverföring krävs	Yes