HBL-52-solut

300188

HBL-52 on ihmisen solulinja, joka on peräisin siirtymävaiheen meningeoomasta, joka on tyypiltään I-luokan meningeoomaa, joka on erityisesti lokalisoitunut näkökanavaan. Tämä solulinja on peräisin aikuiselta naispotilaalta, ja sillä on epiteelin kaltainen morfologia. Meningeoomat ovat tyypillisesti hyvänlaatuisia kasvaimia, jotka syntyvät aivokalvoista, aivoja ja selkäydintä ympäröivistä kalvokerroksista. Siirtymävaiheen alatyyppi edustaa histologista luokkaa, jossa kasvainsoluissa on sekoitus kuituisia ja meningoteelisiä piirteitä.
Viimeaikaisissa tutkimuksissa on korostettu HBL-52-solujen herkkyyttä resveratrolille, luonnossa esiintyvälle polyfenolille, jolla on merkittäviä tulehdusta ja syöpää ehkäiseviä ominaisuuksia. Resveratrolin on havaittu estävän HBL-52-meningeoomasolujen proliferaatiota, mikä viittaa mahdolliseen terapeuttiseen rooliin meningeoomien hoidossa, erityisesti niiden, jotka sijaitsevat kriittisillä alueilla, kuten näkökanavassa.
Solujen lisääntymisen estäminen korostaa HBL-52:n hyödyllisyyttä farmakologisessa tutkimuksessa ja lääketestissä, sillä se tarjoaa arvokkaan mallin sellaisten yhdisteiden tehokkuuden arvioimiseksi, jotka voivat vaikuttaa kasvainten kasvun dynamiikkaan. Alkuperänsä ja hyvänlaatuisen luonteensa vuoksi HBL-52-solulinja on arvokas malli meningeooman patogeneesin tutkimiseen, erityisesti kun halutaan ymmärtää solujen käyttäytymistä ja molekyylimekanismeja, jotka ovat meningeooman kehittymisen ja etenemisen taustalla ainutlaatuisissa anatomisissa paikoissa, kuten näkökanavassa.

YLEISTÄ TIETOA

Kuvaus

HBL-52 on ihmisen solulinja, joka on peräisin siirtymävaiheen meningeoomasta, joka on tyypiltään I-luokan meningeoomaa, joka on erityisesti lokalisoitunut näkökanavaan. Tämä solulinja on peräisin aikuiselta naispotilaalta, ja sillä on epiteelin kaltainen morfologia. Meningeoomat ovat tyypillisesti hyvänlaatuisia kasvaimia, jotka syntyvät aivokalvoista, aivoja ja selkäydintä ympäröivistä kalvokerroksista. Siirtymävaiheen alatyyppi edustaa histologista luokkaa, jossa kasvainsoluissa on sekoitus kuituisia ja meningoteelisiä piirteitä.
Viimeaikaisissa tutkimuksissa on korostettu HBL-52-solujen herkkyyttä resveratrolille, luonnossa esiintyvälle polyfenolille, jolla on merkittäviä tulehdusta ja syöpää ehkäiseviä ominaisuuksia. Resveratrolin on havaittu estävän HBL-52-meningeoomasolujen proliferaatiota, mikä viittaa mahdolliseen terapeuttiseen rooliin meningeoomien hoidossa, erityisesti niiden, jotka sijaitsevat kriittisillä alueilla, kuten näkökanavassa.
Solujen lisääntymisen estäminen korostaa HBL-52:n hyödyllisyyttä farmakologisessa tutkimuksessa ja lääketestissä, sillä se tarjoaa arvokkaan mallin sellaisten yhdisteiden tehokkuuden arvioimiseksi, jotka voivat vaikuttaa kasvainten kasvun dynamiikkaan. Alkuperänsä ja hyvänlaatuisen luonteensa vuoksi HBL-52-solulinja on arvokas malli meningeooman patogeneesin tutkimiseen, erityisesti kun halutaan ymmärtää solujen käyttäytymistä ja molekyylimekanismeja, jotka ovat meningeooman kehittymisen ja etenemisen taustalla ainutlaatuisissa anatomisissa paikoissa, kuten näkökanavassa.

Kudos	Aivot
Sairaus	Meningeooma, hyvänlaatuiset solut

Synonyymit

- HBL 52

LUOKITTELU

Organismi	Ihminen
Sukupuoli	Nainen
Kasvuominaisuudet	Kiinnittynyt
Bioturvallisuustaso	1

OMINAISUUDET

Morfologia	Epiteelin kaltainen

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

TUNNISTEET

Lähdeviite

HBL-52 (Cytionin luettelonumero 300188)

NCBI-verotunnus	9606
Cellosaurus	CVCL_4220

ILMENTYMINEN JA ALTTIUS

Proteiinin ilmentyminen

DP (desmoplakiini) +, PG (plakoglobiini) +, PP1 -, PP2 +, PP3 - (PP=Plakofiliini), Dsc1 -, Dsc2 +, Dsc3 + (Dsc=desmokolliini), Dsg1 -, Dsg2 +, Dsg3 - (Dsg=desmogliini), N-kadheriini +, PGP2 +.

KÄSITTELY JA VILJELY

Viljelyalusta

McCoys 5a, w: 3,0 g/l glukoosia, w: vakaa glutamiini, w: 2,0 mM natriumpyruvaattia, w: 2,2 g/l NaHCO3 (Cytionin artikkelinumero 820200a)

Inkubaatioilma	37 °C, 5 %CO2, kostutettu ilmakehä.

Ravintolisät

Täydennetään elatusainetta 10 %:lla FBS:llä

Dissosiaatioreagenssi	Accutase

Soluviljely

Poista vanha väliaine tarttuneista soluista ja pese ne PBS:llä, josta puuttuu kalsiumia ja magnesiumia. Käytä T25-pulloissa 3-5 ml PBS:ää ja T75-pulloissa 5-10 ml. Peitä sitten solut kokonaan Accutase-valmisteella, käyttäen 1-2 ml T25-pulloissa ja 2,5 ml T75-pulloissa. Anna solujen inkuboitua huoneenlämmössä 8-10 minuuttia solujen irtoamiseksi. Inkuboinnin jälkeen solut sekoitetaan varovasti 10 ml:n väliaineella niiden resuspendoimiseksi ja sentrifugoidaan sitten 300xg:n nopeudella 3 minuutin ajan. Hävitä supernatantti, suspendoi solut uudelleen tuoreeseen väliaineeseen ja siirrä ne uusiin pulloihin, jotka sisältävät jo tuoretta väliaineita.

Kylvötiheys	5 x 10^3 solua/cm^2 tuottaa konfluenttisen kerroksen noin 4 päivässä. Yli 9 x 10^3 solua/cm^2:n siemennysitiheyksiä ei suositella.
Nesteen uusiminen	2-3 kertaa viikossa
Sulamisen jälkeinen palautuminen	Anna solujen tarttua vähintään 24-48 tuntia.

Sulatus ja viljely

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

LAADUNVALVONTA JA KRYOSÄILYTYS

Hedelmättömyys

Mykoplasmakontaminaatio suljetaan pois sekä PCR-pohjaisilla määrityksillä että luminesenssiin perustuvilla mykoplasman osoitusmenetelmillä.
Bakteeri-, sieni- tai hiivakontaminaation välttämiseksi soluviljelmät tarkastetaan päivittäin silmämääräisesti.

Jäädytysaine	Kryosäilytysmediana käytämme 50 % perusmediaa + 40 % FBS + 10 % DMSO:ta eli CM-1:tä (Cytionin luettelonumero 800100), joka sisältää optimoituja osmoprotectantteja ja metabolisia stabilisaattoreita, jotka parantavat elpymistä ja vähentävät kryosäilytysstressiä.

Säilytysolosuhteet

Pitkäaikaissäilytystä varten injektiopullot asetetaan höyryfaasissa olevaan nestemäiseen typpeen noin -150 - -196 °C:een. Säilytys -80 °C:ssa on hyväksyttävää vain lyhyenä välivaiheena ennen siirtoa nestemäiseen typpeen.

Toimitusehdot

Kryosäilytetyt solulinjat kuljetetaan kuivajäässä validoidussa, eristetyssä pakkauksessa, jossa on riittävästi kylmäainetta, jotta lämpötila pysyy noin -78 °C:ssa koko kuljetuksen ajan. Pakkaus on tarkastettava välittömästi sen vastaanottamisen jälkeen ja injektiopullot on siirrettävä viipymättä asianmukaiseen varastoon.

LAHJOITTAJA

Luovuttajan ikä	47 vuotta

OIKEUDELLISET JA TURVALLISUUSASIAT

Turvallisuusohjeet

Kun suunnitellaan kryoputken säilyttämistä nestemäisessä typessä sulatusta varten, on noudatettava tiukkoja turvatoimenpiteitä. Asianmukaiset suojakäsineet ja -vaatteet ovat välttämättömiä, ja kasvonaamarin tai suojalasien käyttö on välttämätöntä siirrettäessä jäädytettyjä näytteitä nestetyppisäiliöön tai siitä pois. Tällä pyritään pienentämään loukkaantumisriskiä, joka aiheutuu kryoputkien mahdollisista räjähdyksistä, jotka voivat aiheuttaa terävien sirpaleiden sinkoutumisen.

Takuu

Me Cytionilla seisomme tuotteidemme laadun ja elinkelpoisuuden takana.
Takaamme, että solumme ovat elinkelpoisia viljelyn alkaessa 60 päivän ajan sen jälkeen, kun ne on lähetetty laitoksestamme.
Vakuutamme, että kaikki materiaalit ovat analyysitodistuksessa ja/tai tuoteselosteessa kuvattujen eritelmien mukaisia
Lisätietoja on <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""""x-default"">Takuulausumassa

Aineiden siirtoa koskeva sopimus vaaditaan	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB