Cellules HBL-52

300188

La lignée cellulaire HBL-52 est une lignée cellulaire humaine dérivée d'un méningiome de transition de grade I, situé plus précisément au niveau du canal optique. Cette lignée cellulaire provient d'une patiente adulte et présente une morphologie de type épithélial. Les méningiomes sont généralement des tumeurs bénignes qui se développent à partir des méninges, les couches membraneuses qui entourent le cerveau et la moelle épinière. Le sous-type de transition correspond à une catégorie histologique dans laquelle les cellules tumorales présentent un mélange de caractéristiques fibreuses et méningothéliales.
Des études récentes ont mis en évidence la sensibilité des cellules HBL-52 au resvératrol, un polyphénol naturel doté d'importantes propriétés anti-inflammatoires et anticancéreuses. On a constaté que le resvératrol inhibe la prolifération des cellules de méningiome HBL-52, ce qui suggère un rôle thérapeutique potentiel dans la prise en charge ou le traitement des méningiomes, en particulier ceux situés dans des zones critiques comme le canal optique. Cette inhibition de la prolifération cellulaire souligne l'utilité de la lignée HBL-52 dans la recherche pharmacologique et les essais cliniques, offrant ainsi un modèle précieux pour évaluer l'efficacité des composés susceptibles d'influencer la dynamique de croissance tumorale. Compte tenu de son origine et de sa nature bénigne, la lignée cellulaire HBL-52 constitue un modèle précieux pour l'étude de la pathogenèse des méningiomes, notamment pour comprendre les comportements cellulaires et les mécanismes moléculaires sous-jacents au développement et à la progression des méningiomes dans des sites anatomiques particuliers comme le canal optique.

GENERAL INFORMATION

Description

La lignée cellulaire HBL-52 est une lignée cellulaire humaine dérivée d'un méningiome de transition de grade I, situé plus précisément au niveau du canal optique. Cette lignée cellulaire provient d'une patiente adulte et présente une morphologie de type épithélial. Les méningiomes sont généralement des tumeurs bénignes qui se développent à partir des méninges, les couches membraneuses qui entourent le cerveau et la moelle épinière. Le sous-type de transition correspond à une catégorie histologique dans laquelle les cellules tumorales présentent un mélange de caractéristiques fibreuses et méningothéliales.
Des études récentes ont mis en évidence la sensibilité des cellules HBL-52 au resvératrol, un polyphénol naturel doté d'importantes propriétés anti-inflammatoires et anticancéreuses. On a constaté que le resvératrol inhibe la prolifération des cellules de méningiome HBL-52, ce qui suggère un rôle thérapeutique potentiel dans la prise en charge ou le traitement des méningiomes, en particulier ceux situés dans des zones critiques comme le canal optique. Cette inhibition de la prolifération cellulaire souligne l'utilité de la lignée HBL-52 dans la recherche pharmacologique et les essais cliniques, offrant ainsi un modèle précieux pour évaluer l'efficacité des composés susceptibles d'influencer la dynamique de croissance tumorale. Compte tenu de son origine et de sa nature bénigne, la lignée cellulaire HBL-52 constitue un modèle précieux pour l'étude de la pathogenèse des méningiomes, notamment pour comprendre les comportements cellulaires et les mécanismes moléculaires sous-jacents au développement et à la progression des méningiomes dans des sites anatomiques particuliers comme le canal optique.

Tissue	Cerveau
Disease	Méningiome, cellules bénignes

Synonyms

- HBL 52

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Female
Growth properties	Adherent
Biosafety level	1

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

CHARACTERISTICS

Morphology	De type épithélial

IDENTIFIERS

Citation

HBL-52 (numéro de catalogue Cytion 300188)

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_4220

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Protein expression

DP (desmoplakine) +, PG (plakoglobine) +, PP1 -, PP2 +, PP3 - (PP = plakophiline), Dsc1 -, Dsc2 +, Dsc3 + (Dsc = desmocolline), Dsg1 -, Dsg2 +, Dsg3 - (Dsg = desmogléine), N-cadhérine +, PGP2 +.

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

McCoys 5a, w : 3,0 g/L de glucose, w : stable; glutamine, w : 2,0 mM de pyruvate de sodium, w : 2,2 g/L de $NaHCO_3$ (référence Cytion 820200a)

Incubation atmosphere	37 °C, 5 % de CO_2, atmosphère humidifiée.

Supplements

Ajouter 10 % de FBS au milieu de culture

Dissociation reagent	Accutase

Subculturing

Retirez l'ancien milieu des cellules adhérentes et lavez-les avec du PBS sans calcium ni magnésium. Pour les flacons T25, utilisez 3 à 5 ml de PBS, et pour les flacons T75, utilisez 5 à 10 ml. Ensuite, recouvrez complètement les cellules d'Accutase, en utilisant 1 à 2 ml pour les flacons T25 et 2,5 ml pour les flacons T75. Laissez les cellules incuber à température ambiante pendant 8 à 10 minutes afin de les détacher. Après l'incubation, mélangez délicatement les cellules avec 10 ml de milieu pour les remettre en suspension, puis centrifugez à 300 x g pendant 3 minutes. Éliminez le surnageant, remettez les cellules en suspension dans du milieu frais, puis transférez-les dans de nouveaux flacons contenant déjà du milieu frais.

Seeding density	Une densité de 5 × 10^3 cellules/cm^2 permettra d'obtenir une couche confluente en environ 4 jours. Les densités d'ensemencement supérieures à 9 × 10^3 cellules/cm^2 ne sont pas recommandées.
Fluid renewal	2 à 3 fois par semaine
Post-thaw recovery	Laisser les cellules adhérer pendant au moins 24 à 48 heures.

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

La contamination par les mycoplasmes est exclue à l'aide de tests basés sur la PCR et de méthodes de détection des mycoplasmes par luminescence.
Afin de s’assurer qu’il n’y a aucune contamination bactérienne, fongique ou par des levures, les cultures cellulaires font l’objet d’inspections visuelles quotidiennes.

Freeze medium	Comme milieu de cryoconservation, nous utilisons un mélange composé de 50 % de milieu de base + 40 % de FBS + 10 % de DMSO, ou du CM-1 (numéro de catalogue Cytion 800100), qui contient des osmoprotecteurs et des stabilisateurs métaboliques optimisés afin d’améliorer la récupération et de réduire le stress induit par la cryoconservation.

Storage conditions

Pour une conservation à long terme, placez les flacons dans de l’azote liquide en phase vapeur à une température comprise entre environ −150 et −196 °C. L’entreposage à −80 °C n’est acceptable qu’à titre d’étape intermédiaire de courte durée avant le transfert dans l’azote liquide.

Shipping conditions

Les lignées cellulaires cryoconservées sont expédiées dans de la glace sèche, dans un emballage isotherme validé contenant suffisamment de réfrigérant pour maintenir une température d’environ −78 °C pendant tout le transport. À la réception, inspectez immédiatement le conteneur et transférez sans délai les flacons dans un lieu de stockage approprié.

DONOR

Donor age	47 ans

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

Lorsqu’on prévoit entreposer un cryotube dans de l’azote liquide en vue d’une décongélation ultérieure, il est impératif de respecter des mesures de sécurité rigoureuses. Le port de gants et de vêtements de protection appropriés est essentiel, et l’utilisation d’un masque facial ou de lunettes de protection est obligatoire lors du transfert d’échantillons congelés vers ou depuis le réservoir d’azote liquide. Cette précaution vise à réduire le risque de blessure causé par d’éventuelles explosions de cryotubes lors de leur retrait, pouvant entraîner la projection de fragments coupants.

Warranty

Chez Cytion, nous garantissons la qualité et la viabilité de nos produits.
Nous garantissons que nos cellules seront viables au début de la culture pendant 60 jours à compter de leur expédition depuis nos installations.
Nous assurons que tous les matériaux sont conformes aux spécifications décrites dans le certificat d’analyse et/ou la fiche technique du produit.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre déclaration de garantie.

Material Transfer Agreement required	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB