Cellule HEK293T

300189

La HEK 293T, un derivato altamente trasfettabile della cellula parentale HEK 293, si distingue come strumento versatile e potente nel campo delle biotecnologie per la produzione di proteine ricombinanti e di vari tipi di vaccini.
Le cellule HEK-293T sono state generate trasfettando cellule embrionali di rene 293 con un plasmide che codifica l'antigene SV40 large T. La linea cellulare HEK293 originale è stata sviluppata a partire dalle cellule epiteliali del tessuto renale embrionale umano e la sua trasformazione è avvenuta in quello che è stato in particolare il 293° esperimento condotto dai ricercatori.
Nel campo dello sviluppo dei vaccini, le cellule 293T del rene embrionale sono fondamentali per la produzione di vettori virali, compresi i vettori di adenovirus. Le cellule HEK293T, in condizioni di coltura specifiche, vengono trasfettate con vettori che trasportano elementi adenovirali e retrovirali, tra cui l'origine di replicazione SV40, portando alla produzione di particelle simil-virali (VLP).
Le VLP, prive di materiale genetico virale, sono fondamentali per costituire la base dei vaccini a subunità e a VLP. La produzione di proteine ricombinanti nelle cellule 293T è facilitata da vari metodi di trasfezione, con particolare attenzione alla generazione di proteine di fusione AP e di altri tipi di proteine che costituiscono la componente antigenica dei vaccini.
Le capacità di ingegneria genomica della linea cellulare 293T consentono di personalizzare i costrutti di espressione, favorendo ulteriormente la produzione di vettori virali. Questo, unito alla capacità di produrre proteine in coltura in sospensione o in condizioni aderenti, rende la linea cellulare 293T una soluzione completa per lo sviluppo di vaccini moderni.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrizione

La HEK 293T, un derivato altamente trasfettabile della cellula parentale HEK 293, si distingue come strumento versatile e potente nel campo delle biotecnologie per la produzione di proteine ricombinanti e di vari tipi di vaccini.
Le cellule HEK-293T sono state generate trasfettando cellule embrionali di rene 293 con un plasmide che codifica l'antigene SV40 large T. La linea cellulare HEK293 originale è stata sviluppata a partire dalle cellule epiteliali del tessuto renale embrionale umano e la sua trasformazione è avvenuta in quello che è stato in particolare il 293° esperimento condotto dai ricercatori.
Nel campo dello sviluppo dei vaccini, le cellule 293T del rene embrionale sono fondamentali per la produzione di vettori virali, compresi i vettori di adenovirus. Le cellule HEK293T, in condizioni di coltura specifiche, vengono trasfettate con vettori che trasportano elementi adenovirali e retrovirali, tra cui l'origine di replicazione SV40, portando alla produzione di particelle simil-virali (VLP).
Le VLP, prive di materiale genetico virale, sono fondamentali per costituire la base dei vaccini a subunità e a VLP. La produzione di proteine ricombinanti nelle cellule 293T è facilitata da vari metodi di trasfezione, con particolare attenzione alla generazione di proteine di fusione AP e di altri tipi di proteine che costituiscono la componente antigenica dei vaccini.
Le capacità di ingegneria genomica della linea cellulare 293T consentono di personalizzare i costrutti di espressione, favorendo ulteriormente la produzione di vettori virali. Questo, unito alla capacità di produrre proteine in coltura in sospensione o in condizioni aderenti, rende la linea cellulare 293T una soluzione completa per lo sviluppo di vaccini moderni.

Tessuto	Rene

Applicazioni

Sviluppo di vaccini

Sinonimi

- Hek293T
- HEK-293T
- HEK 293T
- HEK-293-T
- HEK 293 T
- 293-T
- 293 T
- 293T
- Human Embryonic Kidney 293T
- 293tsA1609neo

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

CLASSIFICAZIONE

Organismo	Umano
Sesso	Donna
Proprietà di crescita	Aderente
Presenza di OGM	GMO-S1

Dettagli sullo stato degli OGM

GMO-S1: This HEK293T cell line contains SV40, supporting high-level expression of transfected plasmids and efficient viral packaging. The construct is integrated into human embryonic kidney cells. This classification applies only within Germany and may differ elsewhere

Livello di biosicurezza	1

CARATTERISTICHE

Morfologia	Simile all'epitelio
Tumorigenico	In topi nudi
Tempo di raddoppio	30 ore

IDENTIFICATORI

Riferimento bibliografico

HEK293T (catalogo Cytion numero 300189)

Codice fiscale NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_0063

ESPRESSIONE E SUSCETTIBILITÀ

Recettori espressi

Vitronectina

Espressione proteica

CEA negativo, p53 positivo

MANIPOLAZIONE E COLTURA

Terreno di coltura

EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutamina, w: 2,2 g/L NaHCO3, w: EBSS (articolo Cytion numero 820100a)

Atmosfera di incubazione	37°C, 5%CO2, atmosfera umidificata.

Integratori

Integrare il terreno di coltura con il 10% di FBS e l'1% di NEAA

Reagente di dissociazione	Accutase

Subcoltura

Rimuovere il vecchio terreno dalle cellule aderenti e lavarle con PBS privo di calcio e magnesio. Per le fiasche T25, utilizzare 3-5 ml di PBS e per le fiasche T75, 5-10 ml. Quindi, coprire completamente le cellule con Accutase, utilizzando 1-2 ml per le fiasche T25 e 2,5 ml per le fiasche T75. Lasciare incubare le cellule a temperatura ambiente per 8-10 minuti per staccarle. Dopo l'incubazione, mescolare delicatamente le cellule con 10 ml di terreno per risospenderle, quindi centrifugare a 300xg per 3 minuti. Scartare il surnatante, risospendere le cellule in terreno fresco e trasferirle in nuove fiasche contenenti terreno fresco.

Densità di semina	1 x 10^4 cellule/cm^2 produrrà uno strato confluente in circa 4 giorni
Rinnovo dei fluidi	2 volte a settimana
Recupero post-scongelamento	Dopo lo scongelamento, piastrare le cellule a 5 x 10^4 cellule/cm^2 e lasciare che le cellule si riprendano dal processo di congelamento e aderiscano per almeno 24 ore.

Scongelamento e coltura

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTROLLO DI QUALITÀ E CRIOCONSERVAZIONE

Sterilità

La contaminazione da micoplasma viene esclusa utilizzando sia saggi basati sulla PCR sia metodi di rilevamento del micoplasma basati sulla luminescenza.
Per garantire l'assenza di contaminazione batterica, fungina o da lieviti, le colture cellulari sono sottoposte a ispezioni visive quotidiane.

Terreno di coltura congelato	Come terreno di crioconservazione, utilizziamo un terreno di crescita completo (incluso FBS) + 10% DMSO per un'adeguata vitalità post-scongelamento, o CM-1 (numero di catalogo Cytion 800100), che include osmoprotettori e stabilizzatori metabolici ottimizzati per migliorare il recupero e ridurre lo stress crio-indotto.

Condizioni di conservazione

Per la conservazione a lungo termine, porre le fiale in azoto liquido in fase vapore a una temperatura compresa tra -150 e -196 °C circa. La conservazione a -80 °C è accettabile solo come breve fase intermedia prima del trasferimento in azoto liquido.

Condizioni di spedizione

Le linee cellulari crioconservate vengono spedite su ghiaccio secco in confezioni isolate e convalidate, con una quantità di refrigerante sufficiente a mantenere circa -78 °C durante il trasporto. Al ricevimento, ispezionare immediatamente il contenitore e trasferire immediatamente le fiale in un luogo di conservazione appropriato.

DONATORE

Età dei donatori	Feto

ASPETTI LEGALI E DI SICUREZZA

Misure di sicurezza

Quando si prevede di conservare una crioviale in azoto liquido per un futuro scongelamento, è obbligatorio attenersi a rigorose misure di sicurezza. Guanti e indumenti protettivi appropriati sono essenziali e l'uso di una maschera facciale o di occhiali di sicurezza è richiesto durante il trasferimento dei campioni congelati da o verso il serbatoio di azoto liquido. Questo per ridurre il rischio di lesioni dovute a potenziali esplosioni di crioviali al momento della rimozione, che possono provocare la proiezione di frammenti taglienti.

Garanzia

Noi di Cytion garantiamo la qualità e la vitalità dei nostri prodotti.
Garantiamo che le nostre cellule saranno vitali all'inizio della coltura per 60 giorni dopo la spedizione dai nostri stabilimenti.
Assicuriamo che tutti i materiali sono conformi alle specifiche descritte nel Certificato di Analisi e/o nella Scheda Prodotto
Per tutti i dettagli, consultare la nostra <a href=""/Chi-siamo/Garanzia/"" hreflang=""x-default"">Dichiarazione di Garanzia

È richiesto un accordo di trasferimento di materiale	Yes