Cellules HEL-299

300193

HEL-299 est une lignée cellulaire de fibroblastes pulmonaires humains issue d'un individu adulte. Cette lignée cellulaire se distingue notamment par sa capacité limitée à se multiplier en culture; elle entre généralement en sénescence après environ dix passages. Cette caractéristique fait de la lignée HEL-299 un modèle utile pour l'étude du vieillissement cellulaire et de la sénescence, ainsi que de la dynamique de la croissance et de la réplication cellulaires dans des conditions contrôlées.
En plus de ses applications dans la recherche sur le vieillissement, HEL-299 sert également de modèle pour l'étude des voies de transduction du signal. Plus précisément, on a observé que l'expression du récepteur muscarinique M2 dans ces cellules est régulée à la baisse à la suite d'une stimulation par la protéine kinase C. Cette réponse met en évidence l'utilité de la lignée cellulaire dans la recherche pharmacologique et dans l'étude des mécanismes sous-jacents à la signalisation et à la régulation médiées par les récepteurs. La modification de l'expression des récepteurs à la suite de l'activité de la kinase peut fournir des indications sur les réponses cellulaires aux stimuli externes, ce qui pourrait contribuer à l'élaboration de stratégies thérapeutiques ciblant des voies similaires dans diverses maladies.

GENERAL INFORMATION

Description

HEL-299 est une lignée cellulaire de fibroblastes pulmonaires humains issue d'un individu adulte. Cette lignée cellulaire se distingue notamment par sa capacité limitée à se multiplier en culture; elle entre généralement en sénescence après environ dix passages. Cette caractéristique fait de la lignée HEL-299 un modèle utile pour l'étude du vieillissement cellulaire et de la sénescence, ainsi que de la dynamique de la croissance et de la réplication cellulaires dans des conditions contrôlées.
En plus de ses applications dans la recherche sur le vieillissement, HEL-299 sert également de modèle pour l'étude des voies de transduction du signal. Plus précisément, on a observé que l'expression du récepteur muscarinique M2 dans ces cellules est régulée à la baisse à la suite d'une stimulation par la protéine kinase C. Cette réponse met en évidence l'utilité de la lignée cellulaire dans la recherche pharmacologique et dans l'étude des mécanismes sous-jacents à la signalisation et à la régulation médiées par les récepteurs. La modification de l'expression des récepteurs à la suite de l'activité de la kinase peut fournir des indications sur les réponses cellulaires aux stimuli externes, ce qui pourrait contribuer à l'élaboration de stratégies thérapeutiques ciblant des voies similaires dans diverses maladies.

Tissue	Poumon

Synonyms

- HEL 299
- Hel-299
- Hel 299
- HEL299

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Male
Growth properties	Adherent
Biosafety level	1

CHARACTERISTICS

Karyotype

Homme normal, diploïde, stable

IDENTIFIERS

Citation

HEL-299 (numéro de catalogue Cytion 300193)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_2480

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Receptors expressed

Récepteur muscarinique M2

Protein expression

P53 négatif

Isoenzymes

G6PD, A

Virus susceptibility

Stomatite vésiculeuse (Indiana), poliovirus 1

Reverse transcriptase	Négatif

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

F12 de Ham, contenant : 1,0 mM de glutamine stable, 1,0 mM de pyruvate de sodium, 1,1 g/L de $NaHCO_3$ (référence Cytion 820600a)

Incubation atmosphere	37 °C, 5 % de CO_2, atmosphère humidifiée.

Supplements

Ajouter au milieu 10 % de FBS et 1 ng/mL de bFGF

Dissociation reagent	Accutase

Subculturing

Retirez l'ancien milieu des cellules adhérentes et lavez-les avec du PBS sans calcium ni magnésium. Pour les flacons T25, utilisez 3 à 5 ml de PBS, et pour les flacons T75, utilisez 5 à 10 ml. Ensuite, recouvrez complètement les cellules d'Accutase, en utilisant 1 à 2 ml pour les flacons T25 et 2,5 ml pour les flacons T75. Laissez les cellules incuber à température ambiante pendant 8 à 10 minutes afin de les détacher. Après l'incubation, mélangez délicatement les cellules avec 10 ml de milieu pour les remettre en suspension, puis centrifugez à 300 x g pendant 3 minutes. Éliminez le surnageant, remettez les cellules en suspension dans du milieu frais, puis transférez-les dans de nouveaux flacons contenant déjà du milieu frais.

Seeding density	1×10^4 cellules/cm²
Post-thaw recovery	Après décongélation, ensemencer les cellules à une densité de 5×10^4 cellules/cm² et laisser les cellules se remettre du processus de congélation et adhérer pendant au moins 24 heures.

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

La contamination par les mycoplasmes est exclue à l'aide de tests basés sur la PCR et de méthodes de détection des mycoplasmes par luminescence.
Afin de s’assurer qu’il n’y a aucune contamination bactérienne, fongique ou par des levures, les cultures cellulaires font l’objet d’inspections visuelles quotidiennes.

Freeze medium	Comme milieu de cryoconservation, nous utilisons un milieu de croissance complet (contenant du sérum fœtal bovin) + 10 % de DMSO pour assurer une viabilité adéquate après décongélation, ou du CM-1 (référence Cytion 800100), qui contient des osmoprotecteurs et des stabilisateurs métaboliques optimisés pour améliorer la récupération et réduire le stress induit par la cryoconservation.

Storage conditions

Pour une conservation à long terme, placez les flacons dans de l’azote liquide en phase vapeur à une température comprise entre environ −150 et −196 °C. L’entreposage à −80 °C n’est acceptable qu’à titre d’étape intermédiaire de courte durée avant le transfert dans l’azote liquide.

Shipping conditions

Les lignées cellulaires cryoconservées sont expédiées dans de la glace sèche, dans un emballage isotherme validé contenant suffisamment de réfrigérant pour maintenir une température d’environ −78 °C pendant tout le transport. À la réception, inspectez immédiatement le conteneur et transférez sans délai les flacons dans un lieu de stockage approprié.

DONOR

Donor age	Fœtus
Ethnicity	africain

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

Lorsqu’on prévoit entreposer un cryotube dans de l’azote liquide en vue d’une décongélation ultérieure, il est impératif de respecter des mesures de sécurité rigoureuses. Le port de gants et de vêtements de protection appropriés est essentiel, et l’utilisation d’un masque facial ou de lunettes de protection est obligatoire lors du transfert d’échantillons congelés vers ou depuis le réservoir d’azote liquide. Cette précaution vise à réduire le risque de blessure causé par d’éventuelles explosions de cryotubes lors de leur retrait, pouvant entraîner la projection de fragments coupants.

Warranty

Chez Cytion, nous garantissons la qualité et la viabilité de nos produits.
Nous garantissons que nos cellules seront viables au début de la culture pendant
60 jours à compter de leur expédition depuis nos installations.
Nous assurons que tous les matériaux sont conformes aux spécifications décrites dans le
certificat d’analyse et/ou la fiche technique du produit.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre
déclaration de garantie.

Material Transfer Agreement required	Yes