# Células ME-180

300196

A linha celular ME-180 é uma linha celular epitelial estabelecida a partir de um carcinoma de células escamosas altamente invasivo, originalmente isolado da metástase omental de um carcinoma cervical numa doente branca de 66 anos. O carcinoma era caracterizado por aglomerados celulares irregulares sem queratinização significativa e com necrose mínima. Esta linha celular é particularmente importante para a investigação do cancro, especialmente em estudos que envolvam o cancro do colo do útero e outras formas de carcinoma de células escamosas, devido à sua origem e natureza agressiva. As células ME-180 são tumorigénicas e demonstraram formar carcinomas epidermóides bem diferenciados quando implantadas em ratinhos nus.
As células ME-180 têm várias propriedades únicas, incluindo um cariótipo heteroplóide com um modo subtriplóide, indicando uma disposição cromossómica instável. As células apresentam uma morfologia epitelial típica com numerosos desmossomas e tonofibrilas, e não apresentam inibição de contacto, levando frequentemente a um crescimento em camadas em cultura. O crescimento da linha celular é inibido pelo fator de necrose tumoral alfa (TNF alfa), o que a torna útil para estudos que investigam os efeitos das citocinas inflamatórias nas células tumorais. Além disso, as células ME-180 contêm ADN do papilomavírus humano (HPV), com uma maior homologia com o HPV-68 em comparação com o HPV-18, o que pode ser relevante para estudos sobre a carcinogénese relacionada com o HPV.
As células ME-180 são também valiosas na investigação de doenças infecciosas devido à sua sensibilidade a vários vírus. A linha celular tem sido utilizada para estudar a interação com vários vírus, incluindo os vírus da gripe e os mixovírus. As células ME-180 demonstraram a capacidade de formar infecções persistentes com alguns mixovírus, o que as torna um modelo útil para estudar a latência viral e os efeitos a longo prazo da infeção viral nas células cancerígenas. A combinação da sua origem cancerígena, suscetibilidade viral e caraterísticas específicas de crescimento fazem da ME-180 uma ferramenta versátil na investigação oncológica e virológica.

## INFORMAÇÕES GERAIS

### Descrição

A linha celular ME-180 é uma linha celular epitelial estabelecida a partir de um carcinoma de células escamosas altamente invasivo, originalmente isolado da metástase omental de um carcinoma cervical numa doente branca de 66 anos. O carcinoma era caracterizado por aglomerados celulares irregulares sem queratinização significativa e com necrose mínima. Esta linha celular é particularmente importante para a investigação do cancro, especialmente em estudos que envolvam o cancro do colo do útero e outras formas de carcinoma de células escamosas, devido à sua origem e natureza agressiva. As células ME-180 são tumorigénicas e demonstraram formar carcinomas epidermóides bem diferenciados quando implantadas em ratinhos nus.
As células ME-180 têm várias propriedades únicas, incluindo um cariótipo heteroplóide com um modo subtriplóide, indicando uma disposição cromossómica instável. As células apresentam uma morfologia epitelial típica com numerosos desmossomas e tonofibrilas, e não apresentam inibição de contacto, levando frequentemente a um crescimento em camadas em cultura. O crescimento da linha celular é inibido pelo fator de necrose tumoral alfa (TNF alfa), o que a torna útil para estudos que investigam os efeitos das citocinas inflamatórias nas células tumorais. Além disso, as células ME-180 contêm ADN do papilomavírus humano (HPV), com uma maior homologia com o HPV-68 em comparação com o HPV-18, o que pode ser relevante para estudos sobre a carcinogénese relacionada com o HPV.
As células ME-180 são também valiosas na investigação de doenças infecciosas devido à sua sensibilidade a vários vírus. A linha celular tem sido utilizada para estudar a interação com vários vírus, incluindo os vírus da gripe e os mixovírus. As células ME-180 demonstraram a capacidade de formar infecções persistentes com alguns mixovírus, o que as torna um modelo útil para estudar a latência viral e os efeitos a longo prazo da infeção viral nas células cancerígenas. A combinação da sua origem cancerígena, suscetibilidade viral e caraterísticas específicas de crescimento fazem da ME-180 uma ferramenta versátil na investigação oncológica e virológica.

| | |
|---|---|
| **Tecido** | Útero, colo do útero |
| **Doença** | Carcinoma epidermoide |
| **Local da metástase** | Omento |

### Sinónimos

- Me-180
- ME 180
- ME180

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

## CLASSIFICAÇÃO

| | |
|---|---|
| **Organismo** | Humano |
| **Sexo** | Feminino |
| **Propriedades de crescimento** | Aderente |
| **Nível de biossegurança** | 2 |

## CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Morfologia** | De tipo epitelial |
| **Tipo de célula** | Epitelial |

## IDENTIFICADORES

**Referência**

ME-180 (número de catálogo Cytion 300196)

| | |
|---|---|
| **Número de identificação fiscal do NCBI** | 9606 |
| **Cellosaurus** | CVCL_1401 |

## EXPRESSÃO E SUSCETIBILIDADE

**Vírus**

HPV68 positivo

## MANUSEAMENTO E CULTURA

**Meio de cultura**

McCoys 5a, com: 3,0 g/L de glucose, com: glutamina estável, com: 2,0 mM de piruvato de sódio, com: 2,2 g/L de NaHCO3 (número de artigo Cytion 820200a)

| | |
|---|---|
| **Atmosfera de incubação** | 37°C, 5%CO2, atmosfera humidificada. |

**Suplementos**

Completar o meio com 10% de FBS

| | |
|---|---|
| **Reagente de dissociação** | Accutase |

**Subcultura**

Retirar o meio antigo das células aderentes e lavá-las com PBS sem cálcio e magnésio. Nos frascos T25, utilizar 3-5 ml de PBS e nos frascos T75, 5-10 ml. Em seguida, cobrir completamente as células com Accutase, utilizando 1-2 ml para os frascos T25 e 2,5 ml para os frascos T75. Deixar as células incubar à temperatura ambiente durante 8-10 minutos para as destacar. Após a incubação, misturar suavemente as células com 10 ml de meio para as ressuspender e, em seguida, centrifugar a 300xg durante 3 minutos. Deitar fora o sobrenadante, ressuspender as células em meio fresco e transferi-las para novos frascos que já contenham meio fresco.

| | |
|---|---|
| **Densidade de sementeira** | 1 x $10^4$ células/$cm^2$ |
| **Renovação de fluidos** | 2 a 3 vezes por semana |
| **Recuperação após o descongelamento** | Após o descongelamento, coloque as células em placas a uma densidade de 5 x $10^4$ células/$cm^2$ e deixe-as recuperar do processo de congelamento e aderir durante pelo menos 24 horas. |

**Descongelamento e cultura**

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

## CONTROLO DE QUALIDADE E CRIOPRESERVAÇÃO

**Esterilidade**

A contaminação por micoplasma é excluída utilizando ensaios baseados em PCR e métodos de deteção de micoplasma baseados em luminescência.
Para garantir que não há contaminação bacteriana, fúngica ou de leveduras, as culturas de células são sujeitas a inspecções visuais diárias.

| | |
|---|---|
| **Meio de congelação** | Como meio de criopreservação, utilizamos um meio de crescimento completo (incluindo FBS) + 10% DMSO para uma viabilidade pós-descongelamento adequada, ou CM-1 (número de catálogo Cytion 800100), que inclui osmoprotectores optimizados e estabilizadores metabólicos para melhorar a recuperação e reduzir o stress induzido pela crio. |

**Condições de armazenamento**

Para conservação a longo prazo, colocar os frascos em azoto líquido em fase de vapor a uma temperatura entre -150 e -196 °C. O armazenamento a -80 °C é aceitável apenas como um curto passo intermédio antes da transferência para azoto líquido.

**Condições de envio**

As linhas celulares criopreservadas são expedidas em gelo seco em embalagens validadas e isoladas com refrigerante suficiente para manter aproximadamente -78 °C durante o transporte. Aquando da receção, inspecionar imediatamente o recipiente e transferir sem demora os frascos para um local de armazenamento adequado.

## DOADOR

| | |
|---|---|
| **Idade do dador** | 66 anos |
| **Etnia** | Caucasiano |

## ASPECTOS LEGAIS E DE SEGURANÇA

**Precauções de segurança**

Quando se planeia armazenar um criovial em nitrogénio líquido para descongelação futura, é obrigatório aderir a medidas de segurança rigorosas. Luvas e vestuário de proteção adequados são essenciais, e a utilização de uma máscara facial ou óculos de segurança é necessária durante a transferência de amostras congeladas para ou do tanque de nitrogénio líquido. Isto destina-se a mitigar o risco de ferimentos provocados por potenciais explosões de crioviais após a remoção, que podem resultar na projeção de fragmentos afiados.

**Garantia**

Na Cytion, nós garantimos a qualidade e a viabilidade de nossos produtos.
Garantimos que nossas células serão viáveis no início da cultura por 60 dias após o envio de nossas instalações.
Asseguramos que todos os materiais estão em conformidade com as especificações descritas no Certificado de Análise e/ou Folha de Produto
Para mais informações, consulte a nossa <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Declaração de Garantia

| | |
|---|---|
| **É necessário um Acordo de Transferência de Material** | Yes |

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB