Клітини ME-180

300196

Клітинна лінія ME-180 - це епітеліальна клітинна лінія, отримана з високоінвазивної плоскоклітинної карциноми, спочатку виділеної з метастазу карциноми шийки матки в сальнику у 66-річної білої пацієнтки. Карцинома характеризувалася нерегулярними скупченнями клітин без значного ороговіння і мінімальним некрозом. Ця клітинна лінія має особливе значення для дослідження раку, особливо в дослідженнях раку шийки матки та інших форм плоскоклітинної карциноми, завдяки своєму походженню та агресивній природі. Клітини ME-180 є пухлиноутворюючими і, як було показано, утворюють добре диференційовані епідермоїдні карциноми при імплантації оголеним мишам.

Клітини ME-180 мають кілька унікальних властивостей, включаючи гетероплоїдний каріотип з субтриплоїдним режимом, що вказує на нестабільне хромосомне розташування. Клітини мають типову епітеліальну морфологію з численними десмосомами і тонофібрилами, а також не виявляють контактного інгібування, що часто призводить до пошарового росту в культурі. Зростання клітинної лінії пригнічується фактором некрозу пухлин альфа (ФНП-альфа), що робить її корисною для досліджень, які вивчають вплив запальних цитокінів на пухлинні клітини. Крім того, клітини ME-180 містять ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ), з більшою гомологією до ВПЛ-68 порівняно з ВПЛ-18, що може бути важливим для досліджень канцерогенезу, пов'язаного з ВПЛ.

Клітини ME-180 також цінні для дослідження інфекційних захворювань завдяки своїй чутливості до різних вірусів. Клітинна лінія була використана для вивчення взаємодії з кількома вірусами, включаючи грип та міксовіруси. Клітини ME-180 показали здатність формувати стійкі інфекції з деякими міксовірусами, що робить їх корисною моделлю для вивчення вірусної латентності та довготривалого впливу вірусної інфекції на ракові клітини. Поєднання ракового походження, вірусної чутливості та специфічних характеристик росту робить ME-180 універсальним інструментом як в онкологічних, так і в вірусологічних дослідженнях.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Опис

Клітинна лінія ME-180 - це епітеліальна клітинна лінія, отримана з високоінвазивної плоскоклітинної карциноми, спочатку виділеної з метастазу карциноми шийки матки в сальнику у 66-річної білої пацієнтки. Карцинома характеризувалася нерегулярними скупченнями клітин без значного ороговіння і мінімальним некрозом. Ця клітинна лінія має особливе значення для дослідження раку, особливо в дослідженнях раку шийки матки та інших форм плоскоклітинної карциноми, завдяки своєму походженню та агресивній природі. Клітини ME-180 є пухлиноутворюючими і, як було показано, утворюють добре диференційовані епідермоїдні карциноми при імплантації оголеним мишам.

Клітини ME-180 мають кілька унікальних властивостей, включаючи гетероплоїдний каріотип з субтриплоїдним режимом, що вказує на нестабільне хромосомне розташування. Клітини мають типову епітеліальну морфологію з численними десмосомами і тонофібрилами, а також не виявляють контактного інгібування, що часто призводить до пошарового росту в культурі. Зростання клітинної лінії пригнічується фактором некрозу пухлин альфа (ФНП-альфа), що робить її корисною для досліджень, які вивчають вплив запальних цитокінів на пухлинні клітини. Крім того, клітини ME-180 містять ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ), з більшою гомологією до ВПЛ-68 порівняно з ВПЛ-18, що може бути важливим для досліджень канцерогенезу, пов'язаного з ВПЛ.

Клітини ME-180 також цінні для дослідження інфекційних захворювань завдяки своїй чутливості до різних вірусів. Клітинна лінія була використана для вивчення взаємодії з кількома вірусами, включаючи грип та міксовіруси. Клітини ME-180 показали здатність формувати стійкі інфекції з деякими міксовірусами, що робить їх корисною моделлю для вивчення вірусної латентності та довготривалого впливу вірусної інфекції на ракові клітини. Поєднання ракового походження, вірусної чутливості та специфічних характеристик росту робить ME-180 універсальним інструментом як в онкологічних, так і в вірусологічних дослідженнях.

Тканина	Матка, шийка матки
Хвороба	Епідермоїдна карцинома
Місце метастазування	Сальник

Синоніми

- Me-180
- ME 180
- ME180

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

КЛАСИФІКАЦІЯ

Організм	Людина
Секс	Жінка
Характеристики росту	Прихильник
Рівень біобезпеки	2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Морфологія	Епітеліальноподібні
Тип клітини	Епітеліальний

ІДЕНТИФІКАТОРИ

Посилання

ME-180 (номер за каталогом Cytion 300196)

Ідентифікаційний номер платника податків NCBI	9606
Целозавр	CVCL_1401

ЕКСПРЕСІЯ ТА СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ

Віруси

ВПЛ68 позитивний

ОБРОБКА ТА ВИРОЩУВАННЯ

Живильне середовище

McCoys 5a, w: 3,0 г/л Глюкоза, w: стабільна Глютамін, w: 2,0 мМ Піруват натрію, w: 2,2 г/л NaHCO3 (Cytion article number 820200a)

Атмосфера інкубації	37°C, 5% CO2, волога атмосфера.

Добавки

Додайте до середовища 10% FBS

Реагент для дисоціації	Аккутаза

Пересадка в нове середовище

Видаліть старе середовище з прилиплих клітин і промийте їх PBS, в якому бракує кальцію і магнію. Для колб T25 використовуйте 3-5 мл PBS, а для колб T75 - 5-10 мл. Потім повністю покрийте клітини аккутазою, використовуючи 1-2 мл для колб T25 і 2,5 мл для колб T75. Залиште клітини інкубуватися при кімнатній температурі протягом 8-10 хвилин, щоб відокремити їх. Після інкубації обережно змішайте клітини з 10 мл середовища, щоб ресуспендувати їх, а потім центрифугуйте при 300xg протягом 3 хвилин. Викиньте надосадову рідину, ресуспендуйте клітини у свіжому середовищі та перенесіть їх у нові колби, які вже містять свіже середовище.

Щільність висіву	1 x 10^4 клітин/см2
Оновлення рідини	2-3 рази на тиждень
Відновлення після відлиги	Після розморожування висійте клітини з щільністю 5 x 10^4 клітин/см2 і дайте клітинам відновитися після процесу заморожування та прикріпитися протягом щонайменше 24 годин.

Розморожування та культивування

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТА КРІОКОНСЕРВАЦІЯ

Стерильність

Зараження мікоплазмою виключається за допомогою аналізів на основі ПЛР та люмінесцентних методів виявлення мікоплазми. Щоб переконатися у відсутності бактеріального, грибкового або дріжджового забруднення, клітинні культури піддаються щоденному візуальному контролю.

Середовище для заморожування	Як середовище кріоконсервування ми використовуємо повне живильне середовище (включаючи FBS) + 10% ДМСО для адекватної життєздатності після відтавання або CM-1 (номер за каталогом Cytion 800100), до складу якого входять оптимізовані осмопротектори та метаболічні стабілізатори для прискорення відновлення та зменшення кріоіндукованого стресу.

Умови зберігання

Для тривалого зберігання помістіть флакони в парофазний рідкий азот при температурі від -150 до -196 °C. Зберігання при -80 °C допустиме лише як короткий проміжний етап перед перенесенням у рідкий азот.

Умови доставки

Кріоконсервовані клітинні лінії транспортуються на сухому льоду в перевіреній ізольованій упаковці з достатньою кількістю холодоагенту для підтримання температури приблизно -78 °C під час транспортування. При отриманні негайно огляньте контейнер і без зволікань перемістіть флакони у відповідне місце зберігання.

ДОНОР

Вік донора	66 років
Етнічна приналежність	Кавказець

ПРАВОВІ ПИТАННЯ ТА БЕЗПЕКА

Заходи безпеки

Плануючи зберігати кріовіал у рідкому азоті для подальшого розморожування, обов'язково слід дотримуватися суворих заходів безпеки. Під час перенесення заморожених зразків до резервуара з рідким азотом або з нього необхідно використовувати захисні рукавички та одяг, а також маску або захисні окуляри. Це необхідно для того, щоб зменшити ризик травмування від потенційних кріогенних вибухів при вилученні, які можуть призвести до розльоту гострих осколків.

Гарантія

У Cytion ми відповідаємо за якість та життєздатність нашої продукції.
Ми гарантуємо, що наші клітини будуть життєздатними на початку культивування протягом 60 днів після відвантаження з нашого заводу.
Ми запевняємо, що всі матеріали відповідають специфікаціям, описаним у сертифікаті аналізу та/або паспорті продукту
Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, зверніться до нашого Заяви про гарантію

Необхідна угода про передачу матеріалів	Yes