HROHep03 Cellák

300197

A HROHep03 egy humán hepatocelluláris adenokarcinóma sejtvonal, amelyet egy 71 éves kaukázusi női beteg primer májdaganatából állítottak elő a PD Dr. Michael Linnebacher által 2006 óta fejlesztett, betegektől származó tumorsejtvonalakból álló HRO biobank-sorozat keretében. A daganatot primer adenokarcinómaként osztályozták, TNM-stádiuma T0NxMx, fokozata 3, ami egy magas fokozatú májadenokarcinómát tükröz, amelynek szövetmintavételkor nem volt igazolt távoli áttétje. A HROHep03 adhezív monorétegként növekszik, fibroblaszt-szerű morfológiával, és megerősítést nyert, hogy mentes az emberre patogén HBV, HCV és HIV vírusoktól, összhangban a Linnebacher-biobank-sorozat szigorú minőség-ellenőrzési szabványaival.
A HROHep03 alkalmazható hepatocelluláris adenokarcinóma kutatásában, a magas fokozatú májdaganat-sejtek biológiájának vizsgálatában, gyógyszerérzékenységi és rezisztenciavizsgálatokban (sorafenib, ciszplatin, 5-FU), májdaganat-inváziós és migrációs vizsgálatokban, valamint molekuláris útvonalak elemzésében. A HRO biobank részeként ez a vonal betegspecifikus biológiai erőforrást biztosít, amely személyre szabott onkológiai kutatások céljából párosítható ugyanazon betegtől származó, illeszkedő immunológiai anyaggal. Fibroblaszt-szerű morfológiája fenotípusilag megkülönbözteti a gyakoribb, hepatocita-szerű HCC-vonalaktól, és tükrözheti a tumor progresszióját vagy az in vitro adaptáció során kialakult epiteliális-mesenchimális jellemzőket.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Leírás

A HROHep03 egy humán hepatocelluláris adenokarcinóma sejtvonal, amelyet egy 71 éves kaukázusi női beteg primer májdaganatából állítottak elő a PD Dr. Michael Linnebacher által 2006 óta fejlesztett, betegektől származó tumorsejtvonalakból álló HRO biobank-sorozat keretében. A daganatot primer adenokarcinómaként osztályozták, TNM-stádiuma T0NxMx, fokozata 3, ami egy magas fokozatú májadenokarcinómát tükröz, amelynek szövetmintavételkor nem volt igazolt távoli áttétje. A HROHep03 adhezív monorétegként növekszik, fibroblaszt-szerű morfológiával, és megerősítést nyert, hogy mentes az emberre patogén HBV, HCV és HIV vírusoktól, összhangban a Linnebacher-biobank-sorozat szigorú minőség-ellenőrzési szabványaival.
A HROHep03 alkalmazható hepatocelluláris adenokarcinóma kutatásában, a magas fokozatú májdaganat-sejtek biológiájának vizsgálatában, gyógyszerérzékenységi és rezisztenciavizsgálatokban (sorafenib, ciszplatin, 5-FU), májdaganat-inváziós és migrációs vizsgálatokban, valamint molekuláris útvonalak elemzésében. A HRO biobank részeként ez a vonal betegspecifikus biológiai erőforrást biztosít, amely személyre szabott onkológiai kutatások céljából párosítható ugyanazon betegtől származó, illeszkedő immunológiai anyaggal. Fibroblaszt-szerű morfológiája fenotípusilag megkülönbözteti a gyakoribb, hepatocita-szerű HCC-vonalaktól, és tükrözheti a tumor progresszióját vagy az in vitro adaptáció során kialakult epiteliális-mesenchimális jellemzőket.

Szövet	Máj
Betegség	Primer adenokarcinóma, T0NxMx stádiumban, 3. fokozatú
Áttétes hely	Nem alkalmazható (TNM-stádium: T0NxMx; a mintavétel időpontjában nem volt igazolt távoli áttét)

Alkalmazások

Hepatocelluláris adenokarcinóma kutatása; magas fokozatú HCC modellezése; gyógyszerérzékenységi vizsgálatok (sorafenib, ciszplatin, 5-FU); májdaganatok inváziója és migrációja; betegekhez illesztett HRO-biobanki vizsgálatok

OSZTÁLYOZÁS

Organizmus	Ember
Szex	Nő
Növekedési tulajdonságok	Hűséges
GMO-státusz	GMO-mentes

A GMO-státuszra vonatkozó részletek

No genetic modification; wildtype patient-derived hepatic adenocarcinoma cell line established by PD Dr. Linnebacher. Confirmed free of HBV, HCV, HIV.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Biológiai biztonsági szint	1

JELLEMZŐK

Morfológia	Fibroblaszt-szerű
Sejttípus	Fibroblaszt-szerű (hepatocelluláris karcinóma)
Kettőzési idő	kb. 48–72 óra

AZONOSÍTÓK

Hivatkozás

HROHep03 (Cytion katalógusszám: 300197)

NCBI adóazonosító szám	9606
Cellosaurus	CVCL_2U72

KIFEJEZŐDÉS ÉS FOGÉKONYSÁG

Vírusok

HBV, HCV, HIV humán patogén vírusoktól mentes.

KEZELÉS ÉS TENYÉSZTÉS

Táptalaj

DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3,1 g/L glükóz, w: 2,5 mM L-Glutamin, w: 15 mM HEPES, w: 0,5 mM nátrium-piruvát, w: 1,2 g/L NaHCO3 (Cytion 820400a cikkszám)

Inkubációs környezet	37°C, 5%CO2, párásított légkör.

Kiegészítők

A táptalajt egészítsük ki 10% FBS-szel

Diszociációs reagens	Accutase

Átültetés

Távolítsa el a régi táptalajt a megtapadt sejtekről, és mossa őket kalcium- és magnéziummentes PBS-szel. T25-ös lombikokhoz 3-5 ml PBS-t, T75-ös lombikokhoz pedig 5-10 ml-t használjunk. Ezután fedjük be a sejteket teljesen Accutase-zal, T25 lombikok esetében 1-2 ml-t, T75 lombikok esetében 2,5 ml-t használva. A sejteket 8-10 percig hagyjuk szobahőmérsékleten inkubálni, hogy leváljanak. Az inkubálás után óvatosan keverjük össze a sejteket 10 ml tápfolyadékkal, hogy reszuszpendáljuk őket, majd centrifugáljuk 300xg-nél 3 percig. Dobja el a felülúszót, szuszpendálja újra a sejteket friss tápfolyadékban, és helyezze át őket új lombikokba, amelyek már friss tápfolyadékot tartalmaznak.

Osztási arány	1–3
Ültetési sűrűség	2 x 10^4 sejt/cm^2
Folyadékcsere	3-5 naponta
Az olvadás utáni helyreállás	2 nap

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Felolvasztás és tenyésztés

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

MINŐSÉGELLENŐRZÉS ÉS KRIOKONZERVÁLÁS

Meddőség

A mikoplazma-szennyeződést mind a PCR-alapú vizsgálatokkal, mind a lumineszcencia-alapú mikoplazma-kimutatási módszerekkel kizárják. A bakteriális, gombás vagy élesztőgombás szennyeződés elkerülése érdekében a sejtkultúrákat napi vizuális ellenőrzésnek vetik alá.

Fagyasztóközeg	Krioprezerváló táptalajként teljes növekedési táptalajt (beleértve az FBS-t) + 10% DMSO-t használunk a megfelelő kiolvasztás utáni életképesség érdekében, vagy CM-1-et (Cytion katalógusszám: 800100), amely optimalizált ozmoprotektánsokat és metabolikus stabilizátorokat tartalmaz a regenerálódás fokozása és a krio-indukált stressz csökkentése érdekében.

Tárolási feltételek

Hosszú távú tartósítás céljából helyezze az üvegeket gőzfázisú folyékony nitrogénbe, körülbelül -150 és -196 °C közötti hőmérsékleten. A -80 °C-on történő tárolás csak rövid átmeneti lépésként fogadható el a folyékony nitrogénbe való átvitel előtt.

Szállítási feltételek

A kriokonzervált sejtvonalakat szárazjégen, validált, szigetelt csomagolásban szállítják, elegendő hűtőközeggel, hogy a szállítás során a hőmérsékletet körülbelül -78 °C-on tartsák. Átvételkor azonnal vizsgálja meg a tárolóedényt, és haladéktalanul helyezze át az injekciós üvegeket a megfelelő tárolóhelyre.

ADOMÁNYOZÓ

Az adományozó életkora	71 év
Etnikai hovatartozás	Kaukázusi

JOGI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Biztonsági óvintézkedések

Ha egy kriovialitást folyékony nitrogénben tervezünk tárolni a későbbi kiolvasztás céljából, akkor kötelező betartani a szigorú biztonsági intézkedéseket. A megfelelő védőkesztyű és védőruházat elengedhetetlen, és a fagyasztott minták folyékony nitrogéntartályba vagy a folyékony nitrogéntartályból történő átvitele során arcmaszk vagy védőszemüveg használata szükséges. Ez azért van, hogy csökkentsék a kriovialis anyagok eltávolításakor bekövetkező esetleges robbanásból eredő sérülésveszélyt, amely éles szilánkok kilövellését eredményezheti.

Garancia

A Cytionnál kiállunk termékeink minősége és életképessége mellett.
Garantáljuk, hogy sejtjeink a tenyésztés megkezdésekor életképesek lesznek, a létesítményünkből történő kiszállítás után 60 napig.
Biztosítjuk, hogy minden anyag megfelel az analitikai tanúsítványban és/vagy a terméklapon leírt specifikációknak
A teljes részleteket lásd <a href="""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang="""x-default"">Garancia nyilatkozatunkban

Harmadik felekkel kötött megállapodások érvényesek	Yes