Sel HROHep03

300197

HROHep03 adalah lini sel adenokarsinoma hepatoseluler manusia yang diisolasi dari tumor hati primer seorang pasien perempuan Kaukasia berusia 71 tahun, yang termasuk dalam seri biobank HRO yang berisi lini sel tumor yang berasal dari pasien, yang dikembangkan oleh PD Dr. Michael Linnebacher sejak tahun 2006. Tumor tersebut diklasifikasikan sebagai adenokarsinoma primer pada stadium TNM T0NxMx, grade 3, yang mencerminkan adenokarsinoma hati tingkat tinggi tanpa metastasis jauh yang terkonfirmasi pada saat pengambilan jaringan. HROHep03 tumbuh sebagai lapisan tunggal yang melekat dengan morfologi mirip fibroblas dan telah dikonfirmasi bebas dari virus patogen manusia HBV, HCV, dan HIV, sesuai dengan standar kontrol kualitas yang ketat dari seri biobank Linnebacher.
HROHep03 dapat digunakan dalam penelitian adenokarsinoma hepatoseluler, studi biologi sel tumor hati tingkat tinggi, pengujian sensitivitas dan resistensi obat (sorafenib, cisplatin, 5-FU), uji invasi dan migrasi tumor hati, serta analisis jalur molekuler. Sebagai bagian dari biobank HRO, garis sel ini menyediakan sumber daya biologis spesifik pasien yang dapat dipasangkan dengan bahan imunologis yang cocok dari pasien yang sama untuk penelitian onkologi yang dipersonalisasi. Morfologi mirip fibroblasnya membedakannya secara fenotipik dari garis sel HCC mirip hepatosit yang lebih umum dan mungkin mencerminkan karakteristik epitel-ke-mesenkim yang diperoleh selama perkembangan tumor atau adaptasi in vitro.

INFORMASI UMUM

Deskripsi

HROHep03 adalah lini sel adenokarsinoma hepatoseluler manusia yang diisolasi dari tumor hati primer seorang pasien perempuan Kaukasia berusia 71 tahun, yang termasuk dalam seri biobank HRO yang berisi lini sel tumor yang berasal dari pasien, yang dikembangkan oleh PD Dr. Michael Linnebacher sejak tahun 2006. Tumor tersebut diklasifikasikan sebagai adenokarsinoma primer pada stadium TNM T0NxMx, grade 3, yang mencerminkan adenokarsinoma hati tingkat tinggi tanpa metastasis jauh yang terkonfirmasi pada saat pengambilan jaringan. HROHep03 tumbuh sebagai lapisan tunggal yang melekat dengan morfologi mirip fibroblas dan telah dikonfirmasi bebas dari virus patogen manusia HBV, HCV, dan HIV, sesuai dengan standar kontrol kualitas yang ketat dari seri biobank Linnebacher.
HROHep03 dapat digunakan dalam penelitian adenokarsinoma hepatoseluler, studi biologi sel tumor hati tingkat tinggi, pengujian sensitivitas dan resistensi obat (sorafenib, cisplatin, 5-FU), uji invasi dan migrasi tumor hati, serta analisis jalur molekuler. Sebagai bagian dari biobank HRO, garis sel ini menyediakan sumber daya biologis spesifik pasien yang dapat dipasangkan dengan bahan imunologis yang cocok dari pasien yang sama untuk penelitian onkologi yang dipersonalisasi. Morfologi mirip fibroblasnya membedakannya secara fenotipik dari garis sel HCC mirip hepatosit yang lebih umum dan mungkin mencerminkan karakteristik epitel-ke-mesenkim yang diperoleh selama perkembangan tumor atau adaptasi in vitro.

Tisu	Hati
Penyakit	Adenokarsinoma primer, stadium T0NxMx, grade 3
Lokasi metastasis	Tidak berlaku (stadium TNM T0NxMx; tidak ada metastasis jauh yang terkonfirmasi pada saat pengambilan sampel)

Aplikasi

Penelitian mengenai adenokarsinoma hepatoseluler; pemodelan HCC tingkat tinggi; uji sensitivitas obat (sorafenib, cisplatin, 5-FU); invasi dan migrasi tumor hati; studi biobank HRO yang disesuaikan dengan pasien

KLASIFIKASI

Organisme	Manusia
Seks	Perempuan
Sifat-sifat pertumbuhan	Pengikut
Status GMO	Bebas Transgenik

Rincian status GMO

No genetic modification; wildtype patient-derived hepatic adenocarcinoma cell line established by PD Dr. Linnebacher. Confirmed free of HBV, HCV, HIV.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Tingkat keamanan hayati	1

KARAKTERISTIK

Morfologi	Seperti fibroblast
Jenis sel	Mirip fibroblas (karsinoma hepatoseluler)
Waktu penggandaan	sekitar 48 hingga 72 jam

PENGIDENTIFIKASI

Referensi

HROHep03 (Nomor katalog Cytion 300197)

Nomor Identifikasi Pajak NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_2U72

EKSPRESI DAN KERENTANAN

Virus

Bebas dari virus patogen manusia HBV, HCV, HIV.

PENANGANAN DAN BUDIDAYA

Media kultur

DMEM: Ham's F12 (1:1), w: 3,1 g/L Glukosa, w: 2,5 mM L-Glutamin, w: 15 mM HEPES, w: 0,5 mM Natrium piruvat, w: 1,2 g/L NaHCO3 (Nomor artikel Cytion 820400a)

Suasana inkubasi	37°C, 5%CO2, atmosfer yang dilembabkan.

Suplemen

Tambahkan media dengan 10% FBS

Reagen disosiasi	Accutase

Perbanyakan sel

Buang media lama dari sel yang melekat dan cuci dengan PBS yang tidak mengandung kalsium dan magnesium. Untuk labu T25, gunakan 3-5 ml PBS, dan untuk labu T75, gunakan 5-10 ml. Kemudian, tutupi sel sepenuhnya dengan Accutase, menggunakan 1-2 ml untuk labu T25 dan 2,5 ml untuk labu T75. Biarkan sel diinkubasi pada suhu kamar selama 8-10 menit untuk melepaskannya. Setelah inkubasi, campurkan sel secara perlahan dengan 10 ml medium untuk meresuspensi sel, kemudian sentrifugasi pada 300xg selama 3 menit. Buang supernatan, resuspensi sel dalam medium segar, dan pindahkan ke dalam labu baru yang sudah berisi medium segar.

Rasio pemisahan	1 sampai 3
Kepadatan penanaman	2 x 10^4 sel/cm^2
Pergantian cairan	Setiap 3 hingga 5 hari
Pemulihan pasca-pencairan	2 hari

Pencairan dan pembiakan

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

PENGENDALIAN MUTU DAN KRIOPRESERVASI

Kemandulan

Kontaminasi mikoplasma disingkirkan dengan menggunakan tes berbasis PCR dan metode deteksi mikoplasma berbasis pendaran.
Untuk memastikan tidak ada kontaminasi bakteri, jamur, atau ragi, kultur sel menjalani inspeksi visual setiap hari.

Media pembekuan	Sebagai media kriopreservasi, kami menggunakan media pertumbuhan lengkap (termasuk FBS) + 10% DMSO untuk viabilitas pasca-pencairan yang memadai, atau CM-1 (nomor katalog Cytion 800100), yang mencakup osmoprotektan yang dioptimalkan dan penstabil metabolisme untuk meningkatkan pemulihan dan mengurangi stres yang diinduksi kriopreservasi.

Kondisi penyimpanan

Untuk pengawetan jangka panjang, tempatkan botol dalam nitrogen cair fase uap pada suhu sekitar -150 hingga -196 °C. Penyimpanan pada suhu -80 °C hanya dapat diterima sebagai langkah sementara sebelum dipindahkan ke nitrogen cair.

Ketentuan pengiriman

Lini sel kriopreservasi dikirim di atas es kering dalam kemasan terisolasi yang divalidasi dengan refrigeran yang cukup untuk mempertahankan suhu sekitar -78 ° C selama perjalanan. Setelah diterima, segera periksa wadah dan pindahkan botol tanpa penundaan ke tempat penyimpanan yang sesuai.

DONATUR

Usia donor	71 tahun
Etnis	Kaukasia

HUKUM DAN KESELAMATAN

Tindakan pencegahan keselamatan

Ketika berencana menyimpan kriovial dalam nitrogen cair untuk pencairan di masa mendatang, Anda wajib mematuhi langkah-langkah keamanan yang ketat. Sarung tangan dan pakaian pelindung yang tepat sangat penting, dan penggunaan masker wajah atau kacamata pengaman diperlukan selama pemindahan sampel beku ke atau dari tangki nitrogen cair. Hal ini untuk mengurangi risiko cedera akibat potensi ledakan cryovial pada saat pemindahan, yang dapat mengakibatkan proyeksi fragmen tajam.

Garansi

Di Cytion, kami mendukung kualitas dan kelangsungan hidup produk kami.
Kami menjamin bahwa sel kami akan dapat bertahan hidup pada awal kultur selama 60 hari setelah pengiriman dari fasilitas kami.
Kami menjamin bahwa semua bahan sesuai dengan spesifikasi yang dijelaskan dalam Sertifikat Analisis dan / atau Lembar Produk
Untuk detail lengkap, silakan merujuk ke <a href=""/Siapa-kami-Garansi/Garansi/"" hreflang=""x-default"">Pernyataan Jaminan kami

Berlaku ketentuan perjanjian pihak ketiga	Yes