Buňky L-540

300201

L-540 je lidská buněčná linie Hodgkinova lymfomu odvozená od pacienta s touto formou rakoviny. Tato buněčná linie je hojně využívána ve výzkumu zaměřeném na molekulární a buněčné mechanismy, které jsou základem Hodgkinova lymfomu, zhoubného onemocnění pocházejícího z B lymfocytů. Buňky L-540 vykazují charakteristické Reed-Sternbergovy buňky, které jsou charakteristickým znakem Hodgkinova lymfomu a jsou rozhodující pro diagnostiku tohoto onemocnění. Přítomnost těchto vícejaderných obrovských buněk činí z L-540 neocenitelný model pro studium patofyziologie Hodgkinova lymfomu a pro screening potenciálních terapeutických látek zaměřených na tyto maligní buňky.
Jednou z pozoruhodných vlastností L-540 je exprese CD30, člena rodiny receptorů pro tumor nekrotizující faktor, který je často nadměrně exprimován v buňkách Hodgkinova lymfomu. Díky tomu je L-540 vynikajícím modelem pro zkoumání terapií cílených na CD30, jako jsou konjugáty protilátek a léků. Kromě toho byly buňky L-540 použity ke studiu účinků různých chemoterapeutik a ke zkoumání mechanismů rezistence na léky u lymfomů. Schopnost buněčné linie vytvářet nádory v imunokompromitovaných myších dále zvyšuje její využitelnost v preklinických studiích zaměřených na hodnocení účinnosti nové léčby Hodgkinova lymfomu.

OBECNÉ INFORMACE

Popis

L-540 je lidská buněčná linie Hodgkinova lymfomu odvozená od pacienta s touto formou rakoviny. Tato buněčná linie je hojně využívána ve výzkumu zaměřeném na molekulární a buněčné mechanismy, které jsou základem Hodgkinova lymfomu, zhoubného onemocnění pocházejícího z B lymfocytů. Buňky L-540 vykazují charakteristické Reed-Sternbergovy buňky, které jsou charakteristickým znakem Hodgkinova lymfomu a jsou rozhodující pro diagnostiku tohoto onemocnění. Přítomnost těchto vícejaderných obrovských buněk činí z L-540 neocenitelný model pro studium patofyziologie Hodgkinova lymfomu a pro screening potenciálních terapeutických látek zaměřených na tyto maligní buňky.
Jednou z pozoruhodných vlastností L-540 je exprese CD30, člena rodiny receptorů pro tumor nekrotizující faktor, který je často nadměrně exprimován v buňkách Hodgkinova lymfomu. Díky tomu je L-540 vynikajícím modelem pro zkoumání terapií cílených na CD30, jako jsou konjugáty protilátek a léků. Kromě toho byly buňky L-540 použity ke studiu účinků různých chemoterapeutik a ke zkoumání mechanismů rezistence na léky u lymfomů. Schopnost buněčné linie vytvářet nádory v imunokompromitovaných myších dále zvyšuje její využitelnost v preklinických studiích zaměřených na hodnocení účinnosti nové léčby Hodgkinova lymfomu.

Tkáň	Kostní dřeň
Nemoc	Hodgkinův lymfom

Synonyma

- L 540
- L540

KLASIFIKACE

Organismus	Člověk
Sex	Žena
Růstové vlastnosti	Odpružení
Úroveň biologické bezpečnosti	1

CHARAKTERISTIKA

Morfologie	Kulaté buňky

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

IDENTIFIKÁTORY

Citace

L-540 (katalogové číslo Cytion 300201)

Daňové identifikační číslo NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_1362

EXPRESE A NÁCHYLNOST

Viry

Transformované EBV

MANIPULACE A CHOV

Pěstovací médium

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabilní glutamin, w: 2,0 g/l NaHCO3 (číslo výrobku Cytion 820700a)

Inkubační atmosféra	37 °C, 5 %CO2, zvlhčená atmosféra.

Doplňky stravy

Doplňte médium o 10% FBS

Subkultivace

Jemně homogenizujte buněčnou suspenzi v baňce pipetováním nahoru a dolů, poté odeberte reprezentativní vzorek pro stanovení buněčné hustoty na ml. Suspenzi zřeďte čerstvým kultivačním médiem tak, aby koncentrace buněk byla 1 x 10^5 buněk/ml, a upravenou suspenzi rozdělte do nových baňek pro další kultivaci.

Obnova tekutin	3krát týdně

Rozmrazování a kultivace

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KVALITY A KRYOKONZERVACE

Sterilita

Kontaminace mykoplazmaty je vyloučena jak pomocí testů založených na PCR, tak pomocí luminiscenčních metod detekce mykoplazmy. Aby se zajistilo, že nedojde ke kontaminaci bakteriemi, plísněmi nebo kvasinkami, jsou buněčné kultury denně podrobovány vizuálním kontrolám.

Mrazicí médium	Jako kryokonzervační médium používáme kompletní růstové médium (včetně FBS) + 10 % DMSO pro zajištění dostatečné životaschopnosti po rozmrazení nebo CM-1 (katalogové číslo 800100 společnosti Cytion), které obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory pro zlepšení regenerace a snížení stresu způsobeného kryo.

Podmínky skladování

Pro dlouhodobé uchování umístěte lahvičky do kapalného dusíku v plynné fázi při teplotě přibližně -150 až -196 °C. Skladování při -80 °C je přijatelné pouze jako krátký přechodný krok před přemístěním do kapalného dusíku.

Dopravní podmínky

Kryokonzervované buněčné linie se přepravují na suchém ledu v ověřených, izolovaných obalech s dostatečným množstvím chladiva, aby se po celou dobu přepravy udržovala teplota přibližně -78 °C. Po obdržení ihned zkontrolujte obal a neprodleně přeneste lahvičky do vhodného skladu.

DÁRCE

Věk dárce	20 let
Etnická příslušnost	Evropská

PRÁVNÍ INFORMACE A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Bezpečnostní opatření

Při plánování uložení kryovialu v kapalném dusíku pro budoucí rozmrazení je nutné dodržovat přísná bezpečnostní opatření. Nezbytné jsou vhodné ochranné rukavice a oděv a při přenášení zmrazených vzorků do nádrže s kapalným dusíkem nebo z ní je nutné používat obličejovou masku nebo ochranné brýle. To proto, aby se snížilo riziko zranění v důsledku možných výbuchů kryovialů při jejich vyjímání, které mohou mít za následek vystřelování ostrých úlomků.

Záruka

Ve společnosti Cytion si stojíme za kvalitou a životaschopností našich produktů.
Zaručujeme, že naše buňky budou životaschopné na začátku kultivace po dobu 60 dnů po odeslání z našich zařízení.
Zaručujeme, že všechny materiály odpovídají specifikacím popsaným v certifikátu analýzy a/nebo v produktovém listu
Úplné informace naleznete v našem <a href=""/Kdo-jsme/Záruka/"" hreflang=""x-default"">Záručním prohlášení

Je nutná smlouva o převodu materiálu	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB