Células L-540

300201

La L-540 es una línea celular de linfoma de Hodgkin humano derivada de un paciente con este tipo de cáncer. Esta línea celular se utiliza ampliamente en investigaciones centradas en los mecanismos moleculares y celulares que subyacen al linfoma de Hodgkin, una neoplasia maligna que se origina en los linfocitos B. Las células L-540 presentan las características células de Reed-Sternberg, que son un rasgo distintivo del linfoma de Hodgkin y fundamentales para diagnosticar esta enfermedad. La presencia de estas células gigantes multinucleadas convierte a la L-540 en un modelo invaluable para estudiar la fisiopatología del linfoma de Hodgkin y para evaluar posibles agentes terapéuticos dirigidos contra estas células malignas.
Una de las características más destacadas de la L-540 es su expresión de CD30, un miembro de la familia de receptores del factor de necrosis tumoral, que a menudo se sobreexpresa en las células del linfoma de Hodgkin. Esto convierte a la L-540 en un modelo excelente para investigar terapias dirigidas contra el CD30, como los conjugados de anticuerpos y fármacos. Además, las células L-540 se han utilizado para estudiar los efectos de diversos agentes quimioterapéuticos y para explorar los mecanismos de resistencia a los medicamentos en el linfoma. La capacidad de esta línea celular para formar tumores en ratones inmunodeprimidos aumenta aún más su utilidad en estudios preclínicos destinados a evaluar la eficacia de nuevos tratamientos para el linfoma de Hodgkin.

GENERAL INFORMATION

Description

La L-540 es una línea celular de linfoma de Hodgkin humano derivada de un paciente con este tipo de cáncer. Esta línea celular se utiliza ampliamente en investigaciones centradas en los mecanismos moleculares y celulares que subyacen al linfoma de Hodgkin, una neoplasia maligna que se origina en los linfocitos B. Las células L-540 presentan las características células de Reed-Sternberg, que son un rasgo distintivo del linfoma de Hodgkin y fundamentales para diagnosticar esta enfermedad. La presencia de estas células gigantes multinucleadas convierte a la L-540 en un modelo invaluable para estudiar la fisiopatología del linfoma de Hodgkin y para evaluar posibles agentes terapéuticos dirigidos contra estas células malignas.
Una de las características más destacadas de la L-540 es su expresión de CD30, un miembro de la familia de receptores del factor de necrosis tumoral, que a menudo se sobreexpresa en las células del linfoma de Hodgkin. Esto convierte a la L-540 en un modelo excelente para investigar terapias dirigidas contra el CD30, como los conjugados de anticuerpos y fármacos. Además, las células L-540 se han utilizado para estudiar los efectos de diversos agentes quimioterapéuticos y para explorar los mecanismos de resistencia a los medicamentos en el linfoma. La capacidad de esta línea celular para formar tumores en ratones inmunodeprimidos aumenta aún más su utilidad en estudios preclínicos destinados a evaluar la eficacia de nuevos tratamientos para el linfoma de Hodgkin.

Tissue	Médula ósea
Disease	Linfoma de Hodgkin

Synonyms

- L 540
- L540

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Female
Growth properties	Suspension
Biosafety level	1

CHARACTERISTICS

Morphology	Células redondas

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

IDENTIFIERS

Citation

L-540 (número de catálogo de Cytion 300201)

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_1362

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Viruses

Transformado por el VEB

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

RPMI 1640, con 2,0 mM de glutamina estable y 2,0 g/L de $NaHCO_3$ (número de artículo de Cytion: 820700a)

Incubation atmosphere	37 °C, 5 % de CO_2, atmósfera humidificada.

Supplements

Añade al medio un 10 % de FBS

Subculturing

Homogeneice suavemente la suspensión celular en el matraz pipeteando de arriba hacia abajo; luego, tome una muestra representativa para determinar la densidad celular por ml. Diluya la suspensión con medio de cultivo fresco hasta alcanzar una concentración celular de 1×10^5 células/ml, y divida la suspensión ajustada en alícuotas en matraces nuevos para continuar con el cultivo.

Fluid renewal	3 veces por semana

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

Se descarta la contaminación por micoplasmas mediante ensayos basados en PCR y métodos de detección de micoplasmas basados en luminiscencia.
Para garantizar que no haya contaminación bacteriana, fúngica o por levaduras, los cultivos celulares se someten a inspecciones visuales diarias.

Freeze medium	Como medio de criopreservación, utilizamos un medio de crecimiento completo (que incluye FBS) + 10 % de DMSO para garantizar una viabilidad adecuada tras la descongelación, o CM-1 (número de catálogo de Cytion 800100), que incluye osmoprotectores y estabilizadores metabólicos optimizados para mejorar la recuperación y reducir el estrés inducido por la criopreservación.

Storage conditions

Para la conservación a largo plazo, coloque los viales en nitrógeno líquido en fase de vapor a una temperatura de entre −150 y −196 °C, aproximadamente. El almacenamiento a −80 °C solo es aceptable como un paso intermedio breve antes de transferirlos al nitrógeno líquido.

Shipping conditions

Las líneas celulares criopreservadas se envían en hielo seco, en un embalaje aislante validado que contiene suficiente refrigerante para mantener una temperatura de aproximadamente −78 °C durante todo el transporte. Al recibir el envío, revise el contenedor de inmediato y traslade los viales sin demora al lugar de almacenamiento adecuado.

DONOR

Donor age	20 años
Ethnicity	Europeo

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

Cuando se planea almacenar un criovial en nitrógeno líquido para su descongelación futura, es obligatorio cumplir con estrictas medidas de seguridad. Es esencial contar con guantes y ropa de protección adecuados, y se requiere el uso de una mascarilla o lentes de seguridad durante la transferencia de muestras congeladas hacia o desde el tanque de nitrógeno líquido. Esto tiene como objetivo mitigar el riesgo de lesiones por posibles explosiones de los criotubos al retirarlos, lo que puede provocar la proyección de fragmentos afilados.

Warranty

En Cytion, respaldamos la calidad y la viabilidad de nuestros productos.
Garantizamos que nuestras células serán viables al inicio del cultivo durante
60 días a partir de la fecha de envío desde nuestras instalaciones.
Aseguramos que todos los materiales cumplen con las especificaciones descritas en el
Certificado de Análisis y/o la Ficha del Producto.
Para obtener más detalles, consulte nuestra
Declaración de garantía.

Material Transfer Agreement required	Yes