Cellule L-540

300201

L-540 è una linea cellulare umana di linfoma di Hodgkin derivata da un paziente affetto da questa forma di cancro. Questa linea cellulare è ampiamente utilizzata nella ricerca incentrata sui meccanismi molecolari e cellulari alla base del linfoma di Hodgkin, un tumore maligno che origina dai linfociti B. Le cellule L-540 presentano le caratteristiche cellule di Reed-Sternberg, che sono un segno distintivo del linfoma di Hodgkin e sono fondamentali per la diagnosi di questa malattia. La presenza di queste cellule giganti multinucleate rende L-540 un modello prezioso per lo studio della fisiopatologia del linfoma di Hodgkin e per lo screening di potenziali agenti terapeutici mirati a queste cellule maligne.
Una delle caratteristiche notevoli di L-540 è la sua espressione di CD30, un membro della famiglia dei recettori del fattore di necrosi tumorale, che è spesso sovraespresso nelle cellule del linfoma di Hodgkin. Ciò rende L-540 un modello eccellente per lo studio di terapie mirate al CD30, come i coniugati anticorpo-farmaco. Inoltre, le cellule L-540 sono state utilizzate per studiare gli effetti di vari agenti chemioterapici e per esplorare i meccanismi di resistenza ai farmaci nel linfoma. La capacità della linea cellulare di formare tumori in topi immunocompromessi ne aumenta ulteriormente l'utilità negli studi preclinici volti a valutare l'efficacia di nuovi trattamenti per il linfoma di Hodgkin.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrizione

L-540 è una linea cellulare umana di linfoma di Hodgkin derivata da un paziente affetto da questa forma di cancro. Questa linea cellulare è ampiamente utilizzata nella ricerca incentrata sui meccanismi molecolari e cellulari alla base del linfoma di Hodgkin, un tumore maligno che origina dai linfociti B. Le cellule L-540 presentano le caratteristiche cellule di Reed-Sternberg, che sono un segno distintivo del linfoma di Hodgkin e sono fondamentali per la diagnosi di questa malattia. La presenza di queste cellule giganti multinucleate rende L-540 un modello prezioso per lo studio della fisiopatologia del linfoma di Hodgkin e per lo screening di potenziali agenti terapeutici mirati a queste cellule maligne.
Una delle caratteristiche notevoli di L-540 è la sua espressione di CD30, un membro della famiglia dei recettori del fattore di necrosi tumorale, che è spesso sovraespresso nelle cellule del linfoma di Hodgkin. Ciò rende L-540 un modello eccellente per lo studio di terapie mirate al CD30, come i coniugati anticorpo-farmaco. Inoltre, le cellule L-540 sono state utilizzate per studiare gli effetti di vari agenti chemioterapici e per esplorare i meccanismi di resistenza ai farmaci nel linfoma. La capacità della linea cellulare di formare tumori in topi immunocompromessi ne aumenta ulteriormente l'utilità negli studi preclinici volti a valutare l'efficacia di nuovi trattamenti per il linfoma di Hodgkin.

Tessuto	Midollo osseo
Malattia	Linfoma di Hodgkin

Sinonimi

- L 540
- L540

CLASSIFICAZIONE

Organismo	Umano
Sesso	Donna
Proprietà di crescita	Sospensione
Livello di biosicurezza	1

CARATTERISTICHE

Morfologia	Celle rotonde

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

IDENTIFICATORI

Riferimento bibliografico

L-540 (numero di catalogo Cytion 300201)

Codice fiscale NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_1362

ESPRESSIONE E SUSCETTIBILITÀ

Virus

Trasformato da EBV

MANIPOLAZIONE E COLTURA

Terreno di coltura

RPMI 1640, w: 2,0 mM di glutammina stabile, w: 2,0 g/L di NaHCO3 (articolo Cytion numero 820700a)

Atmosfera di incubazione	37°C, 5%CO2, atmosfera umidificata.

Integratori

Integrare il terreno di coltura con il 10% di FBS

Subcoltura

Omogeneizzare delicatamente la sospensione cellulare nel pallone pipettando verso l'alto e verso il basso, quindi prelevare un campione rappresentativo per determinare la densità cellulare per ml. Diluire la sospensione per ottenere una concentrazione cellulare di 1 x 10^5 cellule/ml con terreno di coltura fresco e aliquotare la sospensione regolata in nuovi palloni per l'ulteriore coltivazione.

Rinnovo dei fluidi	3 volte a settimana

Scongelamento e coltura

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTROLLO DI QUALITÀ E CRIOCONSERVAZIONE

Sterilità

La contaminazione da micoplasma viene esclusa utilizzando sia saggi basati sulla PCR sia metodi di rilevamento del micoplasma basati sulla luminescenza.
Per garantire l'assenza di contaminazione batterica, fungina o da lieviti, le colture cellulari sono sottoposte a ispezioni visive quotidiane.

Terreno di coltura congelato	Come terreno di crioconservazione, utilizziamo un terreno di crescita completo (incluso FBS) + 10% DMSO per un'adeguata vitalità post-scongelamento, o CM-1 (numero di catalogo Cytion 800100), che include osmoprotettori e stabilizzatori metabolici ottimizzati per migliorare il recupero e ridurre lo stress crio-indotto.

Condizioni di conservazione

Per la conservazione a lungo termine, porre le fiale in azoto liquido in fase vapore a una temperatura compresa tra -150 e -196 °C circa. La conservazione a -80 °C è accettabile solo come breve fase intermedia prima del trasferimento in azoto liquido.

Condizioni di spedizione

Le linee cellulari crioconservate vengono spedite su ghiaccio secco in confezioni isolate e convalidate, con una quantità di refrigerante sufficiente a mantenere circa -78 °C durante il trasporto. Al ricevimento, ispezionare immediatamente il contenitore e trasferire immediatamente le fiale in un luogo di conservazione appropriato.

DONATORE

Età dei donatori	20 anni
Etnia	Europeo

ASPETTI LEGALI E DI SICUREZZA

Misure di sicurezza

Quando si prevede di conservare una crioviale in azoto liquido per un futuro scongelamento, è obbligatorio attenersi a rigorose misure di sicurezza. Guanti e indumenti protettivi appropriati sono essenziali e l'uso di una maschera facciale o di occhiali di sicurezza è richiesto durante il trasferimento dei campioni congelati da o verso il serbatoio di azoto liquido. Questo per ridurre il rischio di lesioni dovute a potenziali esplosioni di crioviali al momento della rimozione, che possono provocare la proiezione di frammenti taglienti.

Garanzia

Noi di Cytion garantiamo la qualità e la vitalità dei nostri prodotti.
Garantiamo che le nostre cellule saranno vitali all'inizio della coltura per 60 giorni dopo la spedizione dai nostri stabilimenti.
Assicuriamo che tutti i materiali sono conformi alle specifiche descritte nel Certificato di Analisi e/o nella Scheda Prodotto
Per tutti i dettagli, consultare la nostra <a href=""/Chi-siamo/Garanzia/"" hreflang=""x-default"">Dichiarazione di Garanzia

È richiesto un accordo di trasferimento di materiale	Yes