L-540 □

300201

L-540□ 이러한 형태의 암을 앓고 있는 환자에게서 추출한 인간 호지킨 림프종 세포주입니다. 이 세포주는 B 림프구에서 발생하는 악성 종양인 호지킨 림프종의 분자 및 세포 메커니즘에 초점을 맞춘 연구에 광범위하게 활용되고 있습니다. L-540 세포는 호지킨 림프종의 특징이자 이 질환을 진단하는 데 중요한 리드-스턴버그 세포의 특징을 나타냅니다. 이러한 다핵 거대 세포의 존재로 인해 L-540□ 호지킨 림프종의 병태 생리를 연구하고 이러한 악성 세포를 표적으로 하는 잠재적 치료제를 선별하는 데 매우 귀중한 모델이 됩니다.

L-540의 주목할 만한 특징 중 하나는 호지킨 림프종 세포에서 종종 과발현되는 종양괴사인자 수용체 계열의 일원인 CD30의 발현입니다. 따라서 L-540□ 항체-약물 접합체와 같□ CD30 표적 치료법을 연구하는 데 탁월한 모델입니다. 또한 L-540 세포는 다양한 화학요법제의 효과를 연구하고 림프종에서 약물 내성의 메커니즘을 탐구하는 데 사용되었습니다. 면역력이 저하된 마우스에서 종양을 형성하는 세포주의 능력□ 호지킨 림프종에 대한 새로운 치료법의 효능을 평가하기 위한 전임상 연구에서 그 유용성을 더욱 높여줍니다.

일반 정보

□명

L-540□ 이러한 형태의 암을 앓고 있는 환자에게서 추출한 인간 호지킨 림프종 세포주입니다. 이 세포주는 B 림프구에서 발생하는 악성 종양인 호지킨 림프종의 분자 및 세포 메커니즘에 초점을 맞춘 연구에 광범위하게 활용되고 있습니다. L-540 세포는 호지킨 림프종의 특징이자 이 질환을 진단하는 데 중요한 리드-스턴버그 세포의 특징을 나타냅니다. 이러한 다핵 거대 세포의 존재로 인해 L-540□ 호지킨 림프종의 병태 생리를 연구하고 이러한 악성 세포를 표적으로 하는 잠재적 치료제를 선별하는 데 매우 귀중한 모델이 됩니다.
L-540의 주목할 만한 특징 중 하나는 호지킨 림프종 세포에서 종종 과발현되는 종양괴사인자 수용체 계열의 일원인 CD30의 발현입니다. 따라서 L-540□ 항체-약물 접합체와 같□ CD30 표적 치료법을 연구하는 데 탁월한 모델입니다. 또한 L-540 세포는 다양한 화학요법제의 효과를 연구하고 림프종에서 약물 내성의 메커니즘을 탐구하는 데 사용되었습니다. 면역력이 저하된 마우스에서 종양을 형성하는 세포주의 능력□ 호지킨 림프종에 대한 새로운 치료법의 효능을 평가하기 위한 전임상 연구에서 그 유용성을 더욱 높여줍니다.

티슈	골수
질병	호지킨 림프종

동의어

- L 540
- L540

분류

생물체	인간
성	여성
성장 특성	정지
생물안전 등급	1

특징

형태학	원형 셀

식별자

인용

L-540(사이티온 카탈로그 번호 300201)

NCBI 세금 식별번호	9606
셀로사우루스	CVCL_1362

발현 및 감수성

바이러스

EBV의 변화

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

취급 및 배양

배지

RPMI 1640, w: 2.0mM 안정 글루타민, w: 2.0g/L NaHCO3(사이티온 제품 번호 820700a)

배양 조건	37°C, 5%CO2, 습한 대기.

건강보조식품

10% FBS로 배지를 보충합니다

재배양

플라스크 내 세포 현탁액을 피펫팅으로 위아래로 가볍게 균질화한 후, 대표 샘플을 채취하여 ml당 세포 농도를 측정합니다. 신선한 배지로 현탁액을 희석하여 세포 농도를 1 x 10^5 세포/ml로 조정한 후, 조정된 현탁액을 새로운 플라스크에 분주하여 추가 배양합니다.

유체 교체	주 3회

해동 및 배양

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

품질 관리 및 냉동 보존

불임

마이코플라스마 오염□ PCR 기반 분석법과 발광 기반 마이코플라스마 검출법을 모두 사용하여 배제합니다.
박테리아, 곰팡이 또는 효모 오염이 없는지 확인하기 위해 세포 배양□ 매일 육안 검사를 거칩니다.

배양액 동결	냉동 보존 배지로는 해동 후 충분한 생존력을 위해 완전 성장 배지(FBS 포함) + 10% DMSO를 사용하거나, 최적화된 삼투 보호제 및 대사 안정제가 포함된 CM-1(Cytion 카탈로그 번호 800100)을 사용하여 회복력을 높이고 냉동으로 인한 스트레스를 줄입니다.

보관 조건

장기 보존을 위해서는 바이알을 약 -150°C에서 -196°C의 증기상 액체 질소에 넣으세요. 80°C에서 보관하는 것□ 액체 질소로 옮기기 전 짧□ 중간 단계로만 허용됩니다.

배송 조건

냉동 보존 세포주는 운송 중 약 -78°C를 유지할 수 있는 충분한 냉매가 포함된 검증된 단열 포장에 드라이아이스를 넣어 배송됩니다. 수령 즉시 용기를 검사하고 바이알을 지체 없이 적절한 보관 장소로 옮깁니다.

기부자

기증자 연령	20년
민족	유럽

법률 및 안전

안전 수칙

향후 해동을 위해 액체 질소에 냉동 보관을 계획하는 경우, 엄격한 안전 조치를 준수해야 합니다. 적절한 보호 장갑과 의복□ 필수이며, 액체 질소 탱크로 냉동 샘플을 옮길 때는 반드시 안면 마스크나 보안경을 착용해야 합니다. 이는 제거 시 날카로운 파편이 튀어나올 수 있는 극저온 폭발로 인한 부상 위험을 줄이기 위한 것입니다.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

보증

싸이티온□ 제품의 품질과 생존력을 보증합니다 .
당사는 당사 시설에서 배송된 후 60일 동안 배양 시작 시 세포가 생존할 수 있음을 보증합니다.
당사는 모든 재료가 분석 증명서 및/또는 제품 시트에 설명된 사양을 준수함을 보증합니다
자세한 내용□ <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">보증서 를 참조하시기 바랍니다

물질 이전 계약서**(MTA)**가 필요합니다**.**	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB