L-540 Cellen

300201

L-540 is een humane Hodgkin-lymfoomcellijn afkomstig van een patiënt met deze vorm van kanker. Deze cellijn wordt op grote schaal gebruikt in onderzoek dat zich richt op de moleculaire en cellulaire mechanismen die ten grondslag liggen aan Hodgkinlymfoom, een maligniteit die zijn oorsprong vindt in B-lymfocyten. L-540 cellen vertonen de karakteristieke Reed-Sternberg cellen, die een kenmerk zijn van Hodgkin lymfoom en cruciaal zijn voor de diagnose van deze ziekte. De aanwezigheid van deze multinucleaire reusachtige cellen maakt L-540 tot een model van onschatbare waarde voor het bestuderen van de pathofysiologie van Hodgkinlymfoom en voor het screenen van potentiële therapeutische middelen die gericht zijn op deze kwaadaardige cellen.
Een van de opvallende kenmerken van L-540 is de expressie van CD30, een lid van de tumornecrosefactorreceptorfamilie, die vaak tot overexpressie komt in Hodgkinlymfoomcellen. Dit maakt L-540 een uitstekend model voor het onderzoeken van CD30-gerichte therapieën, zoals antilichaam-drug conjugaten. Daarnaast zijn L-540 cellen gebruikt om de effecten van verschillende chemotherapeutische middelen te bestuderen en om de mechanismen van geneesmiddelenresistentie bij lymfomen te onderzoeken. Het vermogen van de cellijn om tumoren te vormen in immuungecompromitteerde muizen vergroot de bruikbaarheid in preklinische studies gericht op het evalueren van de werkzaamheid van nieuwe behandelingen voor Hodgkin-lymfoom.

ALGEMENE INFORMATIE

Beschrijving

L-540 is een humane Hodgkin-lymfoomcellijn afkomstig van een patiënt met deze vorm van kanker. Deze cellijn wordt op grote schaal gebruikt in onderzoek dat zich richt op de moleculaire en cellulaire mechanismen die ten grondslag liggen aan Hodgkinlymfoom, een maligniteit die zijn oorsprong vindt in B-lymfocyten. L-540 cellen vertonen de karakteristieke Reed-Sternberg cellen, die een kenmerk zijn van Hodgkin lymfoom en cruciaal zijn voor de diagnose van deze ziekte. De aanwezigheid van deze multinucleaire reusachtige cellen maakt L-540 tot een model van onschatbare waarde voor het bestuderen van de pathofysiologie van Hodgkinlymfoom en voor het screenen van potentiële therapeutische middelen die gericht zijn op deze kwaadaardige cellen.
Een van de opvallende kenmerken van L-540 is de expressie van CD30, een lid van de tumornecrosefactorreceptorfamilie, die vaak tot overexpressie komt in Hodgkinlymfoomcellen. Dit maakt L-540 een uitstekend model voor het onderzoeken van CD30-gerichte therapieën, zoals antilichaam-drug conjugaten. Daarnaast zijn L-540 cellen gebruikt om de effecten van verschillende chemotherapeutische middelen te bestuderen en om de mechanismen van geneesmiddelenresistentie bij lymfomen te onderzoeken. Het vermogen van de cellijn om tumoren te vormen in immuungecompromitteerde muizen vergroot de bruikbaarheid in preklinische studies gericht op het evalueren van de werkzaamheid van nieuwe behandelingen voor Hodgkin-lymfoom.

Weefsel	Beenmerg
Ziekte	Hodgkinlymfoom

Synoniemen

- L 540
- L540

CLASSIFICATIE

Organisme	Mens
Seks	Vrouw
Groei-eigenschappen	Ophanging
Bioveiligheidsniveau	1

KENMERKEN

Morfologie	Ronde cellen

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

IDENTIFICATIEGEGEVENS

Bronvermelding

L-540 (Cytion catalogusnummer 300201)

NCBI-belastingnummer	9606
Cellosaurus	CVCL_1362

EXPRESSIE EN VATBAARHEID

Virussen

Getransformeerd door EBV

BEHANDELING EN KWEEK

Kweekmedium

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabiele Glutamine, w: 2,0 g/L $NaHCO_3$ (Cytion artikelnummer 820700a)

Incubatieomgeving	37°C, 5%CO2, bevochtigde atmosfeer.

Supplementen

Vul het medium aan met 10% FBS

Heruitplanten

Homogeniseer de celsuspensie in de kolf voorzichtig door op en neer te pipetteren en neem vervolgens een representatief monster om de celdichtheid per ml te bepalen. Verdun de suspensie tot een celconcentratie van 1 x 10^5 cellen/ml met vers kweekmedium en verdeel de aangepaste suspensie in nieuwe kolven voor verdere kweek.

Vloeistofverversing	3 keer per week

Ontdooien en kweken

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KWALITEITSCONTROLE EN CRYOPRESERVATIE

Onvruchtbaarheid

Mycoplasmaverontreiniging wordt uitgesloten met zowel PCR-gebaseerde testen als op luminescentie gebaseerde mycoplasmadetectiemethoden.
Om er zeker van te zijn dat er geen besmetting is met bacteriën, schimmels of gisten, worden de celculturen dagelijks onderworpen aan visuele inspecties.

Kweekmedium invriezen	Als cryoconserveringsmedium gebruiken we volledig groeimedium (inclusief FBS) + 10% DMSO voor voldoende levensvatbaarheid na het ontdooien, of CM-1 (Cytion catalogusnummer 800100), dat geoptimaliseerde osmoprotectanten en metabolische stabilisatoren bevat om het herstel te verbeteren en door cryo geïnduceerde stress te verminderen.

Opslagvoorwaarden

Voor langdurige bewaring plaatst u flesjes in vloeibare stikstof in dampfase bij ongeveer -150 tot -196 °C. Opslag bij -80 °C is alleen aanvaardbaar als korte tussenstap vóór overbrenging naar vloeibare stikstof.

Verzendvoorwaarden

Gecryopreserveerde cellijnen worden verzonden op droog ijs in gevalideerde, geïsoleerde verpakkingen met voldoende koelmiddel om gedurende het transport ongeveer -78 °C te handhaven. Inspecteer de verpakking onmiddellijk na ontvangst en breng de flacons onverwijld over naar de juiste opslagplaats.

DONATEUR

Leeftijd van de donor	20 jaar
Etnische afkomst	Europese

JURIDISCHE EN VEILIGHEIDSASPECTEN

Veiligheidsmaatregelen

Wanneer men van plan is om een cryovial in vloeibare stikstof op te slaan om later te ontdooien, is het verplicht om strenge veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Passende beschermende handschoenen en kleding zijn essentieel en het gebruik van een gezichtsmasker of veiligheidsbril is vereist tijdens het overbrengen van bevroren monsters naar of uit de tank met vloeibare stikstof. Dit is om het risico op letsel door mogelijke cryoviale explosies bij het verwijderen te beperken, wat kan resulteren in de projectie van scherpe fragmenten.

Garantie

Bij Cytion staan we achter de kwaliteit en levensvatbaarheid van onze producten.
We garanderen dat onze cellen levensvatbaar zijn bij het begin van de kweek gedurende 60 dagen na verzending vanuit onze faciliteiten.
We verzekeren dat alle materialen voldoen aan de specificaties beschreven in het analysecertificaat en/of productblad
Raadpleeg voor volledige informatie onze <a href=""/Wie-zijn-wij/Garantie/"" hreflang=""x-default"">Garantieverklaring

Er is een overeenkomst inzake materiaaloverdracht vereist	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB