Komórki L-540

300201

L-540 to ludzka linia komórkowa chłoniaka Hodgkina pochodząca od pacjenta z tą postacią nowotworu. Ta linia komórkowa jest szeroko wykorzystywana w badaniach skupiających się na mechanizmach molekularnych i komórkowych leżących u podstaw chłoniaka Hodgkina, nowotworu złośliwego wywodzącego się z limfocytów B. Komórki L-540 wykazują charakterystyczne komórki Reeda-Sternberga, które są cechą charakterystyczną chłoniaka Hodgkina i mają kluczowe znaczenie dla diagnozowania tej choroby. Obecność tych wielojądrzastych komórek olbrzymich sprawia, że L-540 jest nieocenionym modelem do badania patofizjologii chłoniaka Hodgkina i do badania potencjalnych środków terapeutycznych ukierunkowanych na te złośliwe komórki.
Jedną z godnych uwagi cech L-540 jest ekspresja CD30, członka rodziny receptorów czynnika martwicy nowotworów, który często ulega nadekspresji w komórkach chłoniaka Hodgkina. Sprawia to, że L-540 jest doskonałym modelem do badania terapii ukierunkowanych na CD30, takich jak koniugaty przeciwciał i leków. Dodatkowo, komórki L-540 zostały wykorzystane do badania wpływu różnych środków chemioterapeutycznych oraz do badania mechanizmów oporności na leki w chłoniaku. Zdolność linii komórkowej do tworzenia guzów u myszy z obniżoną odpornością dodatkowo zwiększa jej użyteczność w badaniach przedklinicznych mających na celu ocenę skuteczności nowych metod leczenia chłoniaka Hodgkina.

INFORMACJE OGÓLNE

Opis

L-540 to ludzka linia komórkowa chłoniaka Hodgkina pochodząca od pacjenta z tą postacią nowotworu. Ta linia komórkowa jest szeroko wykorzystywana w badaniach skupiających się na mechanizmach molekularnych i komórkowych leżących u podstaw chłoniaka Hodgkina, nowotworu złośliwego wywodzącego się z limfocytów B. Komórki L-540 wykazują charakterystyczne komórki Reeda-Sternberga, które są cechą charakterystyczną chłoniaka Hodgkina i mają kluczowe znaczenie dla diagnozowania tej choroby. Obecność tych wielojądrzastych komórek olbrzymich sprawia, że L-540 jest nieocenionym modelem do badania patofizjologii chłoniaka Hodgkina i do badania potencjalnych środków terapeutycznych ukierunkowanych na te złośliwe komórki.
Jedną z godnych uwagi cech L-540 jest ekspresja CD30, członka rodziny receptorów czynnika martwicy nowotworów, który często ulega nadekspresji w komórkach chłoniaka Hodgkina. Sprawia to, że L-540 jest doskonałym modelem do badania terapii ukierunkowanych na CD30, takich jak koniugaty przeciwciał i leków. Dodatkowo, komórki L-540 zostały wykorzystane do badania wpływu różnych środków chemioterapeutycznych oraz do badania mechanizmów oporności na leki w chłoniaku. Zdolność linii komórkowej do tworzenia guzów u myszy z obniżoną odpornością dodatkowo zwiększa jej użyteczność w badaniach przedklinicznych mających na celu ocenę skuteczności nowych metod leczenia chłoniaka Hodgkina.

Chusteczka	Szpik kostny
Choroba	Chłoniak Hodgkina

Synonimy

- L 540
- L540

KLASYFIKACJA

Organizm	Człowiek
Seks	Kobieta
Właściwości związane ze wzrostem	Zawieszenie
Poziom bezpieczeństwa biologicznego	1

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Morfologia	Okrągłe komórki

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

IDENTYFIKATORY

Źródło

L-540 (numer katalogowy Cytion 300201)

Numer identyfikacji podatkowej NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_1362

EKSPRESJA I PODATNOŚĆ

Wirusy

Przekształcone przez EBV

POSTĘPOWANIE I HODOWLA

Pożywka hodowlana

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabilnej glutaminy, w: 2,0 g/L $NaHCO_3$ (numer artykułu Cytion 820700a)

Atmosfera inkubacyjna	37°C, 5%CO_2, nawilżona atmosfera.

Suplementy

Uzupełnić podłoże 10% FBS

Hodowla komórek w subkulturze

Delikatnie homogenizować zawiesinę komórek w kolbie, pipetując w górę i w dół, a następnie pobrać reprezentatywną próbkę w celu określenia gęstości komórek na ml. Rozcieńczyć zawiesinę świeżym podłożem hodowlanym, aby uzyskać stężenie komórek wynoszące 1 x 10^5 komórek/ml, a następnie podzielić dostosowaną zawiesinę na porcje w nowych kolbach w celu dalszej hodowli.

Odnawianie płynów	3 razy w tygodniu

Rozmrażanie i hodowla

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA JAKOŚCI I KRIOKONSERWACJA

Bezpłodność

Zanieczyszczenie mykoplazmą jest wykluczane przy użyciu zarówno testów opartych na PCR, jak i metod wykrywania mykoplazmy opartych na luminescencji.
Aby upewnić się, że nie ma zanieczyszczenia bakteriami, grzybami lub drożdżami, hodowle komórkowe są poddawane codziennym kontrolom wizualnym.

Pożywka do zamrażania	Jako pożywki do kriokonserwacji używamy kompletnej pożywki wzrostowej (w tym FBS) + 10% DMSO w celu zapewnienia odpowiedniej żywotności po rozmrożeniu lub CM-1 (numer katalogowy Cytion 800100), która zawiera zoptymalizowane osmoprotektanty i stabilizatory metaboliczne w celu zwiększenia regeneracji i zmniejszenia stresu wywołanego kriokonserwacją.

Warunki przechowywania

W celu długotrwałego przechowywania należy umieścić fiolki w ciekłym azocie w fazie lotnej w temperaturze od -150 do -196 °C. Przechowywanie w temperaturze -80 °C jest dopuszczalne tylko jako krótki etap przejściowy przed przeniesieniem do ciekłego azotu.

Warunki wysyłki

Linie komórkowe poddane kriokonserwacji są wysyłane w suchym lodzie w zatwierdzonych, izolowanych opakowaniach z wystarczającą ilością czynnika chłodniczego, aby utrzymać temperaturę około -78°C przez cały czas transportu. Po otrzymaniu przesyłki należy natychmiast sprawdzić pojemnik i bezzwłocznie przenieść fiolki do odpowiedniego miejsca przechowywania.

DARCZYŃCA

Wiek dawcy	20 lat
Pochodzenie etniczne	Europejski

KWESTIE PRAWNE I BEZPIECZEŃSTWO

Środki bezpieczeństwa

Planując przechowywanie kriofiolek w ciekłym azocie w celu ich późniejszego rozmrożenia, należy bezwzględnie przestrzegać rygorystycznych środków bezpieczeństwa. Niezbędne są odpowiednie rękawice i odzież ochronna, a podczas przenoszenia zamrożonych próbek do lub ze zbiornika z ciekłym azotem wymagane jest stosowanie maski lub okularów ochronnych. Ma to na celu zmniejszenie ryzyka obrażeń spowodowanych potencjalnymi eksplozjami kriowialu podczas wyjmowania, które mogą skutkować wyrzuceniem ostrych fragmentów.

Gwarancja

W Cytion gwarantujemy jakość i żywotność naszych produktów.
Gwarantujemy, że nasze komórki będą żywotne na początku hodowli przez 60 dni po wysyłce z naszych zakładów.
Zapewniamy, że wszystkie materiały są zgodne ze specyfikacjami opisanymi w certyfikacie analizy i/lub karcie produktu
Szczegółowe informacje można znaleźć w naszej <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Oświadczeniu gwarancyjnym

Wymagana umowa o transferze materiałów	Yes