Celice L-540

300201

L-540 je celična linija človeškega Hodgkinovega limfoma, pridobljena od bolnika s to obliko raka. Ta celična linija se pogosto uporablja v raziskavah, ki se osredotočajo na molekularne in celične mehanizme, na katerih temelji Hodgkinov limfom, maligna bolezen, ki izvira iz limfocitov B. Celice L-540 imajo značilne Reed-Sternbergove celice, ki so značilne za Hodgkinov limfom in so ključne za diagnosticiranje te bolezni. Zaradi prisotnosti teh večjedrnih orjaških celic je L-540 neprecenljiv model za preučevanje patofiziologije Hodgkinovega limfoma in presejanje potencialnih terapevtskih sredstev, usmerjenih proti tem malignim celicam.
Ena od pomembnih značilnosti L-540 je izražanje CD30, člana družine receptorjev za faktor tumorske nekroze, ki je v celicah Hodgkinovega limfoma pogosto prekomerno izražen. Zato je L-540 odličen model za raziskovanje terapij, usmerjenih na CD30, kot so konjugati med protitelesi in zdravili. Poleg tega so bile celice L-540 uporabljene za preučevanje učinkov različnih kemoterapevtikov in raziskovanje mehanizmov odpornosti na zdravila pri limfomih. Sposobnost celične linije, da tvori tumorje pri miših z oslabljeno imunostjo, še povečuje njeno uporabnost v predkliničnih študijah, namenjenih ocenjevanju učinkovitosti novih načinov zdravljenja Hodgkinovega limfoma.

SPLOŠNE INFORMACIJE

Opis

L-540 je celična linija človeškega Hodgkinovega limfoma, pridobljena od bolnika s to obliko raka. Ta celična linija se pogosto uporablja v raziskavah, ki se osredotočajo na molekularne in celične mehanizme, na katerih temelji Hodgkinov limfom, maligna bolezen, ki izvira iz limfocitov B. Celice L-540 imajo značilne Reed-Sternbergove celice, ki so značilne za Hodgkinov limfom in so ključne za diagnosticiranje te bolezni. Zaradi prisotnosti teh večjedrnih orjaških celic je L-540 neprecenljiv model za preučevanje patofiziologije Hodgkinovega limfoma in presejanje potencialnih terapevtskih sredstev, usmerjenih proti tem malignim celicam.
Ena od pomembnih značilnosti L-540 je izražanje CD30, člana družine receptorjev za faktor tumorske nekroze, ki je v celicah Hodgkinovega limfoma pogosto prekomerno izražen. Zato je L-540 odličen model za raziskovanje terapij, usmerjenih na CD30, kot so konjugati med protitelesi in zdravili. Poleg tega so bile celice L-540 uporabljene za preučevanje učinkov različnih kemoterapevtikov in raziskovanje mehanizmov odpornosti na zdravila pri limfomih. Sposobnost celične linije, da tvori tumorje pri miših z oslabljeno imunostjo, še povečuje njeno uporabnost v predkliničnih študijah, namenjenih ocenjevanju učinkovitosti novih načinov zdravljenja Hodgkinovega limfoma.

Tkivo	Kostni mozeg
Bolezen	Hodgkinov limfom

Sinonimi

- L 540
- L540

RAZVRSTITEV

Organizem	Človek
Seks	Ženska
Lastnosti rasti	Vzmetenje
Stopnja biološke varnosti	1

ZNAČILNOSTI

Morfologija	Okrogle celice

IDENTIFIKATORJI

Navajanje vira

L-540 (Cytionova kataloška številka 300201)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Davčna identifikacijska številka NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_1362

IZRAŽANJE IN DOVZETNOST

Virusi

Preoblikovan z EBV

RAVNANJE IN GOJENJE

Gojišče

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabilnega glutamina, w: 2,0 g/L NaHCO3 (številka izdelka Cytion 820700a)

Inkubacijska atmosfera	37 °C, 5 %CO2, vlažno ozračje.

Prehranska dopolnila

Gojišče dopolnite z 10 % FBS

Preusmeritev v drugo kulturo

Nežno homogenizirajte celično suspenzijo v kolbi s pipetiranjem navzgor in navzdol, nato odvzemite reprezentativni vzorec za določitev gostote celic na ml. Suspenzijo razredčite, da dosežete koncentracijo celic 1 x 10^5 celic/ml s svežim kultiviranim medijem, in prilagojeno suspenzijo razdelite v nove kolbe za nadaljnje gojenje.

Obnova tekočine	3-krat na teden

Odtaljevanje in gojenje

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KAKOVOSTI IN KRIOPREZERVACIJA

Sterilnost

Kontaminacija z mikoplazmo se izključi z uporabo testov na podlagi PCR in metod za odkrivanje mikoplazme na podlagi luminiscence.
Da se zagotovi, da ni kontaminacije z bakterijami, glivami ali kvasovkami, se celične kulture dnevno vizualno pregledujejo.

Medij za zamrzovanje	Kot gojišče za kriokonzervacijo uporabljamo popolno rastno gojišče (vključno s FBS) + 10 % DMSO za ustrezno vitalnost po odmrznitvi ali CM-1 (kataloška številka 800100 podjetja Cytion), ki vključuje optimizirane osmoprotektante in presnovne stabilizatorje za izboljšanje okrevanja in zmanjšanje stresa, povzročenega s kriom.

Pogoji shranjevanja

Za dolgotrajno shranjevanje viale postavite v tekoči dušik v parni fazi pri približno -150 do -196 °C. Shranjevanje pri -80 °C je sprejemljivo le kot kratek vmesni korak pred prenosom v tekoči dušik.

Pogoji dostave

Kriokonzervirane celične linije se pošiljajo na suhem ledu v potrjeni, izolirani embalaži z zadostno količino hladilnega sredstva, da se med prevozom vzdržuje približno -78 °C. Ob prejemu takoj preglejte embalažo in viale nemudoma prenesite v ustrezno skladišče.

DONATOR

Starost darovalca	20 let
Etnična pripadnost	Evropski

PRAVNE ZADEVE IN VARNOST

Varnostni ukrepi

Pri načrtovanju shranjevanja kriovialov v tekočem dušiku za kasnejše odtaljevanje je treba obvezno upoštevati stroge varnostne ukrepe. Nujni so ustrezne zaščitne rokavice in oblačila, med prenosom zamrznjenih vzorcev v rezervoar s tekočim dušikom ali iz njega pa je potrebna uporaba obrazne maske ali zaščitnih očal. S tem se zmanjša tveganje poškodb zaradi morebitnih eksplozij kriovialov pri odstranjevanju, ki lahko povzročijo izstrelitev ostrih delcev.

Garancija

V podjetju Cytіon stojimo za kakovostjo in uporabnostjo svojih izdelkov.
Zagotavljamo, da bodo naše celice ob začetku gojenja še 60 dni po odpremi iz naših obratov vitalne.
Zagotavljamo, da so vsi materiali skladni s specifikacijami, opisanimi v potrdilu o analizi in/ali listu izdelka
Za vse podrobnosti si oglejte našo <a href=""/Kdo smo/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garancijsko izjavo

Potreben je sporazum o prenosu materiala	Yes