# L-540 □胞

300201

L-540 □一种人类霍奇金淋巴瘤细胞系，来源于一名霍奇金淋巴瘤患者。这种细胞系被广泛用于研究霍奇金淋巴瘤的分子和细胞机制，霍奇金淋巴瘤 □一种起源于 B 淋巴细胞的恶性肿瘤。L-540 细胞具有里德-斯特恩伯格细胞的特征，这□霍奇金淋巴瘤的标志，也□诊断这种疾病的关键。这些多核巨细胞的存在使 L-540 成为研究霍奇金淋巴瘤病理生理学和筛选针对这些恶性细胞的潜在治疗药物的宝贵模型。

L-540 的一个显著特点□它表达 CD30，CD30 □肿瘤坏死因子受体家族的成员，在霍奇金淋巴瘤细胞中经常过度表达。这使得 L-540 成为研究 CD30 靶向疗法（如抗体-药物共轭物）的绝佳模型。此外，L-540 细胞还被用于研究各种化疗药物的效果，以及探索淋巴瘤的耐药机制。该细胞系能在免疫力低下的小鼠体内形成肿瘤，这进一步增强了它在临床前研究中的作用，旨在评估霍奇金淋巴瘤新疗法的疗效。

## GENERAL INFORMATION

### Description

L-540 □一种人类霍奇金淋巴瘤细胞系，来源于一名霍奇金淋巴瘤患者。这种细胞系被广泛用于研究霍奇金淋巴瘤的分子和细胞机制，霍奇金淋巴瘤 □一种起源于 B 淋巴细胞的恶性肿瘤。L-540 细胞具有里德-斯特恩伯格细胞的特征，这□霍奇金淋巴瘤的标志，也□诊断这种疾病的关键。这些多核巨细胞的存在使 L-540 成为研究霍奇金淋巴瘤病理生理学和筛选针对这些恶性细胞的潜在治疗药物的宝贵模型。

L-540 的一个显著特点□它表达 CD30，CD30 □肿瘤坏死因子受体家族的成员，在霍奇金淋巴瘤细胞中经常过度表达。这使得 L-540 成为研究 CD30 靶向疗法（如抗体-药物共轭物）的绝佳模型。此外，L-540 细胞还被用于研究各种化疗药物的效果，以及探索淋巴瘤的耐药机制。该细胞系能在免疫力低下的小鼠体内形成肿瘤，这进一步增强了它在临床前研究中的作用，旨在评估霍奇金淋巴瘤新疗法的疗效。

| | |
|---|---|
| **Tissue** | 骨髓 |
| **Disease** | 霍奇金淋巴瘤 |

### Synonyms

- L 540
- L540

## CLASSIFICATION

| | |
|---|---|
| **Organism** | Human |
| **Sex** | Female |
| **Growth properties** | Suspension |
| **Biosafety level** | 1 |

## CHARACTERISTICS

| | |
|---|---|
| **Morphology** | 圆形电池 |

## IDENTIFIERS

### Citation

L-540（Cytion 目录号 300201）

| | |
|---|---|
| **NCBI TaxID** | 9606 |
| **Cellosaurus** | CVCL_1362 |

## EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

### Viruses

被 EBV 转化

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

## HANDLING AND CULTURE

### Culture medium

RPMI 1640，w：2.0 mM 稳定谷氨酰胺，w：2.0 g/L NaHCO3（Cytion 文章编号 820700a）。

| | |
|---|---|
| **Incubation atmosphere** | 37°C, 5%CO2, 加湿环境。 |

### Supplements

在培养基中添加 10% FBS

### Subculturing

通过上下吸取操作轻柔匀化烧瓶中的细胞悬液，随后取代表性样本测定每毫升细胞密度。用新鲜培养基将悬液稀释至 $1\times10^5$细胞/毫升浓度，并将调整后的悬液分装至新烧瓶中进行后续培养。

| | |
|---|---|
| **Fluid renewal** | 每周 3 次 |

### Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

## QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

### Sterility

使用基于 PCR 的检测方法和基于发光的支原体检测方法排除支原体污染。
为确保没有细菌、真菌或酵母菌污染，每天都要对细胞培养物进行目视检查。

| | |
|---|---|
| **Freeze medium** | 我们使用完全生长培养基（包括 FBS）+10% DMSO 或 CM-1（Cytion 商品目录编号 800100）作为冷冻保存培养基，以获得足够的解冻后存活率，CM-1（Cytion 商品目录编号 800100）含有优化的渗透保护剂和代谢稳定剂，可提高恢复能力并减少冷冻引起的应激。 |

### Storage conditions

如需长期保存，可将样品瓶放入气相液氮中，温度约为 -150 至 -196 ℃。在-80 ℃下保存只能作为转入液氮前的短暂过渡。

### Shipping conditions

冷冻保存的细胞系用干冰装运，并用经过验证的隔热包装和足够的制冷剂在整个运输过程中保持约 -78 °C 的温度。收到货后，应立即检查容器，并立即将小瓶转移到适当的储藏室。

## DONOR

| | |
|---|---|
| **Donor age** | 20年 |
| **Ethnicity** | 欧洲 |

## LEGAL AND SAFETY

### Safety precautions

计划将低温样品储存在液氮中以便将来解冻时，必须遵守严格的安全措施。在将冷冻样本移入或移出液氮罐时，必须穿戴适当的防护手套和防护服，并使用面罩或安全护目镜。这样做 □为了降低在移出时因冷冻样品爆炸而造成伤害的风险，因为爆炸可能导致锋利的碎片飞溅。

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

## Warranty

在Cytion，我们保证产品的质量和活力。
我们保证，从我们的工厂发货后 60 天内，我们的细胞在开始培养时都 □存活的。
我们保证所有材料均符合分析证书和 /或产品说明书中描述的规格。
有关详细信息，请参阅我们的 <a href="" /Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">保修声明。

| | |
|---|---|
| **Material Transfer Agreement required** | Yes |