Buňky L-591

300202

Buněčná linie L-591 je jednou z několika neoplastických buněčných linií odvozených od pacientů s Hodgkinovou chorobou, konkrétně s nodulárním sklerotizujícím podtypem. Byla založena jako součást skupiny buněčných linií Hodgkinova lymfomu, včetně linií L-428 a L-540, a přispěla k pokroku v poznání této hematologické malignity. Buňky L-591 se vyznačují aneuploidií a vykazují různé strukturální a numerické chromozomální abnormality, které svědčí o jejich neoplastickém původu. Tato linie je zvláště cenná pro výzkum díky svým odlišným chromozomálním vzorům a schopnosti proliferace in vitro, což z ní činí spolehlivý model pro studium buněčných mechanismů Hodgkinova lymfomu.
Jedním z charakteristických rysů buněk L-591 je jejich imunofenotyp. Buňky exprimují antigeny podobné Ia a receptory spojené s T-lymfocyty, ale postrádají markery typické pro jiné hematopoetické linie, jako jsou myeloidní buňky, monocyty a makrofágy. Buňky L-591 neprodukují povrchové ani cytoplazmatické imunoglobuliny a nevykazují ani antigeny specifické pro virus Epsteina-Barrové (EBV), jako je EBNA. Tato nepřítomnost imunoglobulinů a antigenů EBV odlišuje L-591 od ostatních buněčných linií Hodgkinova lymfomu pozitivních na EBV a zdůrazňuje její užitečnost při zkoumání specifik patologie Hodgkinova lymfomu, které jsou nezávislé na infekci EBV.
Buněčná linie L-591 je morfologicky podobná Reed-Sternbergovým (RS) a Hodgkinovým (H) buňkám, které jsou charakteristické pro Hodgkinův lymfom. Tyto buňky hrají klíčovou roli ve výzkumu Hodgkinovy choroby, slouží jako model pro pochopení patogeneze choroby a pro identifikaci potenciálních terapeutických cílů. Jedinečné vlastnosti L-591 v kombinaci s jeho zavedeným použitím v laboratorních podmínkách z něj činí základní nástroj při studiu Hodgkinova lymfomu, který významně přispívá k rozšíření poznatků o této složité malignitě.

OBECNÉ INFORMACE

Popis

Buněčná linie L-591 je jednou z několika neoplastických buněčných linií odvozených od pacientů s Hodgkinovou chorobou, konkrétně s nodulárním sklerotizujícím podtypem. Byla založena jako součást skupiny buněčných linií Hodgkinova lymfomu, včetně linií L-428 a L-540, a přispěla k pokroku v poznání této hematologické malignity. Buňky L-591 se vyznačují aneuploidií a vykazují různé strukturální a numerické chromozomální abnormality, které svědčí o jejich neoplastickém původu. Tato linie je zvláště cenná pro výzkum díky svým odlišným chromozomálním vzorům a schopnosti proliferace in vitro, což z ní činí spolehlivý model pro studium buněčných mechanismů Hodgkinova lymfomu.
Jedním z charakteristických rysů buněk L-591 je jejich imunofenotyp. Buňky exprimují antigeny podobné Ia a receptory spojené s T-lymfocyty, ale postrádají markery typické pro jiné hematopoetické linie, jako jsou myeloidní buňky, monocyty a makrofágy. Buňky L-591 neprodukují povrchové ani cytoplazmatické imunoglobuliny a nevykazují ani antigeny specifické pro virus Epsteina-Barrové (EBV), jako je EBNA. Tato nepřítomnost imunoglobulinů a antigenů EBV odlišuje L-591 od ostatních buněčných linií Hodgkinova lymfomu pozitivních na EBV a zdůrazňuje její užitečnost při zkoumání specifik patologie Hodgkinova lymfomu, které jsou nezávislé na infekci EBV.
Buněčná linie L-591 je morfologicky podobná Reed-Sternbergovým (RS) a Hodgkinovým (H) buňkám, které jsou charakteristické pro Hodgkinův lymfom. Tyto buňky hrají klíčovou roli ve výzkumu Hodgkinovy choroby, slouží jako model pro pochopení patogeneze choroby a pro identifikaci potenciálních terapeutických cílů. Jedinečné vlastnosti L-591 v kombinaci s jeho zavedeným použitím v laboratorních podmínkách z něj činí základní nástroj při studiu Hodgkinova lymfomu, který významně přispívá k rozšíření poznatků o této složité malignitě.

Tkáň	Pleurální výpotek
Nemoc	Hodgkinův lymfom

Synonyma

- L 591
- L591

KLASIFIKACE

Organismus	Člověk
Sex	Žena
Růstové vlastnosti	Odpružení
Úroveň biologické bezpečnosti	2

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

CHARAKTERISTIKA

Morfologie	Kulaté buňky
Typ buňky	Lymfoblasty

IDENTIFIKÁTORY

Citace

L-591 (katalogové číslo Cytion 300202)

Daňové identifikační číslo NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_1867

MANIPULACE A CHOV

Pěstovací médium

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabilní glutamin, w: 2,0 g/l $NaHCO_3$ (číslo výrobku Cytion 820700a)

Inkubační atmosféra	37 °C, 5 %CO_2, zvlhčená atmosféra.

Doplňky stravy

Doplňte médium o 10% FBS, 1 mM pyruvát sodný, 1% NEAA

Subkultivace

Kultury udržujte pravidelným přidáváním nebo výměnou média. Zahajte kultury s hustotou 5 x 10^5 buněk/ml a pro optimální růst udržujte koncentraci buněk v rozmezí 3 x 10^5 až 1 x 10^6 buněk/ml.

Hustota výsevu	3x10^5/ml

Rozmrazování a kultivace

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KVALITY A KRYOKONZERVACE

Sterilita

Kontaminace mykoplazmaty je vyloučena jak pomocí testů založených na PCR, tak pomocí luminiscenčních metod detekce mykoplazmy. Aby se zajistilo, že nedojde ke kontaminaci bakteriemi, plísněmi nebo kvasinkami, jsou buněčné kultury denně podrobovány vizuálním kontrolám.

Mrazicí médium	Jako kryokonzervační médium používáme kompletní růstové médium (včetně FBS) + 10 % DMSO pro zajištění dostatečné životaschopnosti po rozmrazení nebo CM-1 (katalogové číslo 800100 společnosti Cytion), které obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory pro zlepšení regenerace a snížení stresu způsobeného kryo.

Podmínky skladování

Pro dlouhodobé uchování umístěte lahvičky do kapalného dusíku v plynné fázi při teplotě přibližně -150 až -196 °C. Skladování při -80 °C je přijatelné pouze jako krátký přechodný krok před přemístěním do kapalného dusíku.

Dopravní podmínky

Kryokonzervované buněčné linie se přepravují na suchém ledu v ověřených, izolovaných obalech s dostatečným množstvím chladiva, aby se po celou dobu přepravy udržovala teplota přibližně -78 °C. Po obdržení ihned zkontrolujte obal a neprodleně přeneste lahvičky do vhodného skladu.

DÁRCE

Věk dárce	31 let

PRÁVNÍ INFORMACE A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Bezpečnostní opatření

Při plánování uložení kryovialu v kapalném dusíku pro budoucí rozmrazení je nutné dodržovat přísná bezpečnostní opatření. Nezbytné jsou vhodné ochranné rukavice a oděv a při přenášení zmrazených vzorků do nádrže s kapalným dusíkem nebo z ní je nutné používat obličejovou masku nebo ochranné brýle. To proto, aby se snížilo riziko zranění v důsledku možných výbuchů kryovialů při jejich vyjímání, které mohou mít za následek vystřelování ostrých úlomků.

Záruka

Ve společnosti Cytion si stojíme za kvalitou a životaschopností našich produktů.
Zaručujeme, že naše buňky budou životaschopné na začátku kultivace po dobu 60 dnů po odeslání z našich zařízení.
Zaručujeme, že všechny materiály odpovídají specifikacím popsaným v certifikátu analýzy a/nebo v produktovém listu
Úplné informace naleznete v našem <a href=""/Kdo-jsme/Záruka/"" hreflang=""x-default"">Záručním prohlášení

Je nutná smlouva o převodu materiálu	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB