Sel L-591

300202

Garis sel L-591 adalah salah satu dari beberapa garis sel neoplastik yang berasal dari pasien dengan penyakit Hodgkin, khususnya subtipe sklerosis nodular. Sel ini dibentuk sebagai bagian dari kelompok garis sel limfoma Hodgkin, termasuk L-428 dan L-540, dan telah berperan penting dalam memajukan pemahaman tentang keganasan hematologi ini. Sel L-591 dicirikan oleh aneuploidi dan menunjukkan berbagai kelainan kromosom struktural dan numerik, yang menunjukkan asal muasal neoplastiknya. Garis ini sangat berharga dalam penelitian karena pola kromosomnya yang berbeda dan kemampuannya untuk berkembang biak secara in vitro, sehingga menjadikannya model yang dapat diandalkan untuk mempelajari mekanisme seluler limfoma Hodgkin.
Salah satu ciri khas sel L-591 adalah imunofenotipnya. Sel-sel ini mengekspresikan antigen dan reseptor mirip Ia yang terkait dengan sel T, tetapi tidak memiliki penanda yang khas dari garis keturunan hematopoietik lainnya, seperti sel mieloid, monosit, dan makrofag. Khususnya, sel L-591 tidak menghasilkan imunoglobulin permukaan atau sitoplasma, dan juga tidak menunjukkan antigen spesifik Epstein-Barr Virus (EBV), seperti EBNA. Ketiadaan imunoglobulin dan antigen EBV ini membedakan L-591 dari garis sel limfoma Hodgkin positif EBV lainnya dan menyoroti kegunaannya dalam mengeksplorasi kekhususan patologi limfoma Hodgkin yang tidak tergantung pada infeksi EBV.
Garis sel L-591 secara morfologis mirip dengan sel Reed-Sternberg (RS) dan Hodgkin (H) yang merupakan karakteristik limfoma Hodgkin. Sel-sel ini memainkan peran penting dalam penelitian penyakit Hodgkin, yang berfungsi sebagai model untuk memahami patogenesis penyakit dan untuk mengidentifikasi target terapi yang potensial. Fitur unik L-591, dikombinasikan dengan penggunaannya yang sudah mapan dalam pengaturan laboratorium, menjadikannya alat penting dalam studi limfoma Hodgkin, yang berkontribusi secara signifikan terhadap pengetahuan seputar keganasan yang kompleks ini.

INFORMASI UMUM

Deskripsi

Garis sel L-591 adalah salah satu dari beberapa garis sel neoplastik yang berasal dari pasien dengan penyakit Hodgkin, khususnya subtipe sklerosis nodular. Sel ini dibentuk sebagai bagian dari kelompok garis sel limfoma Hodgkin, termasuk L-428 dan L-540, dan telah berperan penting dalam memajukan pemahaman tentang keganasan hematologi ini. Sel L-591 dicirikan oleh aneuploidi dan menunjukkan berbagai kelainan kromosom struktural dan numerik, yang menunjukkan asal muasal neoplastiknya. Garis ini sangat berharga dalam penelitian karena pola kromosomnya yang berbeda dan kemampuannya untuk berkembang biak secara in vitro, sehingga menjadikannya model yang dapat diandalkan untuk mempelajari mekanisme seluler limfoma Hodgkin.
Salah satu ciri khas sel L-591 adalah imunofenotipnya. Sel-sel ini mengekspresikan antigen dan reseptor mirip Ia yang terkait dengan sel T, tetapi tidak memiliki penanda yang khas dari garis keturunan hematopoietik lainnya, seperti sel mieloid, monosit, dan makrofag. Khususnya, sel L-591 tidak menghasilkan imunoglobulin permukaan atau sitoplasma, dan juga tidak menunjukkan antigen spesifik Epstein-Barr Virus (EBV), seperti EBNA. Ketiadaan imunoglobulin dan antigen EBV ini membedakan L-591 dari garis sel limfoma Hodgkin positif EBV lainnya dan menyoroti kegunaannya dalam mengeksplorasi kekhususan patologi limfoma Hodgkin yang tidak tergantung pada infeksi EBV.
Garis sel L-591 secara morfologis mirip dengan sel Reed-Sternberg (RS) dan Hodgkin (H) yang merupakan karakteristik limfoma Hodgkin. Sel-sel ini memainkan peran penting dalam penelitian penyakit Hodgkin, yang berfungsi sebagai model untuk memahami patogenesis penyakit dan untuk mengidentifikasi target terapi yang potensial. Fitur unik L-591, dikombinasikan dengan penggunaannya yang sudah mapan dalam pengaturan laboratorium, menjadikannya alat penting dalam studi limfoma Hodgkin, yang berkontribusi secara signifikan terhadap pengetahuan seputar keganasan yang kompleks ini.

Tisu	Efusi pleura
Penyakit	Limfoma Hodgkin

Sinonim

- L 591
- L591

KLASIFIKASI

Organisme	Manusia
Seks	Perempuan
Sifat-sifat pertumbuhan	Penangguhan

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Tingkat keamanan hayati	2

KARAKTERISTIK

Morfologi	Sel bulat
Jenis sel	Limfoblas

PENGIDENTIFIKASI

Referensi

L-591 (Nomor katalog Cytion 300202)

Nomor Identifikasi Pajak NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_1867

PENANGANAN DAN BUDIDAYA

Media kultur

RPMI 1640, w: 2,0 mM Glutamin stabil, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Nomor artikel Cytion 820700a)

Suasana inkubasi	37°C, 5%CO2, atmosfer yang dilembabkan.

Suplemen

Tambahkan media dengan 10% FBS, 1 mM natrium piruvat, 1% NEAA

Perbanyakan sel

Pertahankan kultur dengan secara berkala menambahkan atau mengganti medium. Mulailah kultur dengan kepadatan 5 x 10^5 sel/ml dan jaga konsentrasi sel dalam rentang 3 x 10^5 hingga 1 x 10^6 sel/ml untuk pertumbuhan optimal.

Kepadatan penanaman	3 x 10^5/ml

Pencairan dan pembiakan

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

PENGENDALIAN MUTU DAN KRIOPRESERVASI

Kemandulan

Kontaminasi mikoplasma disingkirkan dengan menggunakan tes berbasis PCR dan metode deteksi mikoplasma berbasis pendaran.
Untuk memastikan tidak ada kontaminasi bakteri, jamur, atau ragi, kultur sel menjalani inspeksi visual setiap hari.

Media pembekuan	Sebagai media kriopreservasi, kami menggunakan media pertumbuhan lengkap (termasuk FBS) + 10% DMSO untuk viabilitas pasca-pencairan yang memadai, atau CM-1 (nomor katalog Cytion 800100), yang mencakup osmoprotektan yang dioptimalkan dan penstabil metabolisme untuk meningkatkan pemulihan dan mengurangi stres yang diinduksi kriopreservasi.

Kondisi penyimpanan

Untuk pengawetan jangka panjang, tempatkan botol dalam nitrogen cair fase uap pada suhu sekitar -150 hingga -196 °C. Penyimpanan pada suhu -80 °C hanya dapat diterima sebagai langkah sementara sebelum dipindahkan ke nitrogen cair.

Ketentuan pengiriman

Lini sel kriopreservasi dikirim di atas es kering dalam kemasan terisolasi yang divalidasi dengan refrigeran yang cukup untuk mempertahankan suhu sekitar -78 ° C selama perjalanan. Setelah diterima, segera periksa wadah dan pindahkan botol tanpa penundaan ke tempat penyimpanan yang sesuai.

DONATUR

Usia donor	31 tahun

HUKUM DAN KESELAMATAN

Tindakan pencegahan keselamatan

Ketika berencana menyimpan kriovial dalam nitrogen cair untuk pencairan di masa mendatang, Anda wajib mematuhi langkah-langkah keamanan yang ketat. Sarung tangan dan pakaian pelindung yang tepat sangat penting, dan penggunaan masker wajah atau kacamata pengaman diperlukan selama pemindahan sampel beku ke atau dari tangki nitrogen cair. Hal ini untuk mengurangi risiko cedera akibat potensi ledakan cryovial pada saat pemindahan, yang dapat mengakibatkan proyeksi fragmen tajam.

Garansi

Di Cytion, kami mendukung kualitas dan kelangsungan hidup produk kami.
Kami menjamin bahwa sel kami akan dapat bertahan hidup pada awal kultur selama 60 hari setelah pengiriman dari fasilitas kami.
Kami menjamin bahwa semua bahan sesuai dengan spesifikasi yang dijelaskan dalam Sertifikat Analisis dan / atau Lembar Produk
Untuk detail lengkap, silakan merujuk ke <a href=""/Siapa-kami-Garansi/Garansi/"" hreflang=""x-default"">Pernyataan Jaminan kami

Diperlukan Perjanjian Transfer Material	Yes