L-591 Cellen

300202

De L-591 cellijn is een van verschillende neoplastische cellijnen afkomstig van patiënten met de ziekte van Hodgkin, specifiek van het nodulaire scleroserende subtype. Ze werd ontwikkeld als onderdeel van een groep Hodgkin-lymfoomcellijnen, waaronder L-428 en L-540, en heeft bijgedragen aan een beter begrip van deze hematologische maligniteit. L-591 cellen worden gekenmerkt door aneuploïdie en vertonen verschillende structurele en numerieke chromosomale afwijkingen, die indicatief zijn voor hun neoplastische oorsprong. De lijn is bijzonder waardevol voor onderzoek vanwege de duidelijke chromosomale patronen en het vermogen om te prolifereren in vitro, waardoor het een betrouwbaar model is voor het bestuderen van de cellulaire mechanismen van Hodgkinlymfoom.
Een van de bepalende kenmerken van L-591 cellen is hun immunofenotype. De cellen drukken Ia-achtige antigenen en receptoren uit die geassocieerd worden met T-cellen, maar missen markers die typisch zijn voor andere hematopoëtische lijnen, zoals myeloïde cellen, monocyten en macrofagen. L-591 cellen produceren met name geen oppervlakte- of cytoplasmatische immunoglobulinen en vertonen ook geen Epstein-Barr Virus (EBV)-specifieke antigenen, zoals EBNA. Deze afwezigheid van immunoglobulinen en EBV-antigenen onderscheidt L-591 van andere EBV-positieve Hodgkin-lymfoomcellijnen en benadrukt het nut ervan voor het onderzoeken van de specifieke kenmerken van de pathologie van Hodgkin-lymfoom die onafhankelijk zijn van EBV-infectie.
De L-591 cellijn is morfologisch vergelijkbaar met de Reed-Sternberg (RS) en Hodgkin (H) cellen die kenmerkend zijn voor Hodgkinlymfoom. Deze cellen spelen een cruciale rol in het onderzoek naar de ziekte van Hodgkin en dienen als model om de pathogenese van de ziekte te begrijpen en om potentiële therapeutische doelwitten te identificeren. De unieke eigenschappen van L-591, gecombineerd met het gevestigde gebruik in laboratoriumsettings, maken het een essentieel instrument in de studie van Hodgkin-lymfoom, dat aanzienlijk bijdraagt aan de kennis over deze complexe maligniteit.

ALGEMENE INFORMATIE

Beschrijving

De L-591 cellijn is een van verschillende neoplastische cellijnen afkomstig van patiënten met de ziekte van Hodgkin, specifiek van het nodulaire scleroserende subtype. Ze werd ontwikkeld als onderdeel van een groep Hodgkin-lymfoomcellijnen, waaronder L-428 en L-540, en heeft bijgedragen aan een beter begrip van deze hematologische maligniteit. L-591 cellen worden gekenmerkt door aneuploïdie en vertonen verschillende structurele en numerieke chromosomale afwijkingen, die indicatief zijn voor hun neoplastische oorsprong. De lijn is bijzonder waardevol voor onderzoek vanwege de duidelijke chromosomale patronen en het vermogen om te prolifereren in vitro, waardoor het een betrouwbaar model is voor het bestuderen van de cellulaire mechanismen van Hodgkinlymfoom.
Een van de bepalende kenmerken van L-591 cellen is hun immunofenotype. De cellen drukken Ia-achtige antigenen en receptoren uit die geassocieerd worden met T-cellen, maar missen markers die typisch zijn voor andere hematopoëtische lijnen, zoals myeloïde cellen, monocyten en macrofagen. L-591 cellen produceren met name geen oppervlakte- of cytoplasmatische immunoglobulinen en vertonen ook geen Epstein-Barr Virus (EBV)-specifieke antigenen, zoals EBNA. Deze afwezigheid van immunoglobulinen en EBV-antigenen onderscheidt L-591 van andere EBV-positieve Hodgkin-lymfoomcellijnen en benadrukt het nut ervan voor het onderzoeken van de specifieke kenmerken van de pathologie van Hodgkin-lymfoom die onafhankelijk zijn van EBV-infectie.
De L-591 cellijn is morfologisch vergelijkbaar met de Reed-Sternberg (RS) en Hodgkin (H) cellen die kenmerkend zijn voor Hodgkinlymfoom. Deze cellen spelen een cruciale rol in het onderzoek naar de ziekte van Hodgkin en dienen als model om de pathogenese van de ziekte te begrijpen en om potentiële therapeutische doelwitten te identificeren. De unieke eigenschappen van L-591, gecombineerd met het gevestigde gebruik in laboratoriumsettings, maken het een essentieel instrument in de studie van Hodgkin-lymfoom, dat aanzienlijk bijdraagt aan de kennis over deze complexe maligniteit.

Weefsel	Pleurale effusie
Ziekte	Hodgkinlymfoom

Synoniemen

- L 591
- L591

CLASSIFICATIE

Organisme	Mens
Seks	Vrouw

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Groei-eigenschappen	Ophanging
Bioveiligheidsniveau	2

KENMERKEN

Morfologie	Ronde cellen
Celtype	Lymfoblast

IDENTIFICATIEGEGEVENS

Bronvermelding

L-591 (Cytion catalogusnummer 300202)

NCBI-belastingnummer	9606
Cellosaurus	CVCL_1867

BEHANDELING EN KWEEK

Kweekmedium

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabiele Glutamine, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion artikelnummer 820700a)

Incubatieomgeving	37°C, 5%CO2, bevochtigde atmosfeer.

Supplementen

Vul het medium aan met 10% FBS, 1 mM natriumpyruvaat, 1% NEAA

Heruitplanten

Onderhoud de culturen door het medium periodiek toe te voegen of te vervangen. Start de culturen met een dichtheid van 5 x 10^5 cellen/ml en houd de celconcentratie binnen het bereik van 3 x 10^5 tot 1 x 10^6 cellen/ml voor een optimale groei.

Zaaidichtheid	3 x 10^5/ml

Ontdooien en kweken

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KWALITEITSCONTROLE EN CRYOPRESERVATIE

Onvruchtbaarheid

Mycoplasmaverontreiniging wordt uitgesloten met zowel PCR-gebaseerde testen als op luminescentie gebaseerde mycoplasmadetectiemethoden.
Om er zeker van te zijn dat er geen besmetting is met bacteriën, schimmels of gisten, worden de celculturen dagelijks onderworpen aan visuele inspecties.

Kweekmedium invriezen	Als cryoconserveringsmedium gebruiken we volledig groeimedium (inclusief FBS) + 10% DMSO voor voldoende levensvatbaarheid na het ontdooien, of CM-1 (Cytion catalogusnummer 800100), dat geoptimaliseerde osmoprotectanten en metabolische stabilisatoren bevat om het herstel te verbeteren en door cryo geïnduceerde stress te verminderen.

Opslagvoorwaarden

Voor langdurige bewaring plaatst u flesjes in vloeibare stikstof in dampfase bij ongeveer -150 tot -196 °C. Opslag bij -80 °C is alleen aanvaardbaar als korte tussenstap vóór overbrenging naar vloeibare stikstof.

Verzendvoorwaarden

Gecryopreserveerde cellijnen worden verzonden op droog ijs in gevalideerde, geïsoleerde verpakkingen met voldoende koelmiddel om gedurende het transport ongeveer -78 °C te handhaven. Inspecteer de verpakking onmiddellijk na ontvangst en breng de flacons onverwijld over naar de juiste opslagplaats.

DONATEUR

Leeftijd van de donor	31 jaar

JURIDISCHE EN VEILIGHEIDSASPECTEN

Veiligheidsmaatregelen

Wanneer men van plan is om een cryovial in vloeibare stikstof op te slaan om later te ontdooien, is het verplicht om strenge veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Passende beschermende handschoenen en kleding zijn essentieel en het gebruik van een gezichtsmasker of veiligheidsbril is vereist tijdens het overbrengen van bevroren monsters naar of uit de tank met vloeibare stikstof. Dit is om het risico op letsel door mogelijke cryoviale explosies bij het verwijderen te beperken, wat kan resulteren in de projectie van scherpe fragmenten.

Garantie

Bij Cytion staan we achter de kwaliteit en levensvatbaarheid van onze producten.
We garanderen dat onze cellen levensvatbaar zijn bij het begin van de kweek gedurende 60 dagen na verzending vanuit onze faciliteiten.
We verzekeren dat alle materialen voldoen aan de specificaties beschreven in het analysecertificaat en/of productblad
Raadpleeg voor volledige informatie onze <a href=""/Wie-zijn-wij/Garantie/"" hreflang=""x-default"">Garantieverklaring

Er is een overeenkomst inzake materiaaloverdracht vereist	Yes