L-591-celler

300202

Cellinjen L-591 är en av flera neoplastiska cellinjer som härrör från patienter med Hodgkins sjukdom, särskilt av den nodulära skleroserande subtypen. Den etablerades som en del av en grupp cellinjer för Hodgkins lymfom, inklusive L-428 och L-540, och har varit avgörande för att öka förståelsen för denna hematologiska malignitet. L-591-cellerna kännetecknas av aneuploidi och uppvisar olika strukturella och numeriska kromosomavvikelser, vilket tyder på att de har ett neoplastiskt ursprung. Linjen är särskilt värdefull inom forskningen på grund av sina distinkta kromosommönster och sin förmåga att proliferera in vitro, vilket gör den till en tillförlitlig modell för att studera de cellulära mekanismerna i Hodgkins lymfom.
En av de utmärkande egenskaperna hos L-591-cellerna är deras immunofenotyp. Cellerna uttrycker Ia-liknande antigener och receptorer som associeras med T-celler men saknar markörer som är typiska för andra hematopoetiska linjer, såsom myeloida celler, monocyter och makrofager. Framför allt producerar L-591-celler inte yt- eller cytoplasmatiska immunglobuliner och de uppvisar inte heller Epstein-Barr-virus (EBV)-specifika antigener, såsom EBNA. Denna frånvaro av immunglobuliner och EBV-antigener skiljer L-591 från andra EBV-positiva Hodgkins lymfom-cellinjer och belyser dess användbarhet för att utforska de specifika egenskaperna hos Hodgkins lymfom-patologi som är oberoende av EBV-infektion.
Cellinjen L-591 är morfologiskt lik de Reed-Sternberg (RS)- och Hodgkin (H)-celler som är karakteristiska för Hodgkins lymfom. Dessa celler spelar en avgörande roll i forskningen kring Hodgkins sjukdom och fungerar som en modell för att förstå sjukdomens patogenes och för att identifiera potentiella terapeutiska mål. De unika egenskaperna hos L-591, i kombination med dess etablerade användning i laboratoriemiljö, gör den till ett viktigt verktyg i studien av Hodgkins lymfom och bidrar väsentligt till kunskapen om denna komplexa malignitet.

ALLMÄN INFORMATION

Beskrivning

Cellinjen L-591 är en av flera neoplastiska cellinjer som härrör från patienter med Hodgkins sjukdom, särskilt av den nodulära skleroserande subtypen. Den etablerades som en del av en grupp cellinjer för Hodgkins lymfom, inklusive L-428 och L-540, och har varit avgörande för att öka förståelsen för denna hematologiska malignitet. L-591-cellerna kännetecknas av aneuploidi och uppvisar olika strukturella och numeriska kromosomavvikelser, vilket tyder på att de har ett neoplastiskt ursprung. Linjen är särskilt värdefull inom forskningen på grund av sina distinkta kromosommönster och sin förmåga att proliferera in vitro, vilket gör den till en tillförlitlig modell för att studera de cellulära mekanismerna i Hodgkins lymfom.
En av de utmärkande egenskaperna hos L-591-cellerna är deras immunofenotyp. Cellerna uttrycker Ia-liknande antigener och receptorer som associeras med T-celler men saknar markörer som är typiska för andra hematopoetiska linjer, såsom myeloida celler, monocyter och makrofager. Framför allt producerar L-591-celler inte yt- eller cytoplasmatiska immunglobuliner och de uppvisar inte heller Epstein-Barr-virus (EBV)-specifika antigener, såsom EBNA. Denna frånvaro av immunglobuliner och EBV-antigener skiljer L-591 från andra EBV-positiva Hodgkins lymfom-cellinjer och belyser dess användbarhet för att utforska de specifika egenskaperna hos Hodgkins lymfom-patologi som är oberoende av EBV-infektion.
Cellinjen L-591 är morfologiskt lik de Reed-Sternberg (RS)- och Hodgkin (H)-celler som är karakteristiska för Hodgkins lymfom. Dessa celler spelar en avgörande roll i forskningen kring Hodgkins sjukdom och fungerar som en modell för att förstå sjukdomens patogenes och för att identifiera potentiella terapeutiska mål. De unika egenskaperna hos L-591, i kombination med dess etablerade användning i laboratoriemiljö, gör den till ett viktigt verktyg i studien av Hodgkins lymfom och bidrar väsentligt till kunskapen om denna komplexa malignitet.

Vävnad	Pleurautgjutning
Sjukdom	Hodgkins lymfom

Synonymer

- L 591
- L591

KLASSIFICERING

Organism	Människa
Kön	Kvinna
Tillväxtegenskaper	Upphängning

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Biosäkerhetsnivå	2

EGENSKAPER

Morfologi	Runda celler
Celltyp	Lymfoblast

IDENTIFIERARE

Källa

L-591 (Cytion katalognummer 300202)

NCBI-skattenummer	9606
Cellosaurus	CVCL_1867

HANTERING OCH ODLING

Odlingsmedium

RPMI 1640, med: 2,0 mM stabilt glutamin, med: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion artikelnummer 820700a)

Inkubationsatmosfär	37°C, 5%CO2, befuktad atmosfär.

Kosttillskott

Komplettera mediet med 10% FBS, 1 mM natriumpyruvat, 1% NEAA

Vidareodling

Underhåll odlingarna genom att regelbundet tillsätta eller byta ut odlingsmediet. Starta odlingarna med en densitet på 5 x 10^5 celler/ml och håll cellkoncentrationen inom intervallet 3 x 10^5 till 1 x 10^6 celler/ml för optimal tillväxt.

Såtäthet	3x10^5/ml

Upptining och odling

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROLL OCH KRYOKONSERVERING

Sterilitet

Mykoplasmakontaminering utesluts med hjälp av både PCR-baserade analyser och luminiscensbaserade metoder för mykoplasmadiagnostik. För att säkerställa att det inte finns någon kontaminering av bakterier, svamp eller jäst utsätts cellkulturerna för dagliga visuella inspektioner.

Frysmedel	Som kryokonserveringsmedium använder vi komplett tillväxtmedium (inklusive FBS) + 10% DMSO för adekvat viabilitet efter upptining, eller CM-1 (Cytion katalognummer 800100), som innehåller optimerade osmoprotektanter och metaboliska stabilisatorer för att förbättra återhämtningen och minska kryoinducerad stress.

Förvaringsförhållanden

För långtidsförvaring, placera flaskorna i flytande kväve i ångfas vid ca -150 till -196 °C. Förvaring vid -80 °C är acceptabelt endast som ett kort mellanliggande steg innan överföring till flytande kväve.

Leveransvillkor

Kryopreserverade cellinjer skickas på torris i validerade, isolerade förpackningar med tillräckligt med kylmedel för att hålla cirka -78 °C under hela transporten. Vid mottagandet ska behållaren omedelbart inspekteras och flaskorna utan dröjsmål överföras till lämplig förvaring.

DONATOR

Donatorns ålder	31 år

JURIDISKA FRÅGOR OCH SÄKERHET

Säkerhetsföreskrifter

När man planerar att förvara en kryovial i flytande kväve för framtida upptining är det obligatoriskt att följa strikta säkerhetsåtgärder. Lämpliga skyddshandskar och skyddskläder är nödvändiga, och ansiktsmask eller skyddsglasögon måste användas vid överföring av frysta prover till eller från tanken med flytande kväve. Detta för att minska risken för skador på grund av eventuella explosioner i frysbehållaren vid borttagning, vilket kan leda till att vassa fragment projiceras.

Garanti

På Cytion står vi bakom våra produkters kvalitet och livskraft.
Vi garanterar att våra celler är livsdugliga vid odlingens början i 60 dagar efter leverans från våra anläggningar.
Vi försäkrar att allt material överensstämmer med de specifikationer som beskrivs i analyscertifikatet och/eller produktbladet
För fullständig information, se vår <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantiförklaring

Avtal om materialöverföring krävs	Yes