L-591 Клітини

300202

Клітинна лінія L-591 є однією з декількох неопластичних клітинних ліній, отриманих від пацієнтів з хворобою Ходжкіна, зокрема з вузликово-склерозуючим підтипом. Вона була створена як частина групи клітинних ліній лімфоми Ходжкіна, включаючи L-428 і L-540, і відіграла важливу роль у поглибленні розуміння цієї гематологічної злоякісної пухлини. Клітини L-591 характеризуються анеуплоїдією і мають різні структурні та числові хромосомні аномалії, які вказують на їх неопластичне походження. Ця лінія є особливо цінною для досліджень завдяки чіткому хромосомному малюнку та здатності до проліферації in vitro, що робить її надійною моделлю для вивчення клітинних механізмів розвитку лімфоми Ходжкіна.

Однією з визначальних особливостей клітин L-591 є їх імунофенотип. Клітини експресують Ia-подібні антигени та рецептори, асоційовані з Т-клітинами, але не мають маркерів, характерних для інших гемопоетичних ліній, таких як мієлоїдні клітини, моноцити та макрофаги. Зокрема, клітини L-591 не виробляють поверхневі або цитоплазматичні імуноглобуліни, а також не виявляють специфічні для вірусу Епштейна-Барр (EBV) антигени, такі як EBNA. Відсутність імуноглобулінів та антигенів EBV відрізняє L-591 від інших EBV-позитивних клітинних ліній лімфоми Ходжкіна і підкреслює її корисність для вивчення особливостей патології лімфоми Ходжкіна, які не залежать від інфікування EBV.

Клітинна лінія L-591 морфологічно подібна до клітин Ріда-Штернберга (RS) та Ходжкіна (H), характерних для лімфоми Ходжкіна. Ці клітини відіграють вирішальну роль у дослідженні хвороби Ходжкіна, слугуючи моделлю для розуміння патогенезу захворювання та визначення потенційних терапевтичних мішеней. Унікальні властивості L-591 у поєднанні з її усталеним використанням у лабораторних умовах роблять її важливим інструментом у вивченні лімфоми Ходжкіна, що робить значний внесок у знання про цю складну злоякісну пухлину.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Опис

Клітинна лінія L-591 є однією з декількох неопластичних клітинних ліній, отриманих від пацієнтів з хворобою Ходжкіна, зокрема з вузликово-склерозуючим підтипом. Вона була створена як частина групи клітинних ліній лімфоми Ходжкіна, включаючи L-428 і L-540, і відіграла важливу роль у поглибленні розуміння цієї гематологічної злоякісної пухлини. Клітини L-591 характеризуються анеуплоїдією і мають різні структурні та числові хромосомні аномалії, які вказують на їх неопластичне походження. Ця лінія є особливо цінною для досліджень завдяки чіткому хромосомному малюнку та здатності до проліферації in vitro, що робить її надійною моделлю для вивчення клітинних механізмів розвитку лімфоми Ходжкіна.

Однією з визначальних особливостей клітин L-591 є їх імунофенотип. Клітини експресують Ia-подібні антигени та рецептори, асоційовані з Т-клітинами, але не мають маркерів, характерних для інших гемопоетичних ліній, таких як мієлоїдні клітини, моноцити та макрофаги. Зокрема, клітини L-591 не виробляють поверхневі або цитоплазматичні імуноглобуліни, а також не виявляють специфічні для вірусу Епштейна-Барр (EBV) антигени, такі як EBNA. Відсутність імуноглобулінів та антигенів EBV відрізняє L-591 від інших EBV-позитивних клітинних ліній лімфоми Ходжкіна і підкреслює її корисність для вивчення особливостей патології лімфоми Ходжкіна, які не залежать від інфікування EBV.

Клітинна лінія L-591 морфологічно подібна до клітин Ріда-Штернберга (RS) та Ходжкіна (H), характерних для лімфоми Ходжкіна. Ці клітини відіграють вирішальну роль у дослідженні хвороби Ходжкіна, слугуючи моделлю для розуміння патогенезу захворювання та визначення потенційних терапевтичних мішеней. Унікальні властивості L-591 у поєднанні з її усталеним використанням у лабораторних умовах роблять її важливим інструментом у вивченні лімфоми Ходжкіна, що робить значний внесок у знання про цю складну злоякісну пухлину.

Тканина	Плевральний випіт
Хвороба	Лімфома Ходжкіна

Синоніми

- L 591
- L591

КЛАСИФІКАЦІЯ

Організм	Людина
Секс	Жінка

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Характеристики росту	Підвіска
Рівень біобезпеки	2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Морфологія	Круглі клітини
Тип клітини	Лімфобласт

ІДЕНТИФІКАТОРИ

Посилання

L-591 (каталожний номер 300202)

Ідентифікаційний номер платника податків NCBI	9606
Целозавр	CVCL_1867

ОБРОБКА ТА ВИРОЩУВАННЯ

Живильне середовище

RPMI 1640, w: 2,0 мМ стабільний глютамін, w: 2,0 г/л NaHCO3 (номер за каталожним номером 820700a)

Атмосфера інкубації	37°C, 5% CO2, волога атмосфера.

Добавки

Додайте до середовища 10% FBS, 1 мМ пірувату натрію, 1% NEAA

Пересадка в нове середовище

Підтримуйте культури, періодично додаючи або замінюючи середовище. Починайте культури з щільністю 5 x 10^5 клітин/мл і підтримуйте концентрацію клітин в діапазоні від 3 x 10^5 до 1 x 10^6 клітин/мл для оптимального росту.

Щільність висіву	3x10^5/мл

Розморожування та культивування

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТА КРІОКОНСЕРВАЦІЯ

Стерильність

Зараження мікоплазмою виключається за допомогою аналізів на основі ПЛР та люмінесцентних методів виявлення мікоплазми.
Щоб переконатися у відсутності бактеріального, грибкового або дріжджового забруднення, клітинні культури піддаються щоденному візуальному контролю.

Середовище для заморожування	Як середовище кріоконсервування ми використовуємо повне живильне середовище (включаючи FBS) + 10% ДМСО для адекватної життєздатності після відтавання або CM-1 (номер за каталогом Cytion 800100), до складу якого входять оптимізовані осмопротектори та метаболічні стабілізатори для прискорення відновлення та зменшення кріоіндукованого стресу.

Умови зберігання

Для тривалого зберігання помістіть флакони в парофазний рідкий азот при температурі від -150 до -196 °C. Зберігання при -80 °C допустиме лише як короткий проміжний етап перед перенесенням у рідкий азот.

Умови доставки

Кріоконсервовані клітинні лінії транспортуються на сухому льоду в перевіреній ізольованій упаковці з достатньою кількістю холодоагенту для підтримання температури приблизно -78 °C під час транспортування. При отриманні негайно огляньте контейнер і без зволікань перемістіть флакони у відповідне місце зберігання.

ДОНОР

Вік донора	31 рік

ПРАВОВІ ПИТАННЯ ТА БЕЗПЕКА

Заходи безпеки

Плануючи зберігати кріовіал у рідкому азоті для подальшого розморожування, обов'язково слід дотримуватися суворих заходів безпеки. Під час перенесення заморожених зразків до резервуара з рідким азотом або з нього необхідно використовувати захисні рукавички та одяг, а також маску або захисні окуляри. Це необхідно для того, щоб зменшити ризик травмування від потенційних кріогенних вибухів при вилученні, які можуть призвести до розльоту гострих осколків.

Гарантія

У Cytion ми відповідаємо за якість та життєздатність нашої продукції.
Ми гарантуємо, що наші клітини будуть життєздатними на початку культивування протягом 60 днів після відвантаження з нашого заводу.
Ми запевняємо, що всі матеріали відповідають специфікаціям, описаним у сертифікаті аналізу та/або паспорті продукту
Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, зверніться до нашого Заяви про гарантію

Необхідна угода про передачу матеріалів	Yes