Cellule HK/FDC

300204

Sono ora disponibili anche versioni immortalizzate di queste cellule simili alle HK/FDC, che offrono uno strumento più stabile e scalabile per studi a lungo termine sulla funzione delle FDC e sulle interazioni delle cellule B.Le linee cellulari simili alle cellule dendritiche follicolari (FDC) (cellule HK) provenienti dalle tonsille umane sono state create per studiare il ruolo delle FDC nei centri germinativi dei follicoli linfoidi. Inizialmente, le cellule HK esprimevano marcatori come CD21, CD23, DRC-1, CD40, VCAM-1, ICAM-1 e HJ2, ma hanno perso DRC-1, CD21 e CD23 entro tre giorni di coltura. Dal punto di vista morfologico e funzionale, le cellule HK sono distinte dai fibroblasti e hanno requisiti di crescita unici. Si legano alle cellule B, favorendone la proliferazione, ma non alle cellule T. Le cellule T attivate, stimolate con anticorpi anti-CD3, si legano alle cellule HK, inducendo cambiamenti fenotipici e promuovendone la crescita.
Le cellule HK si legano preferenzialmente e stimolano le cellule B del centro germinativo (GC), salvandole dall'apoptosi. Esse aumentano la proliferazione delle cellule B in presenza di anti-mu o anti-CD40. Queste cellule producono anche fattori solubili che contribuiscono alla loro attività costimolatoria. Le analisi fenotipiche e funzionali suggeriscono che le cellule HK possano derivare dalle FDC, evidenziando il loro potenziale ruolo nel sostenere la maturazione e la differenziazione delle cellule B del GC.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrizione

Sono ora disponibili anche versioni immortalizzate di queste cellule simili alle HK/FDC, che offrono uno strumento più stabile e scalabile per studi a lungo termine sulla funzione delle FDC e sulle interazioni delle cellule B.Le linee cellulari simili alle cellule dendritiche follicolari (FDC) (cellule HK) provenienti dalle tonsille umane sono state create per studiare il ruolo delle FDC nei centri germinativi dei follicoli linfoidi. Inizialmente, le cellule HK esprimevano marcatori come CD21, CD23, DRC-1, CD40, VCAM-1, ICAM-1 e HJ2, ma hanno perso DRC-1, CD21 e CD23 entro tre giorni di coltura. Dal punto di vista morfologico e funzionale, le cellule HK sono distinte dai fibroblasti e hanno requisiti di crescita unici. Si legano alle cellule B, favorendone la proliferazione, ma non alle cellule T. Le cellule T attivate, stimolate con anticorpi anti-CD3, si legano alle cellule HK, inducendo cambiamenti fenotipici e promuovendone la crescita.
Le cellule HK si legano preferenzialmente e stimolano le cellule B del centro germinativo (GC), salvandole dall'apoptosi. Esse aumentano la proliferazione delle cellule B in presenza di anti-mu o anti-CD40. Queste cellule producono anche fattori solubili che contribuiscono alla loro attività costimolatoria. Le analisi fenotipiche e funzionali suggeriscono che le cellule HK possano derivare dalle FDC, evidenziando il loro potenziale ruolo nel sostenere la maturazione e la differenziazione delle cellule B del GC.

Tessuto	Cavità orale, tonsille
Malattia	Linea cellulare di cellule dendritiche follicolari non neoplastiche

Applicazioni

Cellula nutrice per la crescita di linfociti B normali e linfomi/leucemie. Studi sullo sviluppo delle cellule B nei centri germinali dei linfonodi. Eventualmente ricerca sull'infezione virale delle FDC

Sinonimi

- FDC/HK

CLASSIFICAZIONE

Organismo	Umano
Sesso	Non specificato
Proprietà di crescita	Aderente
Presenza di OGM	Senza OGM

Dettagli sullo stato degli OGM

No genetic modification; wildtype immortalized cell line

Livello di biosicurezza	1

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

CARATTERISTICHE

Morfologia	Fibroma
Tipo di cellula	Cellula dendritica follicolare
Tempo di raddoppio	circa 24-36 ore

IDENTIFICATORI

Riferimento bibliografico

HK/FDC (numero di catalogo Cytion 300204)

Codice fiscale NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_IY38

ESPRESSIONE E SUSCETTIBILITÀ

Antigeni di superficie

CD14+, CD40+, ICAM-1+, VCAM-1+

MANIPOLAZIONE E COLTURA

Terreno di coltura

EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutamina, w: 2,2 g/L NaHCO3, w: EBSS (articolo Cytion numero 820100a)

Atmosfera di incubazione	37°C, 5%CO2, atmosfera umidificata.

Integratori

Integrare il terreno di coltura con il 10% di FBS e l'1% di NEAA

Reagente di dissociazione	Accutase

Subcoltura

Rimuovere il vecchio terreno dalle cellule aderenti e lavarle con PBS privo di calcio e magnesio. Per le fiasche T25, utilizzare 3-5 ml di PBS e per le fiasche T75, 5-10 ml. Quindi, coprire completamente le cellule con Accutase, utilizzando 1-2 ml per le fiasche T25 e 2,5 ml per le fiasche T75. Lasciare incubare le cellule a temperatura ambiente per 8-10 minuti per staccarle. Dopo l'incubazione, mescolare delicatamente le cellule con 10 ml di terreno per risospenderle, quindi centrifugare a 300xg per 3 minuti. Scartare il surnatante, risospendere le cellule in terreno fresco e trasferirle in nuove fiasche contenenti terreno fresco.

Rapporto di frazionamento	da 1 a 3
Densità di semina	Da 1 a 3 x 10^4 cellule/cm^2
Rinnovo dei fluidi	da 1 a 2 volte alla settimana
Recupero post-scongelamento	Dopo lo scongelamento, piastrare le cellule a 5 x 10^4 cellule/cm^2 e lasciare che le cellule si riprendano dal processo di congelamento e aderiscano per almeno 24 ore.

Scongelamento e coltura

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTROLLO DI QUALITÀ E CRIOCONSERVAZIONE

Sterilità

La contaminazione da micoplasma viene esclusa utilizzando sia saggi basati sulla PCR sia metodi di rilevamento del micoplasma basati sulla luminescenza.
Per garantire l'assenza di contaminazione batterica, fungina o da lieviti, le colture cellulari sono sottoposte a ispezioni visive quotidiane.

Terreno di coltura congelato	Come terreno di crioconservazione, utilizziamo un terreno di crescita completo (incluso FBS) + 10% DMSO per un'adeguata vitalità post-scongelamento, o CM-1 (numero di catalogo Cytion 800100), che include osmoprotettori e stabilizzatori metabolici ottimizzati per migliorare il recupero e ridurre lo stress crio-indotto.

Condizioni di conservazione

Per la conservazione a lungo termine, porre le fiale in azoto liquido in fase vapore a una temperatura compresa tra -150 e -196 °C circa. La conservazione a -80 °C è accettabile solo come breve fase intermedia prima del trasferimento in azoto liquido.

Condizioni di spedizione

Le linee cellulari crioconservate vengono spedite su ghiaccio secco in confezioni isolate e convalidate, con una quantità di refrigerante sufficiente a mantenere circa -78 °C durante il trasporto. Al ricevimento, ispezionare immediatamente il contenitore e trasferire immediatamente le fiale in un luogo di conservazione appropriato.

DONATORE

Età dei donatori	Bambino
Etnia	Caucasico

ASPETTI LEGALI E DI SICUREZZA

Misure di sicurezza

Quando si prevede di conservare una crioviale in azoto liquido per un futuro scongelamento, è obbligatorio attenersi a rigorose misure di sicurezza. Guanti e indumenti protettivi appropriati sono essenziali e l'uso di una maschera facciale o di occhiali di sicurezza è richiesto durante il trasferimento dei campioni congelati da o verso il serbatoio di azoto liquido. Questo per ridurre il rischio di lesioni dovute a potenziali esplosioni di crioviali al momento della rimozione, che possono provocare la proiezione di frammenti taglienti.

Garanzia

Noi di Cytion garantiamo la qualità e la vitalità dei nostri prodotti.
Garantiamo che le nostre cellule saranno vitali all'inizio della coltura per 60 giorni dopo la spedizione dai nostri stabilimenti.
Assicuriamo che tutti i materiali sono conformi alle specifiche descritte nel Certificato di Analisi e/o nella Scheda Prodotto
Per tutti i dettagli, consultare la nostra <a href=""/Chi-siamo/Garanzia/"" hreflang=""x-default"">Dichiarazione di Garanzia

È richiesto un accordo di trasferimento di materiale	Yes