HCT-8 (HRT-18) cellen

300210

HCT-8 cellen, ook bekend als humane ileocecale colorectale adenocarcinomacellen, zijn een epitheliale cellijn die oorspronkelijk afkomstig is van een 67-jarige Kaukasische mannelijke patiënt met ileocecaal adenocarcinoom. De HCT-8 cellijn werd eind jaren zestig ontwikkeld en wordt veel gebruikt voor kankeronderzoek, met name voor het bestuderen van de pathogenese van colorectale kanker, metastase en de respons op behandelingen.
Morfologisch zijn HCT-8 cellen epitheelachtig en vertonen ze een monolaag groeipatroon met een polygonale vorm. Ze kunnen zowel in aanhangende als in half gesuspendeerde culturen groeien, wat kenmerkend is voor sommige overgangsstadia van kankercelmetastase. Deze eigenschap maakt ze bijzonder nuttig voor studies met betrekking tot de invasie en migratie van kankercellen.
Genotypisch zijn HCT-8 cellen hypertriploïd en bevatten ze verschillende chromosoomafwijkingen die veel voorkomen bij colorectale carcinomen, waaronder mutaties en deleties die relevant zijn voor de progressie van kanker en resistentiemechanismen. Dit genetische profiel ondersteunt hun gebruik in oncologische studies, met name studies die zich richten op genetische routes die betrokken zijn bij tumorigenese en resistentie tegen geneesmiddelen.
Onderzoek met HCT-8 cellen heeft aanzienlijk bijgedragen aan het begrip van colorectale kankerbiologie, inclusief de opheldering van moleculaire routes die betrokken zijn bij kankercelproliferatie, apoptose en chemoresistentie. De cellijn blijft een cruciaal model voor het onderzoeken van de werkzaamheid van nieuwe therapeutische middelen en voor het verkennen van de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan dikkedarmkanker.

ALGEMENE INFORMATIE

Beschrijving

HCT-8 cellen, ook bekend als humane ileocecale colorectale adenocarcinomacellen, zijn een epitheliale cellijn die oorspronkelijk afkomstig is van een 67-jarige Kaukasische mannelijke patiënt met ileocecaal adenocarcinoom. De HCT-8 cellijn werd eind jaren zestig ontwikkeld en wordt veel gebruikt voor kankeronderzoek, met name voor het bestuderen van de pathogenese van colorectale kanker, metastase en de respons op behandelingen.
Morfologisch zijn HCT-8 cellen epitheelachtig en vertonen ze een monolaag groeipatroon met een polygonale vorm. Ze kunnen zowel in aanhangende als in half gesuspendeerde culturen groeien, wat kenmerkend is voor sommige overgangsstadia van kankercelmetastase. Deze eigenschap maakt ze bijzonder nuttig voor studies met betrekking tot de invasie en migratie van kankercellen.
Genotypisch zijn HCT-8 cellen hypertriploïd en bevatten ze verschillende chromosoomafwijkingen die veel voorkomen bij colorectale carcinomen, waaronder mutaties en deleties die relevant zijn voor de progressie van kanker en resistentiemechanismen. Dit genetische profiel ondersteunt hun gebruik in oncologische studies, met name studies die zich richten op genetische routes die betrokken zijn bij tumorigenese en resistentie tegen geneesmiddelen.
Onderzoek met HCT-8 cellen heeft aanzienlijk bijgedragen aan het begrip van colorectale kankerbiologie, inclusief de opheldering van moleculaire routes die betrokken zijn bij kankercelproliferatie, apoptose en chemoresistentie. De cellijn blijft een cruciaal model voor het onderzoeken van de werkzaamheid van nieuwe therapeutische middelen en voor het verkennen van de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan dikkedarmkanker.

Weefsel	Rectum
Ziekte	Adenocarcinoom

Synoniemen

- HCT 8
- HCT8

CLASSIFICATIE

Organisme	Mens
Seks	Man
Groei-eigenschappen	Aanhanger
Bioveiligheidsniveau	1

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

KENMERKEN

Morfologie	Epitheelachtig
Tumorverwekkend	In naakte muizen
Verdubbelingstijd	15 uur

IDENTIFICATIEGEGEVENS

Bronvermelding

HCT-8 (Cytion catalogusnummer 300210)

NCBI-belastingnummer	9606
Cellosaurus	CVCL_2478

EXPRESSIE EN VATBAARHEID

Antigeenexpressie

CDx (+/-), CDy (-),

Iso-enzymen

AK-1, 1, ES-D, 1-2, GLO-1, 2, G6PD, B, PGM1, 1, PGM3, 1, Me-2, 1

Mutatieprofiel

HRT-18 cellen dragen een mutatie in codon 13 van het Kras gen: GGC(Wt Gly) >GAC(Asp)

Virussen

Omgekeerde transcriptase negatief

Producten

Carcinoembryonisch antigeen (CEA) 0,5 ng/10 exp6 cellen/10 dagen, alkalische fosfatase, keratine

BEHANDELING EN KWEEK

Kweekmedium

DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3,1 g/L Glucose, w: 2,5 mM L-Glutamine, w: 15 mM HEPES, w: 0,5 mM Natriumpyruvaat, w: 1,2 g/L NaHCO3 (Cytion artikelnummer 820400a)

Incubatieomgeving	37°C, 5%CO2, bevochtigde atmosfeer.

Supplementen

Vul het medium aan met 10% FBS

Dissociatiereagens	Accutase

Heruitplanten

Verwijder het oude medium van de adherente cellen en was ze met PBS zonder calcium en magnesium. Gebruik voor T25-flesjes 3-5 ml PBS en voor T75-flesjes 5-10 ml. Bedek de cellen vervolgens volledig met Accutase, met 1-2 ml voor T25-flesjes en 2,5 ml voor T75-flesjes. Laat de cellen gedurende 8-10 minuten bij kamertemperatuur incuberen om ze los te maken. Na incubatie de cellen voorzichtig mengen met 10 ml medium om ze te resuspenderen en vervolgens centrifugeren bij 300xg gedurende 3 minuten. Gooi het supernatant weg, resuspendeer de cellen in vers medium en breng ze over in nieuwe kolven die al vers medium bevatten.

Zaaidichtheid	2 tot 4 x 10^4 cellen/cm^2
Vloeistofverversing	2 tot 3 keer per week
Herstel na ontdooiing	Snel

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Ontdooien en kweken

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KWALITEITSCONTROLE EN CRYOPRESERVATIE

Onvruchtbaarheid

Mycoplasmaverontreiniging wordt uitgesloten met zowel PCR-gebaseerde testen als op luminescentie gebaseerde mycoplasmadetectiemethoden.
Om er zeker van te zijn dat er geen besmetting is met bacteriën, schimmels of gisten, worden de celculturen dagelijks onderworpen aan visuele inspecties.

Kweekmedium invriezen	Als cryoconserveringsmedium gebruiken we volledig groeimedium (inclusief FBS) + 10% DMSO voor voldoende levensvatbaarheid na het ontdooien, of CM-1 (Cytion catalogusnummer 800100), dat geoptimaliseerde osmoprotectanten en metabolische stabilisatoren bevat om het herstel te verbeteren en door cryo geïnduceerde stress te verminderen.

Opslagvoorwaarden

Voor langdurige bewaring plaatst u flesjes in vloeibare stikstof in dampfase bij ongeveer -150 tot -196 °C. Opslag bij -80 °C is alleen aanvaardbaar als korte tussenstap vóór overbrenging naar vloeibare stikstof.

Verzendvoorwaarden

Gecryopreserveerde cellijnen worden verzonden op droog ijs in gevalideerde, geïsoleerde verpakkingen met voldoende koelmiddel om gedurende het transport ongeveer -78 °C te handhaven. Inspecteer de verpakking onmiddellijk na ontvangst en breng de flacons onverwijld over naar de juiste opslagplaats.

DONATEUR

Leeftijd van de donor	67 jaar

JURIDISCHE EN VEILIGHEIDSASPECTEN

Veiligheidsmaatregelen

Wanneer men van plan is om een cryovial in vloeibare stikstof op te slaan om later te ontdooien, is het verplicht om strenge veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Passende beschermende handschoenen en kleding zijn essentieel en het gebruik van een gezichtsmasker of veiligheidsbril is vereist tijdens het overbrengen van bevroren monsters naar of uit de tank met vloeibare stikstof. Dit is om het risico op letsel door mogelijke cryoviale explosies bij het verwijderen te beperken, wat kan resulteren in de projectie van scherpe fragmenten.

Garantie

Bij Cytion staan we achter de kwaliteit en levensvatbaarheid van onze producten.
We garanderen dat onze cellen levensvatbaar zijn bij het begin van de kweek gedurende 60 dagen na verzending vanuit onze faciliteiten.
We verzekeren dat alle materialen voldoen aan de specificaties beschreven in het analysecertificaat en/of productblad
Raadpleeg voor volledige informatie onze <a href=""/Wie-zijn-wij/Garantie/"" hreflang=""x-default"">Garantieverklaring

Er is een overeenkomst inzake materiaaloverdracht vereist	Yes