خلايا HS-683

300213

هو سلالة خلايا الورم الدبقي البشري المشتق من نسيج دماغي لمريض بالغ تم تشخيص إصابته بالورم الأرومي الدبقي متعدد الأشكال. والورم HS-683 ذا قيمة في HS-683 الأرومي الدبقي متعدد الأشكال هو نوع شديد العدوانية من سرطان الدماغ، وهو معروف بنموه السريع وسوء تشخيصه. ويُعد خط خلايا أبحاث السرطان نظراً لقدرته على تقديم رؤى حول الآليات الجزيئية التي تقود تكاثر الورم الدبقي وغزوه ومقاومته للعلاجات.
البروتين) GFAP العديد من الخصائص النموذجية لخلايا الورم الدبقي، بما في ذلك القدرة التكاثرية العالية والتعبير عن علامات مثل HS-683 تُظهر خلايا والذي يدل على أصلها الدبقي. تُستخدم هذه الخلايا بشكل شائع في الدراسات التي تبحث في فعالية عوامل العلاج الكيميائي ،(الحمضي الليفي الليفي الدبقي لاستكشاف التغيرات الوراثية والوراثية اللاجينية ومسارات نقل الإشارات ودور HS-683 والعلاجات الإشعاعية والعلاجات الموجهة الجديدة. يستخدم الباحثون يمثل نموذجاً مهماً لتطوير واختبار استراتيجيات علاجية جديدة تهدف إلى HS-683 البيئة الدقيقة للورم في تطور الورم الدبقي. وبالتالي، فإن خط الخلايا تحسين نتائج المرضى المصابين بالورم الأرومي الدبقي.

معلومات عامة

الوصف

هو سلالة خلايا الورم الدبقي البشري المشتق من نسيج دماغي لمريض بالغ تم تشخيص إصابته بالورم الأرومي الدبقي متعدد الأشكال. والورم HS-683 ذا قيمة في HS-683 الأرومي الدبقي متعدد الأشكال هو نوع شديد العدوانية من سرطان الدماغ، وهو معروف بنموه السريع وسوء تشخيصه. ويُعد خط خلايا أبحاث السرطان نظراً لقدرته على تقديم رؤى حول الآليات الجزيئية التي تقود تكاثر الورم الدبقي وغزوه ومقاومته للعلاجات.
البروتين) GFAP العديد من الخصائص النموذجية لخلايا الورم الدبقي، بما في ذلك القدرة التكاثرية العالية والتعبير عن علامات مثل HS-683 تُظهر خلايا والذي يدل على أصلها الدبقي. تُستخدم هذه الخلايا بشكل شائع في الدراسات التي تبحث في فعالية عوامل العلاج الكيميائي ،(الحمضي الليفي الليفي الدبقي لاستكشاف التغيرات الوراثية والوراثية اللاجينية ومسارات نقل الإشارات ودور HS-683 والعلاجات الإشعاعية والعلاجات الموجهة الجديدة. يستخدم الباحثون يمثل نموذجاً مهماً لتطوير واختبار استراتيجيات علاجية جديدة تهدف إلى HS-683 البيئة الدقيقة للورم في تطور الورم الدبقي. وبالتالي، فإن خط الخلايا تحسين نتائج المرضى المصابين بالورم الأرومي الدبقي.

الأنسجة	الدماغ
المرض	الورم الدبقات الدبقية قليلة التغصن

المرادفات

- HS 683
- Hs 683
- Hs-683
- Hs683
- HS683
- Hs 683.T
- HS 683T
- Hs683T

التصنيف

كائن حي	إنسان
الجنس	ذكر
خصائص النمو	الملتزم
مستوى السلامة البيولوجية	1

الخصائص

المورفولوجيا	أرومة ليفية شبيهة بالأرومة الليفية
مُسبِّب للأورام	لا يوجد
حالة البلويدية	أنيوبلويد

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

حالة MSI	مستقر (MSS)

النمط الكروموسومي

ناقص الصيغة الصبغية مع وجود كروموسومات (P15) Y = 88، 97 والمدى = 44 إلى

زمن المضاعفة	45 إلى 50 ساعة

المعرّفات

المرجع

HS-683 (300213 (الرقم الكتالوجي لسيتيون

NCBI رقم التعريف الضريبي لدى	9606
سيلوصور	CVCL_0844

التعبير والقابلية للإصابة

الإيزوزيمات

منتج تردد النمط الظاهري: 0.0029، 2، 1، GLO-1، 1، AK-2، 2، Me-1، ES-D، 2-1، PGM3، 1، PGM1، ب، G6PD

التعامل مع النباتات وزراعتها

وسط الاستزراع

DMEM، ت: 3.7 جم/لتر جلوتامين، ت: 4 مليمتر جلوكوز، ت: 4.5 جم/لتر NaHCO3، الصوديوم بيروفات مليمتر 1.0 :ت) من سايتيون aرقم المادة 820300)

بيئة الحضانة	37 درجة مئوية، و5% من ثاني أكسيد الكربون في جو مرطب.

المكملات الغذائية

قم بتزويد الوسط ب 10٪ من ال FBS

كاشف التفكك	أكوتاس

إعادة الاستنبات

استخدم 3-5 مل من T25، الذي يفتقر إلى الكالسيوم والمغنيسيوم. بالنسبة لقوارير PBS قم بإزالة الوسط القديم من الخلايا الملتصقة واغسلها باستخدام PBS، دع T75. و2.5 مل لقوارير T25 استخدم 5-10 مل. ثم، قم بتغطية الخلايا بالكامل باستخدام أكوتاز، باستخدام 1-2 مل لقوارير T75، وبالنسبة لقوارير الخلايا تحتضن في درجة حرارة الغرفة لمدة 8-10 دقائق لفصلها. بعد الحضانة، اخلط الخلايا برفق مع 10 مل من الوسط لإعادة ترسيبها، ثم اطردها مركزيًا بسرعة 300 xg لمدة 3 دقائق. تخلص من المادة الطافية، وأعد غمر الخلايا في وسط جديد وانقلها إلى قوارير جديدة تحتوي بالفعل على وسط جديد.

كثافة البذر	عند زرعها بمعدل 1 × 10^4 خلية/سم2، ستصل الخلايا إلى 80% من التلاقي في غضون 3 إلى 4 أيام.
تجديد السوائل	كل 3 أيام
التعافي بعد ذوبان الجليد	بعد الذوبان، ضع الخلايا في طبق بمعدل 4 × 10^4 خلية/سم2 واترك الخلايا تتعافى من عملية التجميد وتلتصق لمدة 24 ساعة على الأقل.

إذابة الثلج والزراعة

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.

For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.

Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.

Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.

Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.

Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.

Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

مراقبة الجودة والحفظ بالتبريد

العقم

وطرق الكشف عن الميكوبلازما القائمة على (PCR) يُستبعد التلوث بالميكوبلازما باستخدام كل من المقايسات القائمة على تفاعل البوليميراز المتسلسل التألق.
ولضمان عدم وجود تلوث بكتيري أو فطري أو خميرة يتم إخضاع مزارع الخلايا للفحص البصري اليومي.

وسط التجميد	من أجل الحفاظ DMSO 10% + (FBS بما في ذلك) كوسيط للحفظ بالتبريد، نستخدم وسط نمو كامل والذي يتضمن مواد حماية ،(رقم Cytion 800100 كتالوج) CM-1 على حيوية كافية بعد ذوبان الجليد أو أسموزموبيروتيكتية ومثبتات أيضية مُحسّنة لتعزيز التعافي وتقليل الإجهاد الناجم عن التبريد.

شروط التخزين

للحفظ طويل الأمد، ضع القوارير في نيتروجين سائل في طور البخار عند درجة حرارة تتراوح بين -150 و -196 درجة مئوية تقريباً. يُقبل التخزين عند درجة حرارة -80 درجة مئوية فقط كخطوة مؤقتة قصيرة قبل النقل إلى النيتروجين السائل.

شروط الشحن

تُشحن خطوط الخلايا المحفوظة بالتبريد على ثلج جاف في عبوات معزولة وموثوقة مع مبرد كافٍ للحفاظ على درجة حرارة -78 درجة مئوية تقريبًا طوال فترة النقل. عند الاستلام، افحص الحاوية على الفور وانقل القوارير دون تأخير إلى المخزن المناسب.

المانح

عمر المتبرع	76 سنة
الأصل العرقي	قوقازي

الشؤون القانونية والسلامة

احتياطات السلامة

عند التخطيط لتخزين القارورة المبردة في النيتروجين السائل لإذابتها في المستقبل، من الضروري الالتزام بتدابير السلامة الصارمة. من الضروري ارتداء قفازات وملابس واقية مناسبة، كما يلزم استخدام قناع الوجه أو نظارات السلامة أثناء نقل العينات المجمدة من خزان النيتروجين السائل أو إليه. وذلك للتخفيف من خطر الإصابة من الانفجارات المحتملة للنيتروجين المبرد عند الإزالة، والتي يمكن أن تؤدي إلى قذف شظايا حادة.

الضمان

في Cytion، نلتزم في Cytion بجودة منتجاتنا وحيويتها.
نحن نضمن أن تكون خلايانا قابلة للحياة في بداية الاستزراع لمدة 60 يومًا بعد الشحن من منشآتنا.
نؤكد أن جميع المواد مطابقة للمواصفات الموضحة في شهادة التحليل و/أو ورقة المنتج
بيان الضمان<a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">للحصول على التفاصيل الكاملة، يُرجى الرجوع إلى

يلزم إبرام اتفاقية نقل المواد	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB