Buňky HS-683

300213

HS-683 je lidská gliomová buněčná linie odvozená z mozkové tkáně dospělého pacienta s diagnózou multiformního glioblastomu. Glioblastoma multiforme je vysoce agresivní typ rakoviny mozku, který je známý svým rychlým růstem a špatnou prognózou. Buněčná linie HS-683 je cenná ve výzkumu rakoviny díky své schopnosti poskytnout vhled do molekulárních mechanismů, které jsou příčinou proliferace, invaze a rezistence gliomu vůči léčbě.
Buňky HS-683 vykazují mnoho charakteristik typických pro gliomové buňky, včetně vysoké proliferační schopnosti a exprese markerů, jako je GFAP (gliální fibrilární kyselý protein), což svědčí o jejich gliálním původu. Tyto buňky se běžně používají ve studiích zkoumajících účinnost chemoterapeutických látek, radiační léčby a nových cílených terapií. Výzkumníci využívají HS-683 ke zkoumání genetických a epigenetických změn, signálních přenosových cest a úlohy nádorového mikroprostředí v progresi gliomu. Buněčná linie HS-683 proto slouží jako klíčový model pro vývoj a testování nových terapeutických strategií zaměřených na zlepšení výsledků u pacientů s glioblastomem.

OBECNÉ INFORMACE

Popis

HS-683 je lidská gliomová buněčná linie odvozená z mozkové tkáně dospělého pacienta s diagnózou multiformního glioblastomu. Glioblastoma multiforme je vysoce agresivní typ rakoviny mozku, který je známý svým rychlým růstem a špatnou prognózou. Buněčná linie HS-683 je cenná ve výzkumu rakoviny díky své schopnosti poskytnout vhled do molekulárních mechanismů, které jsou příčinou proliferace, invaze a rezistence gliomu vůči léčbě.
Buňky HS-683 vykazují mnoho charakteristik typických pro gliomové buňky, včetně vysoké proliferační schopnosti a exprese markerů, jako je GFAP (gliální fibrilární kyselý protein), což svědčí o jejich gliálním původu. Tyto buňky se běžně používají ve studiích zkoumajících účinnost chemoterapeutických látek, radiační léčby a nových cílených terapií. Výzkumníci využívají HS-683 ke zkoumání genetických a epigenetických změn, signálních přenosových cest a úlohy nádorového mikroprostředí v progresi gliomu. Buněčná linie HS-683 proto slouží jako klíčový model pro vývoj a testování nových terapeutických strategií zaměřených na zlepšení výsledků u pacientů s glioblastomem.

Tkáň	Mozek
Nemoc	Oligodendrogliom

Synonyma

- HS 683
- Hs 683
- Hs-683
- Hs683
- HS683
- Hs 683.T
- HS 683T
- Hs683T

KLASIFIKACE

Organismus	Člověk
Sex	Muž
Růstové vlastnosti	Přívrženec
Úroveň biologické bezpečnosti	1

CHARAKTERISTIKA

Morfologie	Fibroblastům podobné
Tumorogenní	Ne

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Ploidní stav	Aneuploidní
Stav MSI	Stabilní (MSS)

Karyotyp

(P15) hypotetraploidní s modem = 88, rozsah = 44 až 97, chromozomy Y přítomny

Doba zdvojnásobení	45 až 50 hodin

IDENTIFIKÁTORY

Citace

HS-683 (katalogové číslo Cytion 300213)

Daňové identifikační číslo NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_0844

EXPRESE A NÁCHYLNOST

Isoenzymy

G6PD, B, PGM1, 1, PGM3, 1-2, ES-D, 1, Me-2, 2, AK-1, 1, GLO-1, 2, produkt fenotypové frekvence: 0.0029

MANIPULACE A CHOV

Pěstovací médium

DMEM, w: 4,5 g/l glukózy, w: 4 mM L-glutaminu, w: 3,7 g/l NaHCO3, w: 1,0 mM pyruvátu sodného (číslo výrobku Cytion 820300a)

Inkubační atmosféra	37 °C, 5 %CO2, zvlhčená atmosféra.

Doplňky stravy

Doplňte médium o 10% FBS

Disociační činidlo	Accutase

Subkultivace

Odstraňte staré médium z adherovaných buněk a promyjte je PBS bez vápníku a hořčíku. Pro baňky T25 použijte 3-5 ml PBS a pro baňky T75 5-10 ml. Poté buňky zcela zakryjte přípravkem Accutase, přičemž použijte 1-2 ml pro baňky T25 a 2,5 ml pro baňky T75. Nechte buňky inkubovat při pokojové teplotě po dobu 8-10 minut, aby se oddělily. Po inkubaci jemně promíchejte buňky s 10 ml média, aby byly znovu suspendovány, a poté je odstřeďte při 300xg po dobu 3 minut. Supernatant vyhoďte, buňky znovu rozpusťte v čerstvém médiu a přeneste je do nových baněk, které již obsahují čerstvé médium.

Hustota výsevu	Při nasazení v hustotě 1 x 10^4 buněk/cm^2 dosáhnou buňky 80% konfluence během 3 až 4 dnů.
Obnova tekutin	Každé 3 dny
Zotavení po rozmrazení	Po rozmrazení naneste buňky v množství 4 x 10^4 buněk/cm^2 a nechte je alespoň 24 hodin zotavit se z procesu zmrazení a přilnout.

Rozmrazování a kultivace

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KVALITY A KRYOKONZERVACE

Sterilita

Kontaminace mykoplazmaty je vyloučena jak pomocí testů založených na PCR, tak pomocí luminiscenčních metod detekce mykoplazmy. Aby se zajistilo, že nedojde ke kontaminaci bakteriemi, plísněmi nebo kvasinkami, jsou buněčné kultury denně podrobovány vizuálním kontrolám.

Mrazicí médium	Jako kryokonzervační médium používáme kompletní růstové médium (včetně FBS) + 10 % DMSO pro zajištění dostatečné životaschopnosti po rozmrazení nebo CM-1 (katalogové číslo 800100 společnosti Cytion), které obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory pro zlepšení regenerace a snížení stresu způsobeného kryo.

Podmínky skladování

Pro dlouhodobé uchování umístěte lahvičky do kapalného dusíku v plynné fázi při teplotě přibližně -150 až -196 °C. Skladování při -80 °C je přijatelné pouze jako krátký přechodný krok před přemístěním do kapalného dusíku.

Dopravní podmínky

Kryokonzervované buněčné linie se přepravují na suchém ledu v ověřených, izolovaných obalech s dostatečným množstvím chladiva, aby se po celou dobu přepravy udržovala teplota přibližně -78 °C. Po obdržení ihned zkontrolujte obal a neprodleně přeneste lahvičky do vhodného skladu.

DÁRCE

Věk dárce	76 let
Etnická příslušnost	Kavkazský

PRÁVNÍ INFORMACE A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Bezpečnostní opatření

Při plánování uložení kryovialu v kapalném dusíku pro budoucí rozmrazení je nutné dodržovat přísná bezpečnostní opatření. Nezbytné jsou vhodné ochranné rukavice a oděv a při přenášení zmrazených vzorků do nádrže s kapalným dusíkem nebo z ní je nutné používat obličejovou masku nebo ochranné brýle. To proto, aby se snížilo riziko zranění v důsledku možných výbuchů kryovialů při jejich vyjímání, které mohou mít za následek vystřelování ostrých úlomků.

Záruka

Ve společnosti Cytion si stojíme za kvalitou a životaschopností našich produktů.
Zaručujeme, že naše buňky budou životaschopné na začátku kultivace po dobu 60 dnů po odeslání z našich zařízení.
Zaručujeme, že všechny materiály odpovídají specifikacím popsaným v certifikátu analýzy a/nebo v produktovém listu
Úplné informace naleznete v našem <a href=""/Kdo-jsme/Záruka/"" hreflang=""x-default"">Záručním prohlášení

Je nutná smlouva o převodu materiálu	Yes