Κύτταρα HT-1080

300216

Τα κύτταρα HT-1080, που προέρχονται από τον συνδετικό ιστό ενός 35χρονου άνδρα ασθενούς με ινοσάρκωμα το 1972, χρησιμοποιούνται ευρέως για τη μελέτη των μηχανισμών εισβολής και μετάστασης των όγκων λόγω της ιδιαίτερα επιθετικής και διεισδυτικής τους φύσης.
Τα κύτταρα HT-1080 έχουν χρησιμοποιηθεί εκτενώς σε μελέτες που αφορούν την κυτταρική μετανάστευση, δοκιμασίες εισβολής και τη δοκιμή αντικαρκινικών ενώσεων. Στον τομέα της θεραπευτικής ανάπτυξης, τα κύτταρα HT-1080 χρησιμοποιούνται στον έλεγχο αντικαρκινικών φαρμάκων και στην αξιολόγηση των επιδράσεών τους στην κυτταρική βιωσιμότητα, την απόπτωση και το μεταστατικό δυναμικό.
Τα κύτταρα HT-1080 έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί σε έρευνες που επικεντρώνονται στην εξωκυτταρική μήτρα, την αγγειογένεση και το ρόλο διαφόρων γονιδίων και πρωτεϊνών στην εξέλιξη του καρκίνου. Τα κύτταρα HT-1080 παράγουν μεταλλοπρωτεϊνάσες της μήτρας (MMPs), ένζυμα που αποικοδομούν συστατικά της εξωκυτταρικής μήτρας και διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην εισβολή και τη μετάσταση των όγκων. Το χαρακτηριστικό αυτό καθιστά την κυτταρική σειρά HT-1080 χρήσιμη για μελέτες που διερευνούν τη ρύθμιση των MMPs και των αναστολέων τους.
Συνοψίζοντας, η κυτταρική σειρά HT-1080, με τις εκτεταμένες εφαρμογές της στη μελέτη της έρευνας του καρκίνου, των μοντέλων κυτταρικής προσκόλλησης, μετανάστευσης και εισβολής, καθώς και στην ανάπτυξη θεραπευτικών στρατηγικών, εξακολουθεί να αποτελεί πολύτιμο πόρο στην έρευνα του καρκίνου.

ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Περιγραφή

Τα κύτταρα HT-1080, που προέρχονται από τον συνδετικό ιστό ενός 35χρονου άνδρα ασθενούς με ινοσάρκωμα το 1972, χρησιμοποιούνται ευρέως για τη μελέτη των μηχανισμών εισβολής και μετάστασης των όγκων λόγω της ιδιαίτερα επιθετικής και διεισδυτικής τους φύσης.
Τα κύτταρα HT-1080 έχουν χρησιμοποιηθεί εκτενώς σε μελέτες που αφορούν την κυτταρική μετανάστευση, δοκιμασίες εισβολής και τη δοκιμή αντικαρκινικών ενώσεων. Στον τομέα της θεραπευτικής ανάπτυξης, τα κύτταρα HT-1080 χρησιμοποιούνται στον έλεγχο αντικαρκινικών φαρμάκων και στην αξιολόγηση των επιδράσεών τους στην κυτταρική βιωσιμότητα, την απόπτωση και το μεταστατικό δυναμικό.
Τα κύτταρα HT-1080 έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί σε έρευνες που επικεντρώνονται στην εξωκυτταρική μήτρα, την αγγειογένεση και το ρόλο διαφόρων γονιδίων και πρωτεϊνών στην εξέλιξη του καρκίνου. Τα κύτταρα HT-1080 παράγουν μεταλλοπρωτεϊνάσες της μήτρας (MMPs), ένζυμα που αποικοδομούν συστατικά της εξωκυτταρικής μήτρας και διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην εισβολή και τη μετάσταση των όγκων. Το χαρακτηριστικό αυτό καθιστά την κυτταρική σειρά HT-1080 χρήσιμη για μελέτες που διερευνούν τη ρύθμιση των MMPs και των αναστολέων τους.
Συνοψίζοντας, η κυτταρική σειρά HT-1080, με τις εκτεταμένες εφαρμογές της στη μελέτη της έρευνας του καρκίνου, των μοντέλων κυτταρικής προσκόλλησης, μετανάστευσης και εισβολής, καθώς και στην ανάπτυξη θεραπευτικών στρατηγικών, εξακολουθεί να αποτελεί πολύτιμο πόρο στην έρευνα του καρκίνου.

Ασθένεια	Ινοσάρκωμα

Συνώνυμα

- Ht-1080
- HT 1080
- HT1080
- HT 1080.T

ΤΑΞΙΝΌΜΗΣΗ

Οργανισμός	Άνθρωπος
Σεξ	Άνδρας
Ιδιότητες ανάπτυξης	Πιστός
Επίπεδο βιοασφάλειας	1

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Μορφολογία	Επιθηλιοειδής

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Τύπος κυττάρου	Ινοβλάστες
Ογκογόνος	Ναι, σε ανοσοκατασταλμένα ποντίκια

Καρυότυπος

Τυπικός αριθμός: 2n=46, ψευδοδιπλοειδές

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΆ

Παραπομπή

HT-1080 (αριθμός καταλόγου Cytion 300216)

Αριθμός φορολογικού μητρώου NCBI	9606
Κελλοσαύρος	CVCL_0317

ΈΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΊΑ

Ισοένζυμα

G6PD, B

Ογκογονίδια

Ras+

Ευαισθησία στον ιό

Πολιοϊός 1, φυσαλιδώδης στοματίτιδα (Indiana), RD114, ιός της λευχαιμίας των αιλουροειδών (FeLV)

Αντίστροφη μεταγραφάση	Αρνητικό

ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΑ

Θρεπτικό μέσο

EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-γλουταμίνη, w: 2,2 g/L NaHCO3, w: EBSS (αριθμός άρθρου Cytion 820100a)

Ατμόσφαιρα επώασης	37°C, 5%CO2, υγροποιημένη ατμόσφαιρα.

Συμπληρώματα

Συμπληρώστε το μέσο με 10% FBS και 1% NEAA

Αντιδραστήριο αποσύνδεσης	Accutase

Αναπαραγωγή σε υποκαλλιέργεια

Αφαιρέστε το παλιό μέσο από τα προσκολλημένα κύτταρα και πλύντε τα με PBS που δεν περιέχει ασβέστιο και μαγνήσιο. Για φιάλες T25, χρησιμοποιήστε 3-5 ml PBS και για φιάλες T75, χρησιμοποιήστε 5-10 ml. Στη συνέχεια, καλύψτε πλήρως τα κύτταρα με Accutase, χρησιμοποιώντας 1-2 ml για φιάλες T25 και 2,5 ml για φιάλες T75. Αφήστε τα κύτταρα να επωαστούν σε θερμοκρασία δωματίου για 8-10 λεπτά για να αποκολληθούν. Μετά την επώαση, αναμείξτε απαλά τα κύτταρα με 10 ml μέσου για να ανασυσταθούν και, στη συνέχεια, φυγοκεντρίστε στα 300xg για 3 λεπτά. Απορρίψτε το υπερκείμενο υγρό, ανασυστάστε τα κύτταρα σε φρέσκο μέσο και μεταφέρετέ τα σε νέες φιάλες που περιέχουν ήδη φρέσκο μέσο.

Πυκνότητα σποράς	1 x 10^4 κύτταρα/cm^2
Ανανέωση υγρών	Κάθε 3 ημέρες
Ανάκαμψη μετά την απόψυξη	Μετά την απόψυξη, τοποθετήστε τα κύτταρα σε πλάκα με πυκνότητα 5 x 10^4 κύτταρα/cm^2 και αφήστε τα κύτταρα να αναρρώσουν από τη διαδικασία κατάψυξης και να προσκολληθούν για τουλάχιστον 24 ώρες.

Απόψυξη και καλλιέργεια

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΡΥΟΣΥΝΤΉΡΗΣΗ

Στειρότητα

Η μόλυνση από μυκόπλασμα αποκλείεται με τη χρήση τόσο των δοκιμασιών που βασίζονται στην PCR όσο και των μεθόδων ανίχνευσης μυκοπλάσματος με βάση τη φωταύγεια.
Για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει μόλυνση από βακτήρια, μύκητες ή ζύμες, οι κυτταροκαλλιέργειες υποβάλλονται σε καθημερινές οπτικές επιθεωρήσεις.

Μέσο κατάψυξης	Ως μέσο κρυοσυντήρησης, χρησιμοποιούμε πλήρες μέσο ανάπτυξης (συμπεριλαμβανομένου του FBS) + 10% DMSO για επαρκή βιωσιμότητα μετά την απόψυξη, ή CM-1 (αριθμός καταλόγου Cytion 800100), το οποίο περιλαμβάνει βελτιστοποιημένα ωσμοπροστατευτικά και μεταβολικούς σταθεροποιητές για την ενίσχυση της ανάκαμψης και τη μείωση του στρες που προκαλείται από την κρυοσυντήρηση.

Συνθήκες αποθήκευσης

Για μακροχρόνια συντήρηση, τοποθετήστε τα φιαλίδια σε υγρό άζωτο σε φάση ατμών σε θερμοκρασία περίπου -150 έως -196 °C. Η αποθήκευση στους -80 °C είναι αποδεκτή μόνο ως σύντομο ενδιάμεσο βήμα πριν από τη μεταφορά σε υγρό άζωτο.

Όροι αποστολής

Οι κρυοσυντηρημένες κυτταρικές σειρές αποστέλλονται σε ξηρό πάγο σε επικυρωμένη, μονωμένη συσκευασία με επαρκές ψυκτικό μέσο για τη διατήρηση περίπου των -78 °C καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς. Κατά την παραλαβή, επιθεωρήστε αμέσως τον περιέκτη και μεταφέρετε τα φιαλίδια χωρίς καθυστέρηση στην κατάλληλη αποθήκη.

ΔΩΡΗΤΉΣ

Ηλικία δωρητή	35 χρόνια
Εθνικότητα	Καυκάσιος

ΝΟΜΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ

Μέτρα ασφαλείας

Όταν σχεδιάζετε να αποθηκεύσετε ένα κρυοφιαλίδιο σε υγρό άζωτο για μελλοντική απόψυξη, είναι υποχρεωτικό να τηρείτε αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Τα κατάλληλα προστατευτικά γάντια και ο κατάλληλος προστατευτικός ρουχισμός είναι απαραίτητα, ενώ απαιτείται η χρήση μάσκας προσώπου ή γυαλιών ασφαλείας κατά τη μεταφορά κατεψυγμένων δειγμάτων προς ή από τη δεξαμενή υγρού αζώτου. Αυτό γίνεται για να μετριαστεί ο κίνδυνος τραυματισμού από πιθανές εκρήξεις κρυοσωλήνων κατά την απομάκρυνση, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην προβολή αιχμηρών θραυσμάτων.

Εγγύηση

Στην Cytion, υποστηρίζουμε την ποιότητα και τη βιωσιμότητα των προϊόντων μας.
Εγγυόμαστε ότι τα κύτταρά μας θα είναι βιώσιμα κατά την έναρξη της καλλιέργειας για 60 ημέρες μετά την αποστολή από τις εγκαταστάσεις μας.
Διαβεβαιώνουμε ότι όλα τα υλικά συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο Πιστοποιητικό Ανάλυσης ή/και στο Φύλλο Προϊόντος
Για πλήρεις λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""""x-default"">Δήλωση εγγύησης

Απαιτείται συμφωνία μεταφοράς υλικού	Yes