HT-1080 šūnas

300216

HT-1080 šūnas, kas 1972. gadā iegūtas no 35 gadus veca vīrieša ar fibrosarkomu slimnieka saistaudiem, tiek plaši izmantotas audzēju invazivitātes un metastāžu veidošanās mehānismu izpētei, jo tās ir ļoti agresīvas un invazīvas.
HT-1080 šūnas ir plaši izmantotas pētījumos, kas saistīti ar šūnu migrāciju, invazijas testiem un pretvēža savienojumu testēšanu. Terapeitisko līdzekļu izstrādes jomā HT-1080 šūnas izmanto pretvēža zāļu skrīningā un to ietekmes uz šūnu dzīvotspēju, apoptozi un metastātisko potenciālu novērtēšanā.
HT-1080 šūnas tiek izmantotas arī pētījumos, kas vērsti uz āršūnu matricu, angiogēzi un dažādu gēnu un proteīnu lomu vēža progresēšanā.
HT-1080 šūnas ražo matriksa metaloproteināzes (MMP) - enzīmus, kas noārda āršūnu matriksa sastāvdaļas un kam ir būtiska nozīme audzēju invazijā un metastāzēšanā. Šī īpašība padara HT-1080 šūnu līniju noderīgu pētījumiem, kuros tiek pētīta MMP un to inhibitoru regulācija.
Rezumējot, HT-1080 šūnu līnija ar tās plašo pielietojumu vēža izpētē, šūnu adhēzijas, migrācijas un invazijas modeļu pētniecībā, kā arī terapeitisko stratēģiju izstrādē joprojām ir vērtīgs resurss vēža izpētē.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Apraksts

HT-1080 šūnas, kas 1972. gadā iegūtas no 35 gadus veca vīrieša ar fibrosarkomu slimnieka saistaudiem, tiek plaši izmantotas audzēju invazivitātes un metastāžu veidošanās mehānismu izpētei, jo tās ir ļoti agresīvas un invazīvas.
HT-1080 šūnas ir plaši izmantotas pētījumos, kas saistīti ar šūnu migrāciju, invazijas testiem un pretvēža savienojumu testēšanu. Terapeitisko līdzekļu izstrādes jomā HT-1080 šūnas izmanto pretvēža zāļu skrīningā un to ietekmes uz šūnu dzīvotspēju, apoptozi un metastātisko potenciālu novērtēšanā.
HT-1080 šūnas tiek izmantotas arī pētījumos, kas vērsti uz āršūnu matricu, angiogēzi un dažādu gēnu un proteīnu lomu vēža progresēšanā.
HT-1080 šūnas ražo matriksa metaloproteināzes (MMP) - enzīmus, kas noārda āršūnu matriksa sastāvdaļas un kam ir būtiska nozīme audzēju invazijā un metastāzēšanā. Šī īpašība padara HT-1080 šūnu līniju noderīgu pētījumiem, kuros tiek pētīta MMP un to inhibitoru regulācija.
Rezumējot, HT-1080 šūnu līnija ar tās plašo pielietojumu vēža izpētē, šūnu adhēzijas, migrācijas un invazijas modeļu pētniecībā, kā arī terapeitisko stratēģiju izstrādē joprojām ir vērtīgs resurss vēža izpētē.

Slimība	Fibrosarkoma

Sinonīmi

- Ht-1080
- HT 1080
- HT1080
- HT 1080.T

KLASIFIKĀCIJA

Organisms	Cilvēks
Sekss	Vīrietis
Augšanas īpašības	Atbalstītājs
Bioloģiskās drošības līmenis	1

RAKSTURLIELUMI

Morfoloģija	Epitēlijveidīgs
Šūnu tips	Fibroblasti
Tumorogēns	Jā, imunosupresētām pelēm

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Kariotips

Modālais skaits: 2n=46, pseidodiploīds

IDENTIFIKATORI

Atsauce

HT-1080 (Cytion kataloga numurs 300216)

NCBI nodokļu identifikācijas numurs	9606
Cellosaurus	CVCL_0317

PAZĪMES UN UZŅĒMĪBA

Izoenzīmi

G6PD, B

Onkogēni

Ras+

Jutība pret vīrusiem

Poliovīruss 1, vezikulārais stomatīts (Indiana), RD114, kaķu leikēmijas vīruss (FeLV)

Reversā transkriptāze	Negatīvs

APSTRĀDE UN AUDZĒŠANA

Barotne

EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-glutamīns, w: 2,2 g/L NaHCO3, w: EBSS (Cytion izstrādājuma numurs 820100a)

Inkubācijas vide	37°C, 5%CO2, mitrināta atmosfēra.

Papildinājumi

Papildināt barotni ar 10% FBS un 1% NEAA

Disociācijas reaģents	Accutase

Pārstādīšana

Noņemt veco barotni no pielipušajām šūnām un mazgāt tās ar PBS, kurā nav kalcija un magnija. T25 kolbām izmantojiet 3-5 ml PBS, bet T75 kolbām - 5-10 ml. Pēc tam pilnībā pārklājiet šūnas ar Accutase, izmantojot 1-2 ml T25 kolbām un 2,5 ml T75 kolbām. Ļaujiet šūnām inkubēties istabas temperatūrā 8-10 minūtes, lai tās atdalītos. Pēc inkubācijas uzmanīgi samaisiet šūnas ar 10 ml barotnes, lai tās atkārtoti suspendētu, pēc tam centrifugējiet 3 minūtes ar 300xg. Izmetiet supernatantu, atkārtoti suspendējiet šūnas svaigā barotnē un pārvietojiet tās jaunās kolbās, kurās jau ir svaiga barotne.

Sēšanas blīvums	1 x 10^4 šūnas/cm^2
Šķidruma atjaunošana	Ik pēc 3 dienām
Atgūšanās pēc atkusņa	Pēc atkausēšanas izkliedējiet šūnas uz šķīvja ar blīvumu 5 x 10^4 šūnas/cm^2 un ļaujiet šūnām atgūties no sasaldēšanas procesa un pielipt vismaz 24 stundas.

Atkausēšana un kultivēšana

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITĀTES KONTROLE UN KRIOKONSERVĀCIJA

Sterilitāte

Mikoplazmas piesārņojums tiek izslēgts, izmantojot gan uz PCR balstītus testus, gan uz luminiscenci balstītas mikoplazmas noteikšanas metodes.
Lai pārliecinātos, ka nav baktēriju, sēnīšu vai rauga piesārņojuma, šūnu kultūras katru dienu vizuāli pārbauda.

Saldēšanas barotne	Kā kriokonservēšanas barotni mēs izmantojam pilnvērtīgu augšanas barotni (ieskaitot FBS) + 10 % DMSO, lai nodrošinātu pietiekamu dzīvotspēju pēc atkausēšanas, vai CM-1 (Cytion kataloga numurs 800100), kas ietver optimizētus osmoprotektorus un metaboliskos stabilizatorus, lai uzlabotu atveseļošanos un samazinātu krioinducēto stresu.

Uzglabāšanas nosacījumi

Ilgstošai uzglabāšanai flakonus ievietojiet šķidrā slāpeklī ar tvaika fāzi aptuveni -150 līdz -196 °C temperatūrā. Uzglabāšana -80 °C temperatūrā ir pieļaujama tikai kā īss starpposms pirms pārvietošanas uz šķidro slāpekli.

Piegādes nosacījumi

Kriokonservētas šūnu līnijas tiek sūtītas uz sausā ledus apstiprinātā, izolētā iepakojumā ar pietiekamu dzesēšanas šķidruma daudzumu, lai visā transportēšanas laikā uzturētu aptuveni -78 °C temperatūru. Pēc saņemšanas nekavējoties pārbaudiet iepakojumu un nekavējoties pārvietojiet flakonus uz atbilstošu uzglabāšanas vietu.

ZIEDOTĀJS

Donora vecums	35 gadi
Etniskā piederība	Kaukāzietis

JURIDISKIE JAUTĀJUMI UN DROŠĪBA

Drošības pasākumi

Plānojot uzglabāt kriokviālu šķidrā slāpeklī turpmākai atkausēšanai, obligāti jāievēro stingri drošības pasākumi. Ir nepieciešami piemēroti aizsargcimdi un apģērbs, un, pārvietojot sasaldētos paraugus uz šķidrā slāpekļa tvertni vai no tās, ir jālieto sejas maska vai aizsargbrilles. Tas jādara, lai mazinātu traumu risku, ko var radīt iespējamas kriokrioviālu eksplozijas, kas var izraisīt asu fragmentu izmešanu.

Garantija

Uzņēmumā Cytion mēs atbalstām savu produktu kvalitāti un dzīvotspēju.
Mēs garantējam, ka mūsu šūnas būs dzīvotspējīgas kultivēšanas sākumā 60 dienas pēc nosūtīšanas no mūsu ražotnēm.
Mēs nodrošinām, ka visi materiāli atbilst analīzes sertifikātā un/vai produkta lapā aprakstītajām specifikācijām
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet mūsu <a href=""/"/Kas mēs esam/garantija/"" hreflang=""x-default"">Garantijas paziņojumu

Nepieciešams materiālu nodošanas līgums	Yes