# A704 Rakud

300217

A-704 on inimese epiteelirakuliin, mis on saadud 78-aastase meessoost adenokartsinoomiga patsiendi neerukoes. Sellel rakuliinil on epiteliaalne morfoloogia. See on väärtuslik ressurss vähiuuringutes, eriti adenokartsinoomi uurimiseks. A-704 on mitmekülgne rakuliin, mida saab kasutada 3D-rakukultuuris ja transfektsiooni peremeesrakuna.
D.J. Giard'i poolt tuletatud A-704 säilitab järjepidevuse ja usaldusväärsuse katsetes. Karyotüübi analüüs näitab, et A-704 rakkudes esineb kõrvalekaldeid, nagu katkestused, ditsentrilisus ja endoreduplikatsioon, mis ulatuvad diploidsest hüperdiploidsesse, hüpertriploidsesse ja hüpertetraploidsesse.
Kuigi A-704 rakud ei ole immuunsupressiooniga hiirtel tumorigeensed, võivad nad poolkindlas keskkonnas moodustada kolooniaid. A-704 rakkudel on spetsiifilised isoensüümiprofiilid, sealhulgas AK-1, ES-D, G6PD, GLO-I, Me-2, PGM1 ja PGM3.

## ÜLDINE TEAVE

### Kirjeldus

A-704 on inimese epiteelirakuliin, mis on saadud 78-aastase meessoost adenokartsinoomiga patsiendi neerukoes. Sellel rakuliinil on epiteliaalne morfoloogia. See on väärtuslik ressurss vähiuuringutes, eriti adenokartsinoomi uurimiseks. A-704 on mitmekülgne rakuliin, mida saab kasutada 3D-rakukultuuris ja transfektsiooni peremeesrakuna.
D.J. Giard'i poolt tuletatud A-704 säilitab järjepidevuse ja usaldusväärsuse katsetes. Karyotüübi analüüs näitab, et A-704 rakkudes esineb kõrvalekaldeid, nagu katkestused, ditsentrilisus ja endoreduplikatsioon, mis ulatuvad diploidsest hüperdiploidsesse, hüpertriploidsesse ja hüpertetraploidsesse.
Kuigi A-704 rakud ei ole immuunsupressiooniga hiirtel tumorigeensed, võivad nad poolkindlas keskkonnas moodustada kolooniaid. A-704 rakkudel on spetsiifilised isoensüümiprofiilid, sealhulgas AK-1, ES-D, G6PD, GLO-I, Me-2, PGM1 ja PGM3.

| | |
|---|---|
| **Kude** | Neerud |
| **Haigus** | Adenokartsinoom |

### Sünonüümid

- A.704
- A-704

## KLASSIFIKATSIOON

| | |
|---|---|
| **Organism** | Inimene |
| **Sugu** | Mees |
| **Kasvuvõime** | Järgija |
| **Bioloogilise ohutuse tase** | 1 |

## OMADUSED

| | |
|---|---|
| **Morfoloogia** | Epiteelilaadsed |
| **Tuumorigeenne** | Ei |

### Karyotüüp

(P59) diploidne kuni hüperdiploidne, hüpertriploidne kuni hüpertetraploidne koos kõrvalekalletega, sealhulgas katkestused, ditsentrilised ja endoreduplikatsioonid

## TUNNUSED

### Viide

A704 (Cytioni kataloginumber 300217)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

| | |
|---|---|
| **NCBI maksukood** | 9606 |
| **Cellosaurus** | CVCL_1065 |

## AVALDUMINE JA VASTUVÕTLIKKUS

### Isoensüümid

Me-2, 1, PGM3, 1-2, PGM1, 1, ES-D, 1, AK-1, 1, GLO-1, 2, G6PD, B

## KÄSITLEMINE JA KASVATAMINE

### Kasvatuskeskkond

EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutamiin, w: 2,2 g/L NaHCO3, w: EBSS (Cytioni artikli number 820100a)

| | |
|---|---|
| **Inkubatsiooni keskkond** | 37°C, 5%CO2, niisutatud atmosfäär. |

### Toidulisandid

Täiendada söötme 10% FBS ja 1% NEAAga

| | |
|---|---|
| **Dissotsiatsioonireaktiiv** | Accutase |

### Kultuuri edasikasvatamine

Eemaldage kleepunud rakkudelt vana söötme ja peske neid PBS-ga, milles puudub kaltsium ja magneesium. T25 kolbide puhul kasutage 3-5 ml PBS-i ja T75 kolbide puhul 5-10 ml. Seejärel katke rakud täielikult Accutase'iga, kasutades 1-2 ml T25 kolbide puhul ja 2,5 ml T75 kolbide puhul. Laske rakkudel inkubeerida 8-10 minutit toatemperatuuril, et need eralduksid. Pärast inkubeerimist segage rakud ettevaatlikult 10 ml söötmega, et neid resuspenseerida, seejärel tsentrifuugige 3 minutit 300xg juures. Visake supernatant ära, suspenseerige rakud uuesti värskes keskkonnas ja viige need uutesse kolvidesse, mis sisaldavad juba värsket keskkonda.

| | |
|---|---|
| **Külvitihedus** | 1 x $10^4$ rakku/$cm^2$ annab 4 päeva jooksul konfluentse monokihi. |
| **Vedeliku vahetus** | 2 kuni 3 korda nädalas |
| **Taastumine pärast sulamist** | Pärast sulatamist asetage rakud plaadile tihedusega 5 x $10^4$ rakku/$cm^2$ ja laske rakkudel külmutamisprotsessist taastuda ja kinnituda vähemalt 24 tunni jooksul. |

### Sulatamine ja kasvatamine

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

## KVALITEEDIKONTROLL JA KRÜOKONSERVEERIMINE

### Viljatus

Mükoplasmakontaminatsioon on välistatud nii PCR-põhiste analüüside kui ka luminestsentsil põhinevate mükoplasma tuvastamise meetodite abil.
Bakteriaalse, seene- või pärmsaaste puudumise tagamiseks kontrollitakse rakukultuure iga päev visuaalselt.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

| | |
|---|---|
| **Külmutuskeskkond** | Krüosäilitusvedelikusena kasutame täielikku kasvukeskkonda (sh FBS) + 10% DMSO, et tagada piisav elujõulisus pärast sulatamist, või CM-1 (Cytioni katalooginumber 800100), mis sisaldab optimeeritud osmoprotektante ja metaboolseid stabilisaatoreid, et parandada taastumist ja vähendada krüostressi. |

**Säilitamistingimused**

Pikaajaliseks säilitamiseks asetage viaalid aurufaasis vedela lämmastikuga umbes -150 kuni -196 °C juures. Säilitamine temperatuuril -80 °C on vastuvõetav ainult lühikese vaheetapina enne vedela lämmastikuga üleviimist.

**Tarne- ja kohaletoimetamistingimused**

Krüokonserveeritud rakuliinid transporditakse kuiva jääga valideeritud, isoleeritud pakendis, milles on piisavalt külmutusainet, et säilitada kogu transpordi jooksul ligikaudu -78 °C. Vastuvõtmisel kontrollige konteinerit kohe ja viige viaalid viivitamatult sobivasse hoiuruumi.

## ANNETAJA

| | |
|---|---|
| **Doonori vanus** | 78 aastat |
| **Etniline kuuluvus** | Kaukaasia |

## ÕIGUSLIKUD JA OHUTUSALASED KÜSIMUSED

**Ohutusnõuded**

Kui plaanitakse krüoviaalide säilitamist vedelas lämmastikus tulevase sulatamise eesmärgil, on kohustuslik järgida rangeid ohutusmeetmeid. Asjakohased kaitsekindad ja -riietus on hädavajalikud ning külmutatud proovide vedela lämmastiku mahutisse või mahutist väljaviimisel tuleb kasutada näomaski või kaitseprille. See on vajalik selleks, et vähendada vigastuste ohtu, mis tuleneb võimalikest krüoviaalide plahvatustest eemaldamisel, mille tagajärjel võivad välja paiskuda teravad killud.

**Garantii**

Cytion seisab oma toodete kvaliteedi ja elujõulisuse eest.
Me garanteerime, et meie rakud on elujõulised kasvatamise alguses 60 päeva jooksul pärast meie rajatistest saatmist.
Tagame, et kõik materjalid vastavad analüüsisertifikaadis ja/või tootelehel kirjeldatud spetsifikatsioonidele
Täielikke üksikasju leiate meie <a href="""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang="""x-default"">Tagatise avaldusest

| | |
|---|---|
| **Vajalik on materjalide üleandmise leping** | Yes |