Осередки HuTu-80

300218

Клітинна лінія HuTu-80 отримана з аденокарциноми дванадцятипалої кишки людини і слугує цінною моделлю in vitro для вивчення раку шлунково-кишкового тракту, особливо тих, що вражають тонку кишку. Як епітеліоподібна клітинна лінія, HuTu-80 допомагає вивчати клітинні механізми, що лежать в основі пухлиноутворення, прогресування раку та відповіді на різні терапевтичні агенти. Клітини мають характеристики, характерні для аденокарциноми, такі як аберантний ріст і здатність до проліферації в лабораторних умовах, що робить їх придатними як для фундаментальних досліджень, так і для розробки лікарських препаратів.
Клітини HuTu-80 широко використовуються для дослідження шляхів передачі сигналу, задіяних у розвитку раку шлунково-кишкового тракту, в тому числі опосередкованих факторами росту та їх рецепторами, які мають вирішальне значення у розвитку та прогресуванні аденокарциноми. Дослідники також використовують цю клітинну лінію для вивчення впливу хіміотерапевтичних препаратів та інших протиракових сполук, що дає змогу отримати уявлення про потенційні методи лікування раку дванадцятипалої кишки та інших видів раку шлунково-кишкового тракту. Завдяки своєму походженню та добре вивченій природі клітини HuTu-80 є надійною моделлю для дослідження раку, особливо у вивченні складної біології злоякісних пухлин шлунково-кишкового тракту.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Опис

Клітинна лінія HuTu-80 отримана з аденокарциноми дванадцятипалої кишки людини і слугує цінною моделлю in vitro для вивчення раку шлунково-кишкового тракту, особливо тих, що вражають тонку кишку. Як епітеліоподібна клітинна лінія, HuTu-80 допомагає вивчати клітинні механізми, що лежать в основі пухлиноутворення, прогресування раку та відповіді на різні терапевтичні агенти. Клітини мають характеристики, характерні для аденокарциноми, такі як аберантний ріст і здатність до проліферації в лабораторних умовах, що робить їх придатними як для фундаментальних досліджень, так і для розробки лікарських препаратів.
Клітини HuTu-80 широко використовуються для дослідження шляхів передачі сигналу, задіяних у розвитку раку шлунково-кишкового тракту, в тому числі опосередкованих факторами росту та їх рецепторами, які мають вирішальне значення у розвитку та прогресуванні аденокарциноми. Дослідники також використовують цю клітинну лінію для вивчення впливу хіміотерапевтичних препаратів та інших протиракових сполук, що дає змогу отримати уявлення про потенційні методи лікування раку дванадцятипалої кишки та інших видів раку шлунково-кишкового тракту. Завдяки своєму походженню та добре вивченій природі клітини HuTu-80 є надійною моделлю для дослідження раку, особливо у вивченні складної біології злоякісних пухлин шлунково-кишкового тракту.

Тканина	Дванадцятипала кишка
Хвороба	Аденокарцинома

Синоніми

- HUTU 80
- Hutu 80
- HuTu 80
- HUTU-80
- Hutu-80
- HUTU80
- HuTu80
- Hutu80

КЛАСИФІКАЦІЯ

Організм	Людина
Секс	Чоловік
Характеристики росту	Прихильник
Рівень біобезпеки	1

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Морфологія	Епітеліальноподібні
Пухлиноутворювальний	Так, у голих мишей. Утворює добре диференційовану папілярну аденокарциному (ступінь I)
Плоїдність	Анеуплоїдний

Каріотип

(P12) гіподиплоїдний до гіпердиплоїдного з модальним числом = 46

Час подвоєння	від 26 до 30 годин

ІДЕНТИФІКАТОРИ

Посилання

HuTu-80 (номер за каталогом Cytion 300218)

Ідентифікаційний номер платника податків NCBI	9606
Целозавр	CVCL_1301

ЕКСПРЕСІЯ ТА СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ

Рецептори, що експресуються

Бомбезин

Експресія антигену

Група крові B, Rh+

Ізоферменти

PGM3, 1-2, PGM1, 1-2, ES-D, 1, Me-2, 2, AK-1, 1, GLO-1, 2, G6PD, B, Phenotype Frequency Product: 0.0017

ОБРОБКА ТА ВИРОЩУВАННЯ

Живильне середовище

EMEM (MEM Eagle), w: 2 мМ L-глутамін, w: 2,2 г/л NaHCO3, w: EBSS (цит. номер 820100a)

Атмосфера інкубації	37°C, 5% CO2, волога атмосфера.

Добавки

Додайте до середовища 10% FBS та 1% NEAA

Реагент для дисоціації	Аккутаза

Пересадка в нове середовище

Видаліть старе середовище з прилиплих клітин і промийте їх PBS, в якому бракує кальцію і магнію. Для колб T25 використовуйте 3-5 мл PBS, а для колб T75 - 5-10 мл. Потім повністю покрийте клітини аккутазою, використовуючи 1-2 мл для колб T25 і 2,5 мл для колб T75. Залиште клітини інкубуватися при кімнатній температурі протягом 8-10 хвилин, щоб відокремити їх. Після інкубації обережно змішайте клітини з 10 мл середовища, щоб ресуспендувати їх, а потім центрифугуйте при 300xg протягом 3 хвилин. Викиньте надосадову рідину, ресуспендуйте клітини у свіжому середовищі та перенесіть їх у нові колби, які вже містять свіже середовище.

Щільність висіву	Рекомендується від 1 до 2 x 10^4 клітин/см2
Оновлення рідини	2-3 рази на тиждень
Відновлення після відлиги	Швидко

Розморожування та культивування

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТА КРІОКОНСЕРВАЦІЯ

Стерильність

Зараження мікоплазмою виключається за допомогою аналізів на основі ПЛР та люмінесцентних методів виявлення мікоплазми. Щоб переконатися у відсутності бактеріального, грибкового або дріжджового забруднення, клітинні культури піддаються щоденному візуальному контролю.

Середовище для заморожування	Як середовище кріоконсервування ми використовуємо повне живильне середовище (включаючи FBS) + 10% ДМСО для адекватної життєздатності після відтавання або CM-1 (номер за каталогом Cytion 800100), до складу якого входять оптимізовані осмопротектори та метаболічні стабілізатори для прискорення відновлення та зменшення кріоіндукованого стресу.

Умови зберігання

Для тривалого зберігання помістіть флакони в парофазний рідкий азот при температурі від -150 до -196 °C. Зберігання при -80 °C допустиме лише як короткий проміжний етап перед перенесенням у рідкий азот.

Умови доставки

Кріоконсервовані клітинні лінії транспортуються на сухому льоду в перевіреній ізольованій упаковці з достатньою кількістю холодоагенту для підтримання температури приблизно -78 °C під час транспортування. При отриманні негайно огляньте контейнер і без зволікань перемістіть флакони у відповідне місце зберігання.

ДОНОР

Вік донора	53 роки
Етнічна приналежність	Кавказець

ПРАВОВІ ПИТАННЯ ТА БЕЗПЕКА

Заходи безпеки

Плануючи зберігати кріовіал у рідкому азоті для подальшого розморожування, обов'язково слід дотримуватися суворих заходів безпеки. Під час перенесення заморожених зразків до резервуара з рідким азотом або з нього необхідно використовувати захисні рукавички та одяг, а також маску або захисні окуляри. Це необхідно для того, щоб зменшити ризик травмування від потенційних кріогенних вибухів при вилученні, які можуть призвести до розльоту гострих осколків.

Гарантія

У Cytion ми відповідаємо за якість та життєздатність нашої продукції.
Ми гарантуємо, що наші клітини будуть життєздатними на початку культивування протягом 60 днів після відвантаження з нашого заводу.
Ми запевняємо, що всі матеріали відповідають специфікаціям, описаним у сертифікаті аналізу та/або паспорті продукту
Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, зверніться до нашого Заяви про гарантію

Необхідна угода про передачу матеріалів	Yes