DLD-1 □포

300220

DLD-1□ 성인 환자의 원위 결장에서 추출한 인간 대장 선암 세포주입니다. 이 세포는 형태학적으로 상피 세포이며 처음에는 대장암 메커니즘과 병리를 연구하기 위해 확립되었습니다. DLD-1 세포는 종양학 연구, 특히 암의 분자생물학, 유전자 발현 및 다양한 화학요법제의 효과에 초점을 맞춘 연구에서 일반적으로 사용됩니다.
이 세포주는 대장암에서 흔히 볼 수 있는 코돈 13번의 이형접합 KRAS 돌연변이가 암세포 생존 및 증식과 관련이 있는 것으로 알려져 있습니다. 또한 DLD-1□ APC 유전자에 돌연변이를 일으켜 대장암 발생에 중요한 요소인 Wnt 신호 전달 경로의 조절을 약화시키는 데 기여합니다. 연구에 DLD-1을 강력하게 사용하면 종양 행동, 약물 반응 및 암 유전학에 대한 귀중한 통찰력을 얻을 수 있어 대장암 연구 및 치료제 개발에 중요한 모델이 될 수 있습니다.

일반 정보

□명

DLD-1□ 성인 환자의 원위 결장에서 추출한 인간 대장 선암 세포주입니다. 이 세포는 형태학적으로 상피 세포이며 처음에는 대장암 메커니즘과 병리를 연구하기 위해 확립되었습니다. DLD-1 세포는 종양학 연구, 특히 암의 분자생물학, 유전자 발현 및 다양한 화학요법제의 효과에 초점을 맞춘 연구에서 일반적으로 사용됩니다.
이 세포주는 대장암에서 흔히 볼 수 있는 코돈 13번의 이형접합 KRAS 돌연변이가 암세포 생존 및 증식과 관련이 있는 것으로 알려져 있습니다. 또한 DLD-1□ APC 유전자에 돌연변이를 일으켜 대장암 발생에 중요한 요소인 Wnt 신호 전달 경로의 조절을 약화시키는 데 기여합니다. 연구에 DLD-1을 강력하게 사용하면 종양 행동, 약물 반응 및 암 유전학에 대한 귀중한 통찰력을 얻을 수 있어 대장암 연구 및 치료제 개발에 중요한 모델이 될 수 있습니다.

티슈	콜론
질병	선암종

동의어

- DLD 1
- DLD1
- CoCL3

분류

생물체	인간
성	남성
성장 특성	준수자
생물안전 등급	1

특징

형태학	상피 유사
종양 유발성	누드 마우스에서

염색체형

2n = 46

배가 시간	15시간

식별자

인용

DLD-1(사이티온 카탈로그 번호 300220)

NCBI 세금 식별번호	9606
셀로사우루스	CVCL_0248

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

발현 및 감수성

단백질 발현

케라틴

바이러스

역전사효소 음성

제품

암 배아 항원(CEA) 0.5ng/10 exp6 세포/10일, 알칼리성 포스파타제

취급 및 배양

배지

RPMI 1640, w: 2.0mM 안정 글루타민, w: 2.0g/L NaHCO3(사이티온 제품 번호 820700a)

배양 조건	37°C, 5%CO2, 습한 대기.

건강보조식품

10% FBS로 배지를 보충합니다

분리 시약	아큐타제

재배양

부착된 세포에서 오래된 배지를 제거하고 칼슘과 마그네슘이 없는 PBS로 세척합니다. T25 플라스크의 경우 3~5ml, T75 플라스크의 경우 5~10ml의 PBS를 사용합니다. 그런 다음 T25 플라스크의 경우 1~2㎖, T75 플라스크의 경우 2.5㎖를 사용하여 세포를 Accutase로 완전히 덮습니다. 세포를 분리하기 위해 실온에서 8~10분간 배양합니다. 배양 후 세포를 배지 10ml와 부드럽게 혼합하여 재부유시킨 다음 300xg에서 3분간 원심분리합니다. 상층액을 버리고 세포를 신선한 배지에 다시 부유시킨 후 이미 신선한 배지가 들어 있는 새 플라스크에 옮깁니다.

파종 밀도	1~2 × 10^4 세포/cm^2
유체 교체	주 2~3회

해동 및 배양

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

품질 관리 및 냉동 보존

불임

마이코플라스마 오염□ PCR 기반 분석법과 발광 기반 마이코플라스마 검출법을 모두 사용하여 배제합니다.
박테리아, 곰팡이 또는 효모 오염이 없는지 확인하기 위해 세포 배양□ 매일 육안 검사를 거칩니다.

배양액 동결	냉동 보존 배지로는 해동 후 충분한 생존력을 위해 완전 성장 배지(FBS 포함) + 10% DMSO를 사용하거나, 최적화된 삼투 보호제 및 대사 안정제가 포함된 CM-1(Cytion 카탈로그 번호 800100)을 사용하여 회복력을 높이고 냉동으로 인한 스트레스를 줄입니다.

보관 조건

장기 보존을 위해서는 바이알을 약 -150°C에서 -196°C의 증기상 액체 질소에 넣으세요. 80°C에서 보관하는 것□ 액체 질소로 옮기기 전 짧□ 중간 단계로만 허용됩니다.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

배송 조건

냉동 보존 세포주는 운송 중 약 -78°C를 유지할 수 있는 충분한 냉매가 포함된 검증된 단열 포장에 드라이아이스를 넣어 배송됩니다. 수령 즉시 용기를 검사하고 바이알을 지체 없이 적절한 보관 장소로 옮깁니다 .

기부자

기증자 연령	67년

법률 및 안전

안전 수칙

향후 해동을 위해 액체 질소에 냉동 보관을 계획하는 경우, 엄격한 안전 조치를 준수해야 합니다. 적절한 보호 장갑과 의복□ 필수이며, 액체 질소 탱크로 냉동 샘플을 옮길 때는 반드시 안면 마스크나 보안경을 착용해야 합니다 . 이는 제거 시 날카로운 파편이 튀어나올 수 있는 극저온 폭발로 인한 부상 위험을 줄이기 위한 것입니다.

보증

싸이티온□ 제품의 품질과 생존력을 보증합니다 .
당사는 당사 시설에서 배송된 후 60일 동안 배양 시작 시 세포가 생존할 수 있음을 보증합니다.
당사는 모든 재료가 분석 증명서 및/또는 제품 시트에 설명된 사양을 준수함을 보증합니다
자세한 내용□ <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">보증서 를 참조하시기 바랍니다

물질 이전 계약서**(MTA)**가 필요합니다**.**	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB