Jurkat E6.1-celler

300223

Jurkat E6.1-celler, en afledt klon af Jurkat-cellelinjen, som stammer fra det perifere blod fra en 14-årig dreng med akut T-celle leukæmi, er en central ressource inden for tumorimmunologi og leukæmiforskning. Disse celler udviser hurtig spredning og en udtalt respons på stimuli, hvilket er afgørende for at studere T-cellers biologi, herunder T-cellereceptor (TCR)-signalering, aktivering, spredning og apoptose. Jurkat E6.1-celler er kendetegnet ved mutationer som TEL-JAK2-fusionsgenet og giver indsigt i leukæmifænotypen og de molekylære mekanismer, der ligger til grund for T-celleleukæmi.

Jurkat E6.1-celler bruges ofte til at undersøge de intracellulære signalveje, der aktiveres ved TCR-engagement, såsom NF-κB-vejen, MAPK-veje og calciumsignalering, som er afgørende for T-celleaktivering og -funktion. Cellelinjens følsomhed over for phorbolestere og midler rettet mod T3-antigenet gør den til et uvurderligt værktøj til at udforske de komplicerede aspekter af T-celleaktivering, herunder induktion af interleukin-2-produktion (IL-2). Denne egenskab kombineret med deres unormale karyotype understreger Jurkat E6.1-cellernes anvendelighed i forskning med fokus på immunsynapsens arkitektur og de signalveje, der styrer T-cellers spredning og funktion.

Jurkat E6.1-cellernes anvendelighed strækker sig til studiet af apoptose og tilbyder en model til at undersøge virkningerne af forskellige forbindelser, herunder alkaloidekstrakter fra kilder som Tribulus terrestris, på celledødsveje. Dette aspekt er især relevant for at identificere potentielle terapeutiske midler og forstå deres virkningsmekanismer i T-celle leukæmi.

Sammenfattende er Jurkat E6.1-celler med deres unikke egenskaber og alsidighed fortsat en hjørnesten i studiet af T-celleaktivering, signalering og apoptose.

GENERELLE OPLYSNINGER

Beskrivelse

Jurkat E6.1-celler, en afledt klon af Jurkat-cellelinjen, som stammer fra det perifere blod fra en 14-årig dreng med akut T-celle leukæmi, er en central ressource inden for tumorimmunologi og leukæmiforskning. Disse celler udviser hurtig spredning og en udtalt respons på stimuli, hvilket er afgørende for at studere T-cellers biologi, herunder T-cellereceptor (TCR)-signalering, aktivering, spredning og apoptose. Jurkat E6.1-celler er kendetegnet ved mutationer som TEL-JAK2-fusionsgenet og giver indsigt i leukæmifænotypen og de molekylære mekanismer, der ligger til grund for T-celleleukæmi.

Jurkat E6.1-celler bruges ofte til at undersøge de intracellulære signalveje, der aktiveres ved TCR-engagement, såsom NF-κB-vejen, MAPK-veje og calciumsignalering, som er afgørende for T-celleaktivering og -funktion. Cellelinjens følsomhed over for phorbolestere og midler rettet mod T3-antigenet gør den til et uvurderligt værktøj til at udforske de komplicerede aspekter af T-celleaktivering, herunder induktion af interleukin-2-produktion (IL-2). Denne egenskab kombineret med deres unormale karyotype understreger Jurkat E6.1-cellernes anvendelighed i forskning med fokus på immunsynapsens arkitektur og de signalveje, der styrer T-cellers spredning og funktion.

Jurkat E6.1-cellernes anvendelighed strækker sig til studiet af apoptose og tilbyder en model til at undersøge virkningerne af forskellige forbindelser, herunder alkaloidekstrakter fra kilder som Tribulus terrestris, på celledødsveje. Dette aspekt er især relevant for at identificere potentielle terapeutiske midler og forstå deres virkningsmekanismer i T-celle leukæmi.

Sammenfattende er Jurkat E6.1-celler med deres unikke egenskaber og alsidighed fortsat en hjørnesten i studiet af T-celleaktivering, signalering og apoptose.

Væv	Blod
Sygdom	Akut T-celle leukæmi
Metastasested	T-lymfocyt

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Synonymer

- JurkatE6-1
- Jurkat E6-1
- Jurkat
- Clone E6-1
- Jurkat Clone E6-1
- Jurkat (clone E6-1)
- JURKAT E-6.1
- JURKAT E-61
- Jurkat-E6
- Jurkat E6
- J.E6-1
- E6-1

KLASSIFICERING

Organisme	Menneske
Køn	Mand
Vækstegenskaber	Affjedring
Biosikkerhedsniveau	1

EGENSKABER

Morfologi	Runde celler
Celletype	Lymfoblast

Karyotype

Modaltal = 46, interval = 41 til 47, karyotypen er 46,xY,-2,-18, del(2)(p21p23), del(18)(p11.2)

IDENTIFIKATORER

Kildehenvisning

Jurkat E6.1 (Cytion katalognummer 300223)

NCBI-skattenummer	9606
Cellosaurus	CVCL_0367

UDTRYK OG MODTAGELIGHED

Antigenudtryk

CD3

Produkter

Interleukin-2 (interleukin 2, IL-2), interferon gamma

HÅNDTERING OG OPDRÆT

Næringsmedium

RPMI 1640, m: 2,0 mM stabil glutamin, m: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion artikelnummer 820700a)

Inkubationsatmosfære	37°C, 5%CO2, befugtet atmosfære.

Kosttilskud

Suppler mediet med 10% FBS

Oddyrkning

Vedligehold kulturerne ved regelmæssigt at tilføje eller udskifte mediet. Start kulturerne med en tæthed på 5 x 10^5 celler/ml og hold cellekoncentrationen inden for området 3 x 10^5 til 1 x 10^6 celler/ml for optimal vækst.

Såtæthed	1 x 10^5 celler/ml
Væskeudskiftning	Hver anden dag
Genopretning efter optøning	Hurtig

Optøning og dyrkning

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROL OG KRYOPRÆSERVERING

Sterilitet

Mycoplasma-kontaminering udelukkes ved hjælp af både PCR-baserede assays og luminescensbaserede mycoplasma-detektionsmetoder. For at sikre, at der ikke er nogen bakterie-, svampe- eller gærforurening, underkastes cellekulturerne daglige visuelle inspektioner.

Frysemedium	Som kryopræserveringsmedium bruger vi komplet vækstmedium (inklusive FBS) + 10 % DMSO for tilstrækkelig levedygtighed efter optøning eller CM-1 (Cytion-katalognummer 800100), som indeholder optimerede osmobeskyttende stoffer og metaboliske stabilisatorer for at forbedre genopretningen og reducere kryo-induceret stress.

Opbevaringsbetingelser

For langtidsopbevaring anbringes hætteglas i flydende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Opbevaring ved -80 °C er kun acceptabelt som et kort mellemtrin før overførsel til flydende nitrogen.

Leveringsbetingelser

Kryopræserverede cellelinjer sendes på tøris i valideret, isoleret emballage med tilstrækkeligt kølemiddel til at opretholde ca. -78 °C under hele transporten. Ved modtagelse skal beholderen straks inspiceres, og hætteglassene skal straks overføres til passende opbevaring.

DONOR

Donorens alder	14 år

JURIDISKE FORHOLD OG SIKKERHED

Sikkerhedsforanstaltninger

Når man planlægger at opbevare et kryovæske i flydende nitrogen med henblik på fremtidig optøning, er det obligatorisk at overholde strenge sikkerhedsforanstaltninger. Passende beskyttelseshandsker og -tøj er afgørende, og der skal bruges ansigtsmaske eller sikkerhedsbriller under overførslen af frosne prøver til eller fra tanken med flydende nitrogen. Dette er for at mindske risikoen for skader fra potentielle kryovæskeeksplosioner ved fjernelse, som kan resultere i projektion af skarpe fragmenter.

Garanti

Hos Cytion står vi inde for vores produkters kvalitet og levedygtighed.
Vi garanterer, at vores celler vil være levedygtige ved kulturens start i 60 dage efter afsendelse fra vores faciliteter.
Vi sikrer, at alle materialer er i overensstemmelse med de specifikationer, der er beskrevet i analysecertifikatet og/eller produktarket
For alle detaljer henvises til vores <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantierklæring

Der kræves en aftale om overførsel af materiale	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB