Jurkat E6.1 ląstelės

300223

Jurkat E6.1 ląstelės, išvestinis Jurkat ląstelių linijos klonas, gautas iš 14 metų berniuko, sergančio ūmine T ląstelių leukemija, periferinio kraujo, yra pagrindinis šaltinis navikų imunologijos ir leukemijos tyrimų srityje. Šios ląstelės pasižymi greitu dauginimusi ir ryškiu reagavimu į dirgiklius, o tai labai svarbu tiriant T ląstelių biologiją, įskaitant T ląstelių receptorių (TCR) signalizaciją, aktyvaciją, proliferaciją ir apoptozę.
Jurkat E6.1 ląstelės, kurioms būdingos tokios mutacijos kaip TEL-JAK2 sintezės genas, leidžia geriau pažinti leukemijos fenotipą ir molekulinius mechanizmus, lemiančius T ląstelių leukemiją.
Jurkat E6.1 ląstelės paprastai naudojamos tiriant viduląstelinius signalizacijos kelius, kurie aktyvuojasi įsijungus TCR, pavyzdžiui, NF-κB kelią, MAPK kelius ir kalcio signalizaciją, kurie yra labai svarbūs T ląstelių aktyvacijai ir funkcijai. Ląstelių linija reaguoja į forbolio esterius ir į T3 antigeną nukreiptas medžiagas, todėl ji yra neįkainojama priemonė T ląstelių aktyvavimo subtilybėms tirti, įskaitant interleukino-2 (IL-2) gamybos indukciją. Ši savybė, kartu su jų nenormaliu kariotipu, pabrėžia Jurkat E6.1 ląstelių naudingumą atliekant tyrimus, skirtus imuninės sinapsės architektūrai ir signaliniams keliams, kurie valdo T ląstelių proliferaciją ir funkciją.
Jurkat E6.1 ląstelės yra naudingos ir apoptozės tyrimams - tai modelis, kuriuo galima tirti įvairių junginių, įskaitant alkaloidus, išgaunamus iš tokių šaltinių kaip Tribulus terrestris, poveikį ląstelių mirties keliams. Šis aspektas ypač svarbus siekiant nustatyti galimus gydomuosius preparatus ir suprasti jų veikimo mechanizmus sergant T ląstelių leukemija.
Apibendrinant galima teigti, kad Jurkat E6.1 ląstelės, pasižyminčios unikaliomis savybėmis ir universalumu, išlieka kertiniu akmeniu tiriant T ląstelių aktyvaciją, signalizaciją ir apoptozę.

BENDRA INFORMACIJA

Aprašymas

Jurkat E6.1 ląstelės, išvestinis Jurkat ląstelių linijos klonas, gautas iš 14 metų berniuko, sergančio ūmine T ląstelių leukemija, periferinio kraujo, yra pagrindinis šaltinis navikų imunologijos ir leukemijos tyrimų srityje. Šios ląstelės pasižymi greitu dauginimusi ir ryškiu reagavimu į dirgiklius, o tai labai svarbu tiriant T ląstelių biologiją, įskaitant T ląstelių receptorių (TCR) signalizaciją, aktyvaciją, proliferaciją ir apoptozę.
Jurkat E6.1 ląstelės, kurioms būdingos tokios mutacijos kaip TEL-JAK2 sintezės genas, leidžia geriau pažinti leukemijos fenotipą ir molekulinius mechanizmus, lemiančius T ląstelių leukemiją.
Jurkat E6.1 ląstelės paprastai naudojamos tiriant viduląstelinius signalizacijos kelius, kurie aktyvuojasi įsijungus TCR, pavyzdžiui, NF-κB kelią, MAPK kelius ir kalcio signalizaciją, kurie yra labai svarbūs T ląstelių aktyvacijai ir funkcijai. Ląstelių linija reaguoja į forbolio esterius ir į T3 antigeną nukreiptas medžiagas, todėl ji yra neįkainojama priemonė T ląstelių aktyvavimo subtilybėms tirti, įskaitant interleukino-2 (IL-2) gamybos indukciją. Ši savybė, kartu su jų nenormaliu kariotipu, pabrėžia Jurkat E6.1 ląstelių naudingumą atliekant tyrimus, skirtus imuninės sinapsės architektūrai ir signaliniams keliams, kurie valdo T ląstelių proliferaciją ir funkciją.
Jurkat E6.1 ląstelės yra naudingos ir apoptozės tyrimams - tai modelis, kuriuo galima tirti įvairių junginių, įskaitant alkaloidus, išgaunamus iš tokių šaltinių kaip Tribulus terrestris, poveikį ląstelių mirties keliams. Šis aspektas ypač svarbus siekiant nustatyti galimus gydomuosius preparatus ir suprasti jų veikimo mechanizmus sergant T ląstelių leukemija.
Apibendrinant galima teigti, kad Jurkat E6.1 ląstelės, pasižyminčios unikaliomis savybėmis ir universalumu, išlieka kertiniu akmeniu tiriant T ląstelių aktyvaciją, signalizaciją ir apoptozę.

Audinys	Kraujas
Liga	Ūminė T ląstelių leukemija
Metastazių vieta	T limfocitas

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Sinonimai

- JurkatE6-1
- Jurkat E6-1
- Jurkat
- Clone E6-1
- Jurkat Clone E6-1
- Jurkat (clone E6-1)
- JURKAT E-6.1
- JURKAT E-61
- Jurkat-E6
- Jurkat E6
- J.E6-1
- E6-1

KLASIFIKACIJA

Organizmas	Žmogus
Seksas	Vyras
Augimo savybės	Pakaba
Biologinio saugumo lygis	1

CHARAKTERISTIKOS

Morfologija	Apvalios ląstelės
Ląstelių tipas	Limfoblastai

Kariotipas

Modalinis skaičius = 46, intervalas = 41-47, kariotipas yra 46,xY,-2,-18, del(2)(p21p23), del(18)(p11.2)

IDENTIFIKATORIAI

Nuoroda

Jurkat E6.1 (Cytion katalogo numeris 300223)

NCBI mokesčių identifikavimo kodas	9606
Cellosaurus	CVCL_0367

IŠRAIŠKA IR JAUTRUMAS

Antigeno ekspresija

CD3

Produktai

Interleukinas-2 (interleukinas 2, IL-2), interferonas gama

LAIKYMAS IR AUGINIMAS

Maitinamoji terpė

RPMI 1640, š: 2,0 mM stabilus glutaminas, š: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion gaminio numeris 820700a)

Inkubacijos aplinka	37 °C, 5 %CO2, drėkintoje atmosferoje.

Maisto papildai

Papildykite terpę 10 % FBS

Subkultūrinis auginimas

Kultūras prižiūrėkite periodiškai papildydami arba keisdami terpę. Kultūras pradėkite su 5 x 10^5 ląstelių/ml tankiu ir, siekdami optimalaus augimo, palaikykite ląstelių koncentraciją nuo 3 x 10^5 iki 1 x 10^6 ląstelių/ml.

Sėjos tankis	1 x 10^5 ląstelių/ml
Skysčių atnaujinimas	Kas 2 dienas
Atkūrimas po atšilimo	Greitai

Atšildymas ir auginimas

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KOKYBĖS KONTROLĖ IR KRIOKONSERVAVIMAS

Sterilumas

Mikoplazmos užterštumas atmetamas taikant PGR pagrįstus tyrimus ir liuminescencinius mikoplazmos aptikimo metodus.
Siekiant užtikrinti, kad nebūtų užteršimo bakterijomis, grybeliais ar mielėmis, ląstelių kultūros kasdien vizualiai tikrinamos.

Šaldymo terpė	Kaip kriokonservavimo terpę naudojame visišką augimo terpę (įskaitant FBS) + 10 % DMSO, kad būtų užtikrintas tinkamas gyvybingumas po atšildymo, arba CM-1 (Cytion katalogo numeris 800100), kurioje yra optimizuotų osmoprotektorių ir medžiagų apykaitos stabilizatorių, kad būtų pagerintas atsigavimas ir sumažintas kriokonservavimo sukeltas stresas.

Laikymo sąlygos

Norėdami ilgai saugoti, įdėkite buteliukus į garų fazės skystą azotą maždaug -150-196 °C temperatūroje. Laikymas -80 °C temperatūroje yra priimtinas tik kaip trumpas tarpinis etapas prieš perkeliant į skystąjį azotą.

Pristatymo sąlygos

Kriokonservuotos ląstelių linijos gabenamos ant sauso ledo patvirtintoje, izoliuotoje pakuotėje su pakankamu kiekiu šaldymo skysčio, kad pervežimo metu būtų palaikoma maždaug -78 °C temperatūra. Gavę pakuotę, nedelsdami ją apžiūrėkite ir nedelsdami perkelkite mėgintuvėlius į tinkamą saugyklą.

DONORAS

Donoro amžius	14 metų

TEISINIAI IR SAUGOS KLAUSIMAI

Saugos priemonės

Planuojant saugoti kriovaistinę skystame azote, kad ateityje ją būtų galima atšildyti, būtina laikytis griežtų saugos priemonių. Būtina mūvėti tinkamas apsaugines pirštines ir drabužius, o perkeliant užšaldytus mėginius į skystojo azoto talpyklą arba iš jos būtina naudoti veido kaukę arba apsauginius akinius. Taip siekiama sumažinti sužeidimų riziką dėl galimo kriokomponentų sprogimo išėmimo metu, kai gali išsiveržti aštrūs fragmentai.

Garantija

" Cytion" garantuoja savo produktų kokybę ir gyvybingumą.
Garantuojame, kad mūsų ląstelės bus gyvybingos kultūrų auginimo pradžioje 60 dienų po išsiuntimo iš mūsų gamyklos.
Užtikriname, kad visos medžiagos atitinka analizės sertifikate ir (arba) gaminio lape aprašytas specifikacijas
Išsamią informaciją rasite mūsų <a href=""/Kas mes esame/garantijos/" hreflang=""x-default"">Garantijos pareiškime

Reikalinga medžiagų perdavimo sutartis	Yes