Kasumi-1-solut

300226

Kasumi-1-solulinja on peräisin 7-vuotiaan japanilaisen pojan perifeerisestä verestä, jolla oli akuutti myelooinen leukemia (AML), erityisesti FAB M2 -alatyyppi, luuydinsiirron jälkeisen uusiutumisen aikana. Tämä solulinja on arvokas resurssi tutkijoille, jotka tutkivat hematologisia pahanlaatuisia kasvaimia, erityisesti niitä, joihin liittyy t(8;21)-kromosomitranslokaatio. Tämä translokaatio johtaa AML1-ETO-fuusiogeenin muodostumiseen, joka on kriittinen tekijä tietyissä AML:n alatyypeissä. Kasumi-1-solut ovat näin ollen tärkeä malli AML:n molekyylimekanismien tutkimiseen ja mahdollisten terapeuttisten lähestymistapojen testaamiseen.
Kasumi-1-soluilla on sekä myelooisen että makrofagilinjan piirteitä, joten ne ovat erityisen hyödyllisiä myelooisen erilaistumisen tutkimisessa. Nämä solut voidaan indusoida erilaistumaan makrofagin kaltaisiksi soluiksi, kun niitä viljellään forboli-12-myristaatti-13-asetaatilla (TPA), mikä tarjoaa vankan järjestelmän myelooisen linjan sitoutumiseen ja erilaistumiseen liittyvien reittien tutkimiseen. Tämä erilaistumiskyky lisää Kasumi-1-solujen käyttökelpoisuutta tutkimuksessa, jossa keskitytään sekä AML:n biologiaan että laajempiin myelooisten solujen kehitysprosesseihin.

YLEISTÄ TIETOA

Kuvaus

Kasumi-1-solulinja on peräisin 7-vuotiaan japanilaisen pojan perifeerisestä verestä, jolla oli akuutti myelooinen leukemia (AML), erityisesti FAB M2 -alatyyppi, luuydinsiirron jälkeisen uusiutumisen aikana. Tämä solulinja on arvokas resurssi tutkijoille, jotka tutkivat hematologisia pahanlaatuisia kasvaimia, erityisesti niitä, joihin liittyy t(8;21)-kromosomitranslokaatio. Tämä translokaatio johtaa AML1-ETO-fuusiogeenin muodostumiseen, joka on kriittinen tekijä tietyissä AML:n alatyypeissä. Kasumi-1-solut ovat näin ollen tärkeä malli AML:n molekyylimekanismien tutkimiseen ja mahdollisten terapeuttisten lähestymistapojen testaamiseen.
Kasumi-1-soluilla on sekä myelooisen että makrofagilinjan piirteitä, joten ne ovat erityisen hyödyllisiä myelooisen erilaistumisen tutkimisessa. Nämä solut voidaan indusoida erilaistumaan makrofagin kaltaisiksi soluiksi, kun niitä viljellään forboli-12-myristaatti-13-asetaatilla (TPA), mikä tarjoaa vankan järjestelmän myelooisen linjan sitoutumiseen ja erilaistumiseen liittyvien reittien tutkimiseen. Tämä erilaistumiskyky lisää Kasumi-1-solujen käyttökelpoisuutta tutkimuksessa, jossa keskitytään sekä AML:n biologiaan että laajempiin myelooisten solujen kehitysprosesseihin.

Kudos	Veri
Sairaus	Akuutti myeloblastinen leukemia

Synonyymit

- KASUMI-1
- Kasumi 1
- KASUMI1
- Kasumi1

LUOKITTELU

Organismi	Ihminen
Sukupuoli	Mies
Kasvuominaisuudet	Jousitus
Bioturvallisuustaso	1

OMINAISUUDET

Morfologia	Pyöreät solut, joissa on huomattavia vaihteluita sekä koon että ydinsolujen ja sytoplasman suhteen suhteen.
Solutyyppi	Myeloblasti (AML-akuutti myelooinen leukemia)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Karyotyyppi

T(8,21) kromosomitranslokaatio

Kaksinkertaistumisaika	40-45 tuntia

TUNNISTEET

Lähdeviite

Kasumi-1 (Cytionin luettelonumero 300226)

NCBI-verotunnus	9606
Cellosaurus	CVCL_0589

ILMENTYMINEN JA ALTTIUS

Antigeenin ilmentyminen

CD4+ (37,1 %, esiintyy yhdessä CD34:n ja CD33:n kanssa), CD13+(OKM13), CD15+(LeuM1), CD33+, CD34+(MY10), CD38+(OKT10, 50,1 %), CD71+(Nu-TERf), HLA-DR+(OKDR).

KÄSITTELY JA VILJELY

Viljelyalusta

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabiilia glutamiinia, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytionin artikkelinumero 820700a)

Inkubaatioilma	37 °C, 5 %CO2, kostutettu ilmakehä.

Ravintolisät

Täydennetään elatusainetta 10 % lämpöinaktivoidulla FBS:llä

Soluviljely

Ylläpidä viljelmiä lisäämällä tai vaihtamalla kasvualusta säännöllisesti. Aloita viljelyt tiheydellä 5 x 10^5 solua/ml ja pidä solupitoisuus välillä 3 x 10^5 – 1 x 10^6 solua/ml optimaalisen kasvun saavuttamiseksi.

Kylvötiheys	1 x 10^5 solua/ml
Nesteen uusiminen	Lisätään uutta elatusainetta (20-30 tilavuusprosenttia) 2-3 päivän välein
Sulamisen jälkeinen palautuminen	Noin viikko

Sulatus ja viljely

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

LAADUNVALVONTA JA KRYOSÄILYTYS

Hedelmättömyys

Mykoplasmakontaminaatio suljetaan pois sekä PCR-pohjaisilla määrityksillä että luminesenssiin perustuvilla mykoplasman osoitusmenetelmillä.
Bakteeri-, sieni- tai hiivakontaminaation välttämiseksi soluviljelmät tarkastetaan päivittäin silmämääräisesti.

Jäädytysaine	Kryosäilytysmediana käytämme täydellistä kasvualustaa (mukaan lukien FBS) + 10 % DMSO:ta riittävän sulatuksen jälkeisen elinkelpoisuuden varmistamiseksi tai CM-1:tä (Cytionin luettelonumero 800100), joka sisältää optimoituja osmoprotectantteja ja metabolisia stabilisaattoreita, jotka parantavat elpymistä ja vähentävät kryosäilytyksen aiheuttamaa stressiä.

Säilytysolosuhteet

Pitkäaikaissäilytystä varten injektiopullot asetetaan höyryfaasissa olevaan nestemäiseen typpeen noin -150 - -196 °C:een. Säilytys -80 °C:ssa on hyväksyttävää vain lyhyenä välivaiheena ennen siirtoa nestemäiseen typpeen.

Toimitusehdot

Kryosäilytetyt solulinjat kuljetetaan kuivajäässä validoidussa, eristetyssä pakkauksessa, jossa on riittävästi kylmäainetta, jotta lämpötila pysyy noin -78 °C:ssa koko kuljetuksen ajan. Pakkaus on tarkastettava välittömästi sen vastaanottamisen jälkeen ja injektiopullot on siirrettävä viipymättä asianmukaiseen varastoon.

LAHJOITTAJA

Luovuttajan ikä	7 vuotta
Etnisyys	Japanilainen

OIKEUDELLISET JA TURVALLISUUSASIAT

Turvallisuusohjeet

Kun suunnitellaan kryoputken säilyttämistä nestemäisessä typessä sulatusta varten, on noudatettava tiukkoja turvatoimenpiteitä. Asianmukaiset suojakäsineet ja -vaatteet ovat välttämättömiä, ja kasvonaamarin tai suojalasien käyttö on välttämätöntä siirrettäessä jäädytettyjä näytteitä nestetyppisäiliöön tai siitä pois. Tällä pyritään pienentämään loukkaantumisriskiä, joka aiheutuu kryoputkien mahdollisista räjähdyksistä, jotka voivat aiheuttaa terävien sirpaleiden sinkoutumisen.

Takuu

Me Cytionilla seisomme tuotteidemme laadun ja elinkelpoisuuden takana.
Takaamme, että solumme ovat elinkelpoisia viljelyn alkaessa 60 päivän ajan sen jälkeen, kun ne on lähetetty laitoksestamme.
Vakuutamme, että kaikki materiaalit ovat analyysitodistuksessa ja/tai tuoteselosteessa kuvattujen eritelmien mukaisia
Lisätietoja on <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""""x-default"">Takuulausumassa

Aineiden siirtoa koskeva sopimus vaaditaan	Yes