Cellules Kasumi-1

300226

La lignée cellulaire Kasumi-1 a été isolée à partir du sang périphérique d'un garçon japonais de 7 ans atteint d'une leucémie myéloïde aiguë (LMA), plus précisément du sous-type FAB M2, lors d'une rechute survenue à la suite d'une greffe de moelle osseuse. Cette lignée cellulaire constitue une ressource précieuse pour les chercheurs qui étudient les hémopathies malignes, en particulier celles impliquant la translocation chromosomique t(8;21). Cette translocation entraîne la formation du gène de fusion AML1-ETO, un facteur déterminant dans certains sous-types de LAM. Les cellules Kasumi-1 constituent donc un modèle essentiel pour l'étude des mécanismes moléculaires de la LAM et l'évaluation d'approches thérapeutiques potentielles.
Les cellules Kasumi-1 possèdent des caractéristiques à la fois des lignées myéloïdes et des lignées de macrophages, ce qui les rend particulièrement utiles pour les études sur la différenciation myéloïde. Ces cellules peuvent être induites à se différencier en cellules de type macrophage lorsqu'elles sont cultivées avec du 12-myristate-13-acétate de phorbol (TPA), offrant ainsi un système robuste pour explorer les voies impliquées dans l'engagement et la différenciation de la lignée myéloïde. Cette capacité de différenciation renforce l'utilité des cellules Kasumi-1 dans la recherche axée à la fois sur la biologie de la LAM et sur les processus plus généraux de développement des cellules myéloïdes.

GENERAL INFORMATION

Description

La lignée cellulaire Kasumi-1 a été isolée à partir du sang périphérique d'un garçon japonais de 7 ans atteint d'une leucémie myéloïde aiguë (LMA), plus précisément du sous-type FAB M2, lors d'une rechute survenue à la suite d'une greffe de moelle osseuse. Cette lignée cellulaire constitue une ressource précieuse pour les chercheurs qui étudient les hémopathies malignes, en particulier celles impliquant la translocation chromosomique t(8;21). Cette translocation entraîne la formation du gène de fusion AML1-ETO, un facteur déterminant dans certains sous-types de LAM. Les cellules Kasumi-1 constituent donc un modèle essentiel pour l'étude des mécanismes moléculaires de la LAM et l'évaluation d'approches thérapeutiques potentielles.
Les cellules Kasumi-1 possèdent des caractéristiques à la fois des lignées myéloïdes et des lignées de macrophages, ce qui les rend particulièrement utiles pour les études sur la différenciation myéloïde. Ces cellules peuvent être induites à se différencier en cellules de type macrophage lorsqu'elles sont cultivées avec du 12-myristate-13-acétate de phorbol (TPA), offrant ainsi un système robuste pour explorer les voies impliquées dans l'engagement et la différenciation de la lignée myéloïde. Cette capacité de différenciation renforce l'utilité des cellules Kasumi-1 dans la recherche axée à la fois sur la biologie de la LAM et sur les processus plus généraux de développement des cellules myéloïdes.

Tissue	Sang
Disease	Leucémie myéloblastique aiguë

Synonyms

- KASUMI-1
- Kasumi 1
- KASUMI1
- Kasumi1

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Male
Growth properties	Suspension
Biosafety level	1

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

CHARACTERISTICS

Morphology	Cellules rondes présentant des variations marquées tant au niveau de leur taille que de leur rapport nucléaire/cytoplasmique.
Cell type	Myéloblaste (LMA – leucémie myéloïde aiguë)

Karyotype

Translocation chromosomique T(8,21)

Doubling time	40 à 45 heures

IDENTIFIERS

Citation

Kasumi-1 (numéro de catalogue Cytion 300226)

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_0589

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Antigen expression

CD4+ (37,1 %, coexprimé avec CD34 et CD33), CD13+ (OKM13), CD15+ (LeuM1), CD33+, CD34+ (MY10), CD38+ (OKT10, 50,1 %), CD71+ (Nu-TERf), HLA-DR+ (OKDR).

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

RPMI 1640, contenant 2,0 mM de glutamine stable et 2,0 g/L de $NaHCO_3$ (numéro d'article Cytion 820700a)

Incubation atmosphere	37 °C, 5 % de CO_2, atmosphère humidifiée.

Supplements

Ajouter au milieu 10 % de sérum fœtal bovin (FBS) inactivé par la chaleur

Subculturing

Entretenir les cultures en ajoutant ou en remplaçant périodiquement le milieu de culture. Démarrer les cultures à une densité de 5×10^5 cellules/ml et maintenir la concentration cellulaire dans une fourchette comprise entre 3×10^5 et 1×10^6 cellules/ml pour une croissance optimale.

Seeding density	1×10^5 cellules/ml
Fluid renewal	Ajoutez du milieu frais (20 à 30 % en volume) tous les 2 à 3 jours
Post-thaw recovery	Environ une semaine

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

La contamination par les mycoplasmes est exclue à l'aide de tests basés sur la PCR et de méthodes de détection des mycoplasmes par luminescence.
Afin de s’assurer qu’il n’y a aucune contamination bactérienne, fongique ou par des levures, les cultures cellulaires font l’objet d’inspections visuelles quotidiennes.

Freeze medium	Comme milieu de cryoconservation, nous utilisons un milieu de croissance complet (contenant du sérum fœtal bovin) + 10 % de DMSO pour assurer une viabilité adéquate après décongélation, ou du CM-1 (référence Cytion 800100), qui contient des osmoprotecteurs et des stabilisateurs métaboliques optimisés pour améliorer la récupération et réduire le stress induit par la cryoconservation.

Storage conditions

Pour une conservation à long terme, placez les flacons dans de l’azote liquide en phase vapeur à une température comprise entre environ −150 et −196 °C. L’entreposage à −80 °C n’est acceptable qu’à titre d’étape intermédiaire de courte durée avant le transfert dans l’azote liquide.

Shipping conditions

Les lignées cellulaires cryoconservées sont expédiées dans de la glace sèche, dans un emballage isotherme validé contenant suffisamment de réfrigérant pour maintenir une température d’environ −78 °C pendant tout le transport. À la réception, inspectez immédiatement le conteneur et transférez sans délai les flacons dans un lieu de stockage approprié.

DONOR

Donor age	7 ans
Ethnicity	Japonais

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

Lorsqu’on prévoit entreposer un cryotube dans de l’azote liquide en vue d’une décongélation ultérieure, il est impératif de respecter des mesures de sécurité rigoureuses. Le port de gants et de vêtements de protection appropriés est essentiel, et l’utilisation d’un masque facial ou de lunettes de protection est obligatoire lors du transfert d’échantillons congelés vers ou depuis le réservoir d’azote liquide. Cette précaution vise à réduire le risque de blessure causé par d’éventuelles explosions de cryotubes lors de leur retrait, pouvant entraîner la projection de fragments coupants.

Warranty

Chez Cytion, nous garantissons la qualité et la viabilité de nos produits.
Nous garantissons que nos cellules seront viables au début de la culture pendant 60 jours à compter de leur expédition depuis nos installations.
Nous assurons que tous les matériaux sont conformes aux spécifications décrites dans le certificat d'analyse et/ou la fiche technique du produit.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre déclaration de garantie.

Material Transfer Agreement required	Yes