Células Panc-1

300228

Las células PANC-1, procedentes de un carcinoma de conducto pancreático en un varón caucásico de 56 años, se erigen como una línea celular epitelial fundamental en el ámbito de la investigación oncológica, en particular en el estudio del carcinoma pancreático. Las células Panc1 ofrecen un modelo útil para ahondar en los entresijos del cáncer de páncreas, incluidas las líneas celulares de adenocarcinoma ductal y su potencial tumorigénico.
La morfología epitelial de las células y su capacidad para mostrar diversos patrones morfológicos subrayan su relevancia para imitar la heterogeneidad clonal y el complejo microambiente tumoral que se observa en el adenocarcinoma ductal pancreático (PDAC).
Las células PANC-1 expresan marcadores como la vimentina y receptores de somatostatina como SSTR2, que desempeñan un papel crucial en la diferenciación neuroendocrina. Este perfil de expresión, unido a la capacidad de las células para experimentar la expresión de marcadores de transición epitelial-mesenquimal (EMT) y el cambio de subtipo EMT, las convierte en una plataforma excelente para explorar estrategias terapéuticas dirigidas al proceso EMT y a las características neuroendocrinas del cáncer de páncreas.
El análisis carotípico de la línea celular revela un estado hiperdiploide con notables alteraciones genéticas, incluyendo la pérdida del cromosoma Y y mutaciones en genes críticos como CDKN2A y el gen p53.
En resumen, las células PANC-1 constituyen un modelo polifacético para la investigación del cáncer de páncreas, que permite realizar estudios detallados del fenotipo y el genotipo del adenocarcinoma pancreático, la eficacia de las terapias dirigidas y los mecanismos moleculares que impulsan la progresión del cáncer.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción

Las células PANC-1, procedentes de un carcinoma de conducto pancreático en un varón caucásico de 56 años, se erigen como una línea celular epitelial fundamental en el ámbito de la investigación oncológica, en particular en el estudio del carcinoma pancreático. Las células Panc1 ofrecen un modelo útil para ahondar en los entresijos del cáncer de páncreas, incluidas las líneas celulares de adenocarcinoma ductal y su potencial tumorigénico.
La morfología epitelial de las células y su capacidad para mostrar diversos patrones morfológicos subrayan su relevancia para imitar la heterogeneidad clonal y el complejo microambiente tumoral que se observa en el adenocarcinoma ductal pancreático (PDAC).
Las células PANC-1 expresan marcadores como la vimentina y receptores de somatostatina como SSTR2, que desempeñan un papel crucial en la diferenciación neuroendocrina. Este perfil de expresión, unido a la capacidad de las células para experimentar la expresión de marcadores de transición epitelial-mesenquimal (EMT) y el cambio de subtipo EMT, las convierte en una plataforma excelente para explorar estrategias terapéuticas dirigidas al proceso EMT y a las características neuroendocrinas del cáncer de páncreas.
El análisis carotípico de la línea celular revela un estado hiperdiploide con notables alteraciones genéticas, incluyendo la pérdida del cromosoma Y y mutaciones en genes críticos como CDKN2A y el gen p53.
En resumen, las células PANC-1 constituyen un modelo polifacético para la investigación del cáncer de páncreas, que permite realizar estudios detallados del fenotipo y el genotipo del adenocarcinoma pancreático, la eficacia de las terapias dirigidas y los mecanismos moleculares que impulsan la progresión del cáncer.

Pañuelo de papel	Páncreas
Enfermedad	Adenocarcinoma

Sinónimos

- PANC-1
- PANC.1
- Panc 1
- PanC1
- Panc1
- PANC1
- Panc-1-P

CLASIFICACIÓN

Organismo	Humano

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Sexo	Hombre
Propiedades de crecimiento	Adherente
Nivel de bioseguridad	1

CARACTERÍSTICAS

Tumorigénico	Crecimiento en agar blando. Formación de carcinomas de crecimiento progresivo en ratones atímicos desnudos.

Cariotipo

Tres cromosomas marcadores distintos y un cromosoma de 1 anillo

IDENTIFICADORES

Referencia

Panc-1 (número de catálogo 300228 de Cytion)

N.º de identificación fiscal del NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_0480

EXPRESIÓN Y SUSCEPTIBILIDAD

Expresión de proteínas

P53 positivo, CEA negativo

Isoenzimas

G6PD, B

Perfil mutacional

Las células Panc-1 presentan una mutación Kras heterocigota en el codón12: GGT(Wt Gly) >GAT(Asp)

MANEJO Y CULTIVO

Medio de cultivo

DMEM, w: 4,5 g/L de glucosa, w: 4 mM de L-glutamina, w: 3,7 g/L de NaHCO3, w: 1,0 mM de piruvato sódico (número de artículo de Cytion 820300a)

Atmósfera de incubación	37°C, 5%CO2, atmósfera humidificada.

Suplementos

Complementar el medio con un 10% de FBS

Reactivo de disociación	Accutase

Subcultivo

Retire el medio antiguo de las células adheridas y lávelas con PBS que carezca de calcio y magnesio. Para matraces T25, utilice 3-5 ml de PBS, y para matraces T75, utilice 5-10 ml. A continuación, cubra completamente las células con Accutase, utilizando 1-2 ml para matraces T25 y 2,5 ml para matraces T75. Deje incubar las células a temperatura ambiente durante 8-10 minutos para desprenderlas. Tras la incubación, mezclar suavemente las células con 10 ml de medio para resuspenderlas y, a continuación, centrifugar a 300xg durante 3 minutos. Desechar el sobrenadante, resuspender las células en medio fresco y transferirlas a nuevos matraces que ya contengan medio fresco.

Densidad de siembra	1 x 10^4 células/cm^2
Renovación de fluidos	de 2 a 3 veces por semana

Recuperación tras la descongelación	Después de descongelar, siembre las células a 5 x 10^4 células/cm^2 y deje que las células se recuperen del proceso de congelación y se adhieran durante al menos 48 horas.

Descongelación y cultivo

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTROL DE CALIDAD Y CRIOPRESERVACIÓN

Esterilidad

La contaminación por micoplasma se excluye utilizando tanto ensayos basados en la PCR como métodos de detección de micoplasma basados en la luminiscencia.
Para garantizar la ausencia de contaminación bacteriana, fúngica o por levaduras, los cultivos celulares se someten a inspecciones visuales diarias.

Medio de congelación	Como medio de criopreservación, utilizamos el medio de crecimiento completo (incluido FBS) + 10% DMSO para una viabilidad adecuada tras la descongelación, o CM-1 (número de catálogo 800100 de Cytion), que incluye osmoprotectores optimizados y estabilizadores metabólicos para mejorar la recuperación y reducir el estrés crioinducido.

Condiciones de almacenamiento

Para la conservación a largo plazo, colocar los viales en nitrógeno líquido en fase vapor a una temperatura aproximada de -150 a -196 °C. El almacenamiento a -80 °C sólo es aceptable como breve paso intermedio antes de la transferencia al nitrógeno líquido.

Condiciones de envío

Las líneas celulares crioconservadas se envían en hielo seco en envases validados y aislados con suficiente refrigerante para mantener aproximadamente -78 °C durante el tránsito. A la recepción, inspeccione el envase inmediatamente y transfiera los viales sin demora al almacenamiento adecuado.

DONANTE

Edad del donante	56 años
Origen étnico	Caucásico

ASPECTOS LEGALES Y DE SEGURIDAD

Medidas de seguridad

Cuando se planea almacenar un criovial en nitrógeno líquido para su futura descongelación, es obligatorio cumplir estrictas medidas de seguridad. Es esencial utilizar guantes y ropa de protección adecuados, así como una mascarilla o gafas de seguridad durante el traslado de muestras congeladas desde o hacia el tanque de nitrógeno líquido. Con ello se pretende mitigar el riesgo de lesiones por posibles explosiones crioviales al extraerlas, que pueden dar lugar a la proyección de fragmentos afilados.

Garantía

En Cytion, respaldamos la calidad y viabilidad de nuestros productos.
Garantizamos que nuestras células serán viables al inicio del cultivo durante los 60 días posteriores al envío desde nuestras instalaciones.
Aseguramos que todos los materiales se ajustan a las especificaciones descritas en el Certificado de Análisis y/o Hoja de Producto
Para más información, consulte nuestra <a href=""/Quiénes somos/Garantía/"" hreflang=""x-default"">Declaración de garantía

Se requiere un acuerdo de transferencia de material	Yes